

Appunti provvisori del corso di Matematica Discreta

Alessandro Berarducci e Giovanni Gaiffi 10 Dic. 2008.

Lavoro in corso d'opera.

Indice

Capitolo 1. Proposizioni e Connettivi	7
1. Considerazioni introduttive	7
2. Tavole di verità	9
3. Come si dimostra una implicazione	11
4. Esempi	11
5. Basi di connettivi	12
6. Equivalenze notevoli	13
7. Esercizi vari	14
8. Esercizi	14
9. Tautologie	15
Capitolo 2. Predicati e quantificatori	19
1. Predicati	19
2. Quantificatore universale ed esistenziale	19
3. Ambito di quantificazione	21
Capitolo 3. Dimostrazioni e regole di inferenza	23
1. Introduzione e scaricamento di una ipotesi	23
2. Ragionamento per tautologie:	23
3. Uguaglianza	23
4. Assiomi	24
5. Regole per i quantificatori	24
6. Equivalenze notevoli	25
7. Esercizi vari	26
Capitolo 4. Insiemi	29
1. Appartenenza e notazioni	29
2. Stringhe	30
3. Il prodotto cartesiano	30
4. Inclusione	31
5. Le leggi per l'intersezione, l'unione e il complementare fra insiemi.	32
6. L'insieme delle parti	34
7. Esercizi	35
Capitolo 5. Induzione	39
1. Definizioni per induzione o "ricorsive"	39
2. Dimostrazioni per induzione	39
3. Somme parziali di successioni	41
4. Esercizi	45

Capitolo 6. Approfondimenti sull'induzione	49
1. I numeri di Fibonacci e le successioni definite per ricorrenza.	49
2. Una formula per i numeri di Fibonacci	49
3. Un metodo per le ricorrenze lineari a coefficienti costanti	51
4. Forme equivalenti del principio di induzione: il principio del minimo e il principio di induzione forte	52
5. Esercizi	55
Capitolo 7. Prodotto cartesiano, relazioni e funzioni	59
1. Le definizioni di funzione	59
2. Primi esempi	59
3. Funzioni iniettive, surgettive, bigettive	60
4. Provare a scoprire se una funzione è iniettiva, surgettiva, bigettiva...esempi	62
5. Il grafico di una funzione	63
6. La composizione di funzioni	64
7. Funzioni invertibili	65
8. Esercizi	65
Capitolo 8. Calcolo combinatorio	71
1. Esercizi	71
Capitolo 9. Contare	73
1. La definizione di cardinalità e il lemma dei cassetti	73
2. Prime applicazioni ed esempi	74
3. Insiemi di funzioni	75
4. La cardinalità dell'insieme delle parti di un insieme finito	77
5. I coefficienti binomiali	78
6. Contare con i binomiali: esempi	80
7. Il triangolo di Pascal-Tartaglia	83
8. Il teorema del binomio di Newton	85
9. Esercizi	86
Capitolo 10. Contare... l'infinito	91
1. Prime osservazioni	91
2. Gli insiemi infiniti numerabili	92
3. Un'altra definizione di infinito	93
4. Numerabilità dell'insieme dei numeri razionali	94
5. Un insieme infinito non numerabile: i numeri reali	95
6. Alla ricerca di altri infiniti..	96
7. Esercizi	99
Capitolo 11. Altre strategie per contare	101
1. Il principio di Inclusione-Esclusione	101
2. Applicazioni del principio di Inclusione-Esclusione	103
3. Una prima presentazione del gruppo simmetrico S_n	106
4. Permutazioni senza punti fissi	108
5. Esercizi	110

Capitolo 12. Aritmetica: la divisione euclidea e il massimo comun divisore	111
1. Divisione euclidea	111
2. Congruenze	112
3. Calcolo veloce dei resti e basi numeriche	113
4. Il massimo comun divisore e l'algoritmo di Euclide	114
5. L'Identità di Bezout	117
6. Un metodo costruttivo per ottenere l'Identità di Bezout	118
7. Esercizi	120
Capitolo 13. I numeri primi	123
1. Esercizi	125
Capitolo 14. Equazioni diofantee e congruenze lineari	127
1. Le equazioni diofantee	127
2. Esempio di risoluzione di una equazione diofantea	129
3. Inverso di un numero modulo un intero positivo	131
4. Metodo per risolvere le congruenze lineari in una incognita	132
5. Esempi di risoluzione di una equazione diofantea (usando le congruenze)	134
6. Sistemi di congruenze. Il teorema cinese del resto	136
7. Esercizi	139
Capitolo 15. Classi di resto e anelli quoziente	147
1. Le classi di resto modulo un intero positivo. Struttura additiva e moltiplicativa.	147
2. Anelli	149
3. Il piccolo teorema di Fermat	150
4. Esercizi	154
Capitolo 16. Gruppi e ordini	157
1. Il concetto di gruppo e di sottogruppo	157
2. Congruenza modulo un sottogruppo	158
3. L'ordine di un elemento. La funzione di Eulero.	160
4. Esercizi	162
Bibliografia	163

Proposizioni e Connettivi

1. Considerazioni introduttive

1.1. Uguaglianza. Le dimostrazioni più semplici che uno studente incontra nel corso della sua carriera scolastica sono quelle “per sostituzione”, ovvero quelle che si ottengono in base alla seguente *legge di sostituzione degli uguali*: se $a = b$, allora a e b verificano le stesse proprietà, e pertanto possiamo sostituire a con b in qualunque contesto $P(a)$ in cui si faccia riferimento ad a ottenendo $P(b)$. Ad esempio sapendo che $12 - 10 = 2$ posso dedurre che $8 \cdot (12 - 10) = 8 \cdot 2$.¹

Possiamo rappresentare in forma grafica la regola di sostituzione nel modo seguente:

$$\frac{a = b, P(a)}{P(b)}$$

1.2. Ipotesi e tesi. Se le dimostrazioni per sostituzione non pongono in genere grossi problemi, maggiori difficoltà vengono invece incontrate nello studio delle disuguaglianze. In genere più che di difficoltà di calcolo (come potrebbe esserlo la semplificazione di una espressione complessa), si tratta di difficoltà di tipo logico, come ad esempio lo scambiare l’ipotesi con la tesi, ovvero tra *ciò che assumiamo come vero* (l’**ipotesi**) con *ciò che vogliamo dimostrare essere vero* (la **tesi**). Un punto che spesso non viene compreso è che quando diciamo che una data tesi *segue* (o è *implicata*) dalla data ipotesi intendiamo dire che affinché la tesi sia vera è *sufficiente* che l’ipotesi sia vera, ma non che è *necessario* che lo sia: ovvero in tutti i casi in cui l’ipotesi è vera lo deve essere anche la tesi, ma la tesi potrebbe essere vera “per i fatti suoi” anche in altri casi, ovvero anche in certi casi in cui l’ipotesi è falsa. Detto in altri termini, affinché la tesi segua dall’ipotesi l’unica cosa importante è che non esista alcun caso in cui l’ipotesi sia vera e la tesi sia falsa (se l’ipotesi è sempre falsa tanto meglio: in questo caso la tesi segue “a vuoto”). Le difficoltà nel comprendere questi concetti si riscontrano soprattutto quando, nel corso di una dimostrazione, vengono introdotte condizioni o ipotesi aggiuntive che ci si riserva di verificare o di “scaricare” prima della fine della dimostrazione.

ESEMPIO 1.1. Sia k un numero intero non negativo e supponiamo che

$$2^k \geq 2k^2 - 10k + 21. \quad (\text{Ipotesi})$$

Ci domandiamo se è possibile dedurne che

$$2^k \geq k^2 - 3k + 12. \quad (\text{Tesi})$$

¹Nel linguaggio ordinario talvolta si incontrano apparenti violazioni del principio di sostituzione: ad esempio “Pierre crede che $2^{2^5} + 1$ sia primo” non equivale a “Pierre crede che 641×6700417 sia primo”, nonostante $2^{2^5} + 1$ sia di fatto uguale a 641×6700417 (ma Pierre potrebbe non saperlo!). Il problema è che con “crede che” introduciamo un contesto in cui non si fa esclusivo riferimento alle entità $2^{2^5} + 1$ e 641×6700417 ma anche al modo in cui vengono presentate.

SOLUZIONE: In questo esempio abbiamo tre quantità:

$$\begin{aligned} A &= 2^k \\ B &= 2k^2 - 10k + 21 \\ C &= k^2 - 3k + 12 \end{aligned}$$

L'ipotesi dice che $A \geq B$. Quello che vogliamo sapere è se $A \geq C$. Una cosa naturale da fare è cercare di confrontare B e C . Si tratta di un compito non troppo difficile trattandosi di espressioni di secondo grado. Però cosa dobbiamo cercare di dimostrare? Che $B \geq C$ o che $C \geq B$? Un attimo di riflessione mostra che, ferma restando l'ipotesi principale $A \geq B$, la condizione aggiuntiva $B \geq C$ è *sufficiente* per avere la tesi: se tale condizione fosse verificata componendo le disuguaglianze $A \geq B$ e $B \geq C$ avremmo la tesi $A \geq C$. (Per analogia: se so che il signor A è più alto di B , e che B è più alto di C , posso concludere che A è più alto di C .) Cerchiamo dunque di capire se $B \geq C$, ovvero se

$$2k^2 - 10k + 21 \geq k^2 - 3k + 12.$$

Con facili semplificazioni tale condizione risulta equivalente a

$$k^2 + 9 \geq 7k,$$

che, come si vede anche ad occhio, è vera per tutti gli interi non negativi k maggiori o uguali a 6 ma è falsa per quelli < 6 . Cosa possiamo concluderne? Certamente se introduciamo l'ipotesi ulteriore $k \geq 6$ la tesi risulta vera, essendo verificata la disuguaglianza $B \geq C$ che era per l'appunto una condizione sufficiente per la tesi. Tuttavia senza l'ipotesi aggiuntiva incontriamo una difficoltà in quanto per $k < 6$ la condizione $B \geq C$ è falsa. A questo punto è importante non scoraggiarsi e soprattutto non cadete nell'errore di concluderne frettolosamente che senza assumere $k \geq 6$ non possiamo arrivare alla nostra tesi. La $B \geq C$ era infatti *sufficiente* (in congiunzione con l'ipotesi principale $A \geq B$) per avere la tesi, ma *non necessaria*: ovvero la tesi potrebbe essere vera anche in altri casi oltre a quelli che verificano $B \geq C$. (Proseguendo la nostra analogia: se il signor A è più alto di B ma B non è più alto di C , non posso concludere nulla riguardo al fatto se A sia più alto di C a meno di non riuscire a scoprire altre informazioni utili a riguardo.) L'analisi del problema non è dunque terminata: dobbiamo capire cosa succede per $k < 6$, ovvero nei casi ancora non considerati. Valutando le espressioni A e C si vede che anche per $k = 4$ e $k = 5$ la tesi $A \geq C$ è vera. Bene, stiamo sulla buona strada. Tentiamo ora con $k = 0, 1, 2, 3$. Oibò! Per tali valori la tesi è falsa! Dobbiamo dunque concluderne che la tesi non segue dall'ipotesi? Calma. Ancora un attimo di pazienza: i valori $k = 0, 1, 2, 3$ in realtà non ci interessano affatto in quanto, valutando le espressioni A e B , si vede che non rientrano tra quelli che verificano l'ipotesi $A \geq B$ da cui siamo partiti: assumere che l'ipotesi sia vera significa per l'appunto restringere la nostra attenzione solo ai valori di k che la verificano. L'analisi del problema è ora finalmente terminata, e la conclusione è che la tesi segue in effetti dall'ipotesi. \square

Notiamo che se non ci fosse stato nessun valore di k che verificava l'ipotesi, anche in quel caso si poteva concludere che la tesi segue (“a vuoto”) dall'ipotesi.

Finiamo con un consiglio spassionato agli studenti: quando risolvete un compito in classe che coinvolge le disuguaglianze, cercate di “condire” il vostro elaborato con locuzioni del tipo: “è necessario che”, “è sufficiente che”, “abbiamo quindi dimostrato che”, e altre espressioni consone che illustrano il ragionamento. Se omettete il ragionamento e lasciate solo i

calcoli non si capisce nulla. Ad esempio omettendo il ragionamento e lasciando solo i calcoli nell'esempio precedente avrei qualcosa del tipo:

SOLUZIONE:

$$2k^2 - 10k + 2 \geq k^2 - 3k + 12$$

$$k^2 + 9 \geq 7k$$

$$k \geq 6 ??? \quad \square$$

In seguito daremo alcune regole generali e consigli per scrivere dimostrazioni corrette e leggibili. Prima però dobbiamo studiare le leggi che governano il “vero” e il “falso”, in quanto uno dei criteri per stabilire la bontà di una dimostrazione è che essa raggiunga il suo scopo, ovvero che garantisca che nei casi in cui l'ipotesi è vera lo sia anche la tesi.²

2. Tavole di verità

Chiamiamo **proposizione** ciò a cui in un dato contesto ha senso attribuire, anche se solo in via ipotetica, uno dei valori “vero” o “falso”. Ad esempio “ $3 > 2$ ” è una proposizione vera, mentre “ $2 > 3$ ” è una proposizione falsa. L'inciso “anche se solo in via ipotetica” è importante. Nell'esempio 1.1 abbiamo ad un certo punto introdotto l'ipotesi “ $k \geq 6$ ”. In quel contesto $k \geq 6$ va quindi considerata una proposizione (dipendente dal parametro k). Chiaramente presa isolatamente e fuori contesto, non avrebbe senso chiedersi se $k \geq 6$ sia vera o falsa: occorrerebbe dire chi è k .

Assumiamo la concezione classica secondo cui una proposizione è o vera o falsa (principio del terzo escluso), ma non può essere sia vera che falsa (principio di non contraddizione).

I **connettivi booleani** sono usati per costruire proposizioni complesse a partire da proposizioni semplici. Nella formalizzazione del linguaggio matematico i connettivi di cui faremo maggiore uso sono indicati con i simboli $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$. La loro traduzione approssimativa in italiano è la seguente:

- “ $\neg A$ ” significa “non A ” (negazione),
- “ $A \wedge B$ ” significa “ A e B ” (congiunzione),
- “ $A \vee B$ ” significa “ A o B ” (disgiunzione),
- “ $A \rightarrow B$ ” significa “se A , allora B ” (implicazione),
- “ $A \leftrightarrow B$ ” significa “ A se e solo se B ” (doppia implicazione).

Le lettere A, B sopra usate indicano generiche proposizioni.

I connettivi booleani sono *vero-funzionali* nel senso che il valore di verità di una proposizione composta dipende solo dal valore di verità delle proposizioni semplici che la costituiscono. Questo avviene secondo le seguenti **tavole di verità** che precisano il significato dei connettivi. Per semplicità scriviamo “**1**” per “vero” e “**0**” per “falso”. I possibili *valori di verità* che una proposizione può assumere sono dunque **1** e **0**. Iniziamo con la tavola della negazione.

A	$\neg A$
0	1
1	0

²Far dipendere la bontà di una dimostrazione da criteri semantici riguardanti il vero e il falso può non piacere a chi ritiene che siano invece le regole di inferenza ad avere la priorità: qui stiamo seguendo un altro punto di vista.

La tavola dice che la proposizione $\neg A$ è vera se A è falsa, ed è invece falsa se A è vera. La negazione inverte il valore di verità. Diamo ora le tavole degli altri connettivi.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Le prime due colonne indicano i quattro possibili valori di verità di A e B . Le altre colonne indicano i corrispondenti valori degli enunciati composti $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$.

La tavola di verità del connettivo \wedge dice che $A \wedge B$ è vera se e solo se sia A che B sono vere.

La tavola di verità del connettivo \vee dice che $A \vee B$ è vera se almeno uno di A e B è vero, senza escludere la possibilità che entrambi siano veri. Questa modalità di disgiunzione corrisponde al “vel” della lingua latina e viene chiamata *disgiunzione inclusiva*.

Oltre alla disgiunzione inclusiva $A \vee B$ esiste anche una *disgiunzione esclusiva*, corrispondente all’ “aut” latino, che indichiamo con il simbolo \oplus ed è definita dalla seguente tavola di verità:

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Consideriamo ora il connettivo \leftrightarrow . La tavola dice che $A \leftrightarrow B$ è vera se A e B sono entrambe vere o entrambe false. Se ciò capita diremo che A e B si *equivalgono* o che *sono equivalenti*. Scriveremo anche

$$A \equiv B$$

per affermare che A e B sono equivalenti.

Analizziamo infine la tavola dell’implicazione. Abbiamo visto che lo scopo di una dimostrazione è di garantire che le ipotesi implichino la tesi, quindi l’implicazione è in qualche modo il connettivo più importante. Dalla tavola dell’implicazione risulta che $A \rightarrow B$ è falsa solo nel caso in cui la premessa A è vera e il conseguente B è falso. In particolare se la premessa A è falsa, l’enunciato $A \rightarrow B$ è sempre vero a prescindere da quale sia l’enunciato B : da una premessa falsa segue ogni proposizione.

ESEMPIO 2.1. Supponiamo che il signor Rossi dica: “se vinco alla lotteria vado a fare il giro del mondo.” Questo corrisponde alla proposizione $A \rightarrow B$ dove A = vinco alla lotteria, B = vado a fare il giro del mondo. A meno di non fare un processo alle intenzioni, c’è un unico caso in cui possiamo affermare che il signor Rossi dice una cosa falsa: quando per l’appunto A è vera e B è falsa, ovvero lui vince alla lotteria, ma ciò nonostante non va a fare il giro del mondo. In tutti gli altri casi, compreso il caso in cui va a fare il giro del mondo pur non avendo vinto, non possiamo dire che abbia mentito. Ciò è in accordo con la tavola dell’implicazione.

Per affermare che A implica B scriveremo anche $A \implies B$ e diremo che “ A è una **condizione sufficiente** per B ” (nel senso che per poter asserire B è sufficiente che A sia vera)

e che “ B è una **condizione necessaria** per A ” (cioè, affinché A sia vera è necessario che lo sia anche B). Si noti che A e B si equivalgono se valgono entrambe le implicazioni $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow A$, ovvero A è una condizione *necessaria e sufficiente* per B .

ESEMPIO 2.2. Dato un qualsiasi numero reale x , vale l’implicazione

$$x > 2 \rightarrow x^2 > 4. \quad (*)$$

Infatti se il numero x è scelto in modo da verificare la condizione $x > 2$ allora entrambe le proposizioni $x > 2$ ed $x^2 > 4$ risultano vere, e pertanto lo è anche la (*) in base alla tavola del \rightarrow . Cosa avviene se invece il numero x è scelto in modo da *non* verificare la condizione $x > 2$? La cosa importante da osservare è che anche in quel caso la (*) è vera, in quanto una implicazione con premessa falsa è sempre vera. Stiamo dunque bene attenti a non confondere la verità di una implicazione $A \rightarrow B$ con la verità di A o con quella di B . La proposizione $x > 2 \rightarrow x^2 > 4$ è *sempre* vera (cioè anche per i valori di x che non verificano $x > 2$) ma la $x^2 > 4$ non è sempre vera: lo è *a condizione che* $x > 2$ (ma non solamente a quella condizione: x potrebbe essere < -2).

Si noti che l’implicazione inversa $x^2 > 4 \rightarrow x > 2$ non vale in generale. La $x > 2$ è sufficiente per avere $x^2 > 4$ ma non è necessaria: come già osservato la $x^2 > 4$ è vera anche nei casi in cui $x < -2$.

3. Come si dimostra una implicazione

La tavola dell’implicazione è congegnata in modo tale che dimostrare la validità di $A \rightarrow B$ è perfettamente equivalente a dimostrare B sotto l’ipotesi che A sia vera (perché intanto nel caso in cui A è falsa l’implicazione è vera comunque). Le dimostrazioni di un enunciato della forma $A \rightarrow B$ iniziano perciò spesso con una frase del tipo “Assumiamo A ” (che equivale a dire “mettiamoci, fino a nuovo ordine, in un caso in cui A è vero”), e procedono con il tentativo di verificare B sotto quella ipotesi. Se si riesce ad ottenere B all’interno della “sotto-dimostrazione” in cui vale l’ipotesi A , si può a quel punto “scaricare l’ipotesi A ” (cioè uscire dalla sotto-dimostrazione in cui è in vigore A) e concludere $A \rightarrow B$ (l’implicazione essendo vera anche se A è falso).

Per maggiore leggibilità può essere conveniente “indentare” le proposizioni della sotto-dimostrazioni rispetto a quelle della dimostrazione “madre”. In forma grafica l’introduzione e lo scaricamento di una ipotesi all’interno di una dimostrazione assume dunque la seguente forma, dove abbiamo indicato con D' la sotto-dimostrazione della dimostrazione D .

Passaggi vari della dimostrazione D
 Assumiamo p (inizio della sottodimostrazione D')
 Passaggi vari
 q
 Quindi $p \rightarrow q$, scaricando l’ipotesi p (ritorno a D).

Ovviamente tutte le proposizioni valide in D possono essere richiamate in D' ove ce ne sia bisogno. L’introduzione di altre ipotesi può dar luogo a sotto-sotto-dimostrazioni a qualunque livello di profondità.

4. Esempi

Il seguente esempio mostra che non sempre le tavole si accordano perfettamente con l’uso che si fa in italiano dei connettivi.

ESEMPIO 4.1. Date due proposizioni A, B , in base alle tavole $A \wedge B$ equivale a $B \wedge A$. Tuttavia questo non sempre concorda con l'uso della congiunzione "e" in italiano. Ad esempio si confronti "ho preso la medicina e mi sono sentito male" con "mi sono sentito male e ho preso la medicina". È presumibile che chi pronuncia queste frasi intenda "e" nel senso di "e poi", nel qual caso le due frasi assumono significati ben diversi. Usando però " \wedge " anziché "e", decidiamo di fare riferimento solamente alle tavole di verità escludendo quindi il significato "e poi".

Il seguente esempio illustra le tavole delle congiunzione e della disgiunzione. Ricordiamo che il valore assoluto $|x|$ di un numero reale x è uguale ad x se $x \geq 0$ ed è uguale a $-x$ se $x < 0$.

ESEMPIO 4.2. Siano x, y numeri reali.

- (1) La proposizione " $xy = 0$ " equivale a " $(x = 0) \vee (y = 0)$ ".
- (2) La proposizione " $|x| = 3$ " equivale a " $x = 3 \vee x = -3$ ".
- (3) La proposizione " $|x| < 3$ " equivale a " $-3 < x \wedge x < 3$ ".

ESERCIZIO 4.3. Siano a, b, c tre espressioni numeriche e supponiamo di sapere che $a \geq b$. La condizione aggiuntiva $b \geq c$ è sufficiente per poter concludere $a \geq c$? È anche necessaria?

SOLUZIONE: $b \geq c$ è sufficiente, ma non necessaria: infatti, fermo restando che $a \geq b$, la tesi $a \geq c$ potrebbe essere vera anche se b non fosse maggiore o uguale a c (ad esempio $a = 10, c = 5, b = 4$). In generale vale l'implicazione $(a \geq b \wedge b \geq c) \rightarrow a \geq c$, ma non l'implicazione inversa. \square

ESEMPIO 4.4. $xy = 0$ equivale a $(x = 0) \vee (y = 0)$, ma in generale non equivale a $(x = 0) \oplus (y = 0)$. Infatti se $x = y = 0$ abbiamo che $xy = 0$ è vera mentre $(x = 0) \oplus (y = 0)$ è falsa.

Sebbene in generale un enunciato della forma $A \oplus B$ non equivalga a $A \vee B$ (in quanto la prima è vera e la seconda è falsa nel caso in cui A, B siano entrambi veri) è tuttavia possibile che ulteriori informazioni mi portino a restringere l'insieme dei casi che si possono verificare (dai quattro possibili a priori) e a stabilire l'equivalenza. Il seguente esempio chiarirà la situazione.

ESEMPIO 4.5. Dati due numeri reali x, y le seguenti proposizioni sono equivalenti:

- (1) $x \leq 3$;
- (2) $(x < 3) \vee (x = 3)$;
- (3) $(x < 3) \oplus (x = 3)$.

Infatti se $x \leq 3$, allora o $x < 3$ o $x = 3$, e chiaramente non valgono entrambe le alternative. Quindi la (1) equivale alla (3). D'altra parte equivale anche alla (2) in quanto l'unico caso in cui $(x < 3) \vee (x = 3)$ potrebbe non essere equivalente a $(x < 3) \oplus (x = 3)$ sarebbe quello in cui le due proposizioni $x < 3$ ed $x = 3$ risultassero entrambe vere, ma questo, comunque si scelga x , è impossibile (stiamo naturalmente dando per note queste proprietà del $<$).

5. Basi di connettivi

Il seguente esempio mostra che possiamo ottenere il connettivo \vee a partire da \rightarrow, \neg .

ESEMPIO 5.1. Date due proposizioni A e B le seguenti proposizioni si equivalgono.

- (1) $\neg A \rightarrow B$;
- (2) $A \vee B$;
- (3) $\neg B \rightarrow A$ ".

Ad esempio: "Se non è zuppa è pan bagnato" equivale a: "O è zuppa o è pan bagnato", ed anche a "Se non è pan bagnato è zuppa". Altro esempio: "O mangi questa minestra o salti dalla finestra" equivale a "Se non mangi questa minestra salti dalla finestra".

OSSERVAZIONE 5.2. Nello scrivere le formule dell'esempio precedente abbiamo omesso le parentesi seguendo la convenzione \neg lega maggiormente degli altri connettivi e pertanto $\neg A \rightarrow B$ significa $(\neg A) \rightarrow B$ anziché $\neg(A \rightarrow B)$ (se avessimo voluto intendere la seconda formula avremmo dovuto mettere le parentesi). In generale per risparmiare parentesi seguiremo la convenzione che \rightarrow lega meno di tutti gli altri connettivi. Ad esempio $A \wedge B \rightarrow C$ è da intendersi come $(A \wedge B) \rightarrow C$.

Analogamente possiamo ottenere \rightarrow a partire da \vee, \neg .

ESEMPIO 5.3. Date due proposizioni A e B le seguenti proposizioni si equivalgono:

- (1) $A \rightarrow B$;
- (2) $\neg A \vee B$;

Ad esempio "se son rose fioriranno" equivale a "o non sono rose o fioriranno".

In presenza del \neg possiamo ottenere \rightarrow a partire da \wedge e viceversa.

- ESEMPIO 5.4. (1) $A \rightarrow B$ equivale a $\neg(A \wedge \neg B)$.
 (2) $\neg(A \rightarrow \neg B)$ equivale a $(A \wedge B)$.

Come esempio della (2) sia $A =$ dormo, $B =$ piglio pesci. La proposizione "non è vero che se dormo non piglio pesci" equivale a "dormo e piglio pesci".

ESEMPIO 5.5. $A \leftrightarrow B$ equivale a $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$.

ESEMPIO 5.6. La disgiunzione esclusiva può essere espressa usando gli altri connettivi: $A \oplus B$ equivale a $(A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$.

6. Equivalenze notevoli

Per semplificare espressioni complicate possono far comodo le seguenti equivalenze.

ESEMPIO 6.1. Date tre proposizioni p, q, r valgono le seguenti equivalenze:

- Leggi di idempotenza:
 - $p \wedge p \equiv p$;
 - $p \vee p \equiv p$;
- Legge della doppia negazione:
 - $\neg(\neg p) \equiv p$;
- Leggi commutative:
 - $p \wedge q \equiv q \wedge p$;
 - $p \vee q \equiv q \vee p$;
- Leggi associative:
 - $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$;
 - $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$;

- Leggi distributive:
 $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$;
 $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$;
- Leggi di De Morgan:
 $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p \vee \neg q)$;
 $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q)$;
- Leggi di assorbimento:
 $p \vee (p \wedge q) \equiv p$,
 $p \wedge (p \vee q) \equiv p$.

7. Esercizi vari

ESEMPIO 7.1. Sia t una proposizione vera, e sia f una proposizione falsa. Valgono le seguenti equivalenze:

- $t \wedge p \equiv p$;
- $t \vee p \equiv t$;
- $f \wedge p \equiv f$;
- $f \vee p \equiv p$;
- $p \wedge \neg p \equiv f$;
- $p \vee \neg p \equiv t$.

8. Esercizi

ESERCIZIO 8.1. Ricordiamo che (a, b) è l'insieme dei numeri reali nell'intervallo compreso tra a e b (estremi esclusi). Usando le leggi di De Morgan esprimere la negazione di $x \in (a, b)$.

SOLUZIONE: $x \in (a, b)$ significa $a < x \wedge x < b$. La sua negazione $\neg(x \in (a, b))$ (che si può anche scrivere $x \notin (a, b)$) equivale a $\neg(a < x) \vee \neg(x < b)$, cioè $x \leq a \vee b \leq x$. \square

ESERCIZIO 8.2. Usando le leggi di De Morgan esprimere la negazione di $|x| = 3$.

SOLUZIONE: $|x| = 3$ significa $x = 3 \vee x = -3$. La sua negazione $\neg(|x| = 3)$ equivale a $x \neq 3 \wedge x \neq -3$. (Dove $x \neq y$ sta per $\neg(x = y)$.) \square

ESERCIZIO 8.3. Nel dominio dei numeri reali $a < b$ implica $4ab < (a + b)^2$.
 Suggerimento: Conviene ragionare "all'indietro", cioè partiamo dalla conclusione e vediamo da cosa è implicata.

ESERCIZIO 8.4. Quali implicazioni valgono tra:

1. $(a \geq c) \wedge (b \geq d)$
2. $a + b \geq c + d$

SOLUZIONE: la prima implica la seconda. La seconda non implica sempre la prima. Ad esempio se $a = 10, b = 3, c = 4, d = 5$ la seconda è vera ma la prima è falsa. \square

ESERCIZIO 8.5. Trovare una formula equivalente a $x \geq |y|$ che non usi la funzione modulo.

SOLUZIONE: $x \geq |y|$ equivale a $(y \geq 0 \wedge x \geq y) \vee (y < 0 \wedge x \geq -y)$. \square

ESERCIZIO 8.6. Esprimere la relazione $x^2 \geq y^2$ senza usare i quadrati.

SOLUZIONE: Equivale a $|x| \geq |y|$, che a sua volta equivale a $x \geq |y| \vee x \leq -|y|$, che a sua volta equivale a $(y \geq 0 \wedge x \geq y) \vee (y \leq 0 \wedge x \geq -y) \vee (y \geq 0 \wedge x \leq -y) \vee (y \leq 0 \wedge x \leq y)$. Disegnare le regioni corrispondenti sul piano degli assi coordinati x, y . \square

ESERCIZIO 8.7. Trovare le formule equivalenti:

1. $\frac{1}{3}x^3 \geq 3x^2$
2. $x \geq 9$
3. $x \geq 9 \vee x = 0$
4. $x \neq 0 \rightarrow x \geq 9$

Stabilire inoltre quali implicazioni valgono tra le formule considerate.

SOLUZIONE: $x \geq 9$ implica $\frac{1}{3}x^3 \geq 3x^2$ ma non viceversa.

La formula $\frac{1}{3}x^3 \geq 3x^2$ equivale a $x \geq 9 \vee x = 0$. Infatti se prendiamo $x = 0$ sono entrambe vere. Anche nel caso $x \geq 9$ sono entrambe vere. Nel rimanente caso, ovvero per x minore di 9 ma diverso da zero, sono entrambe false.

Analogamente si stabilisce che la prima, la terza e la quarta sono equivalenti, e sono tutte e tre implicate dalla seconda. E ovviamente ogni formula implica anche se stessa. \square

ESERCIZIO 8.8. Esprimere i seguenti enunciati usando la relazione d'ordine \geq e i connettivi ma senza usare max e min: $x \geq \max\{a, b\}$, $x \geq \min\{a, b\}$, $\max\{a, b\} \geq \max\{c, d\}$, $\max\{a, b\} \geq \min\{c, d\}$, $\min\{a, b\} \geq \max\{c, d\}$, $\min\{a, b\} \geq \min\{c, d\}$.

9. Tautologie

Le proposizioni

$$\neg(\text{piove} \vee \text{tira vento}) \quad (1)$$

$$\neg((2 > 3) \vee (5 \leq 4)) \quad (2)$$

$$\neg((3 > 2) \vee (4 \leq 5)) \quad (3)$$

hanno tutte e tre la stessa *forma logica*, ovvero sono tutte della forma

$$\neg(A \vee B)$$

ma la prima potrebbe essere vera o falsa a seconda delle condizioni atmosferiche, la seconda è vera, e la terza è falsa. Come è evidente da questo esempio in generale la verità o falsità di una proposizione dipende dal suo contenuto, e non solo dalla sua forma logica. Ci sono però alcune proposizioni, chiamate *tautologie*, che sono vere semplicemente in virtù della loro forma logica, ovvero del modo in cui sono composte a partire da proposizioni più semplici usando i connettivi booleani. Diamo ora le definizioni precise.

DEFINIZIONE 9.1. Una **formula proposizionale** è una espressione costruito a partire da certe *variabili proposizionali* A, B, C, \dots i connettivi $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, e le parentesi, nel modo seguente. Ciascuna variabile proposizionale A, B, C, \dots è essa stessa una formula proposizionale, e se ϕ e ψ sono formula proposizionali lo sono anche $\neg\phi$, $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$, $(\phi \rightarrow \psi)$, $(\phi \leftrightarrow \psi)$. Niente altro è una formula proposizionale se non ciò che si ottiene con una applicazione ripetuta di queste regole.

Da ciascuna formula proposizionale possiamo ottenere infinite proposizioni, tutte della stessa forma logica, sostituendo le variabili proposizionali con proposizioni vere e proprie. Ad esempio, come abbiamo visto, la proposizione $\neg(\text{piove} \vee \text{tira vento})$ ha come forma logica la formula proposizionale $\neg(A \vee B)$.

DEFINIZIONE 9.2. Una formula proposizionale ϕ si dice una **tautologia** se è vera per ogni valore delle sue variabili, cioè otteniamo una proposizione vera comunque sostituiamo delle proposizioni al posto delle sue variabili. Una formula proposizionale ϕ è **contraddittoria** se è falsa per ogni valore delle sue variabili, ovvero se la sua negazione ϕ è una tautologia.

Ad esempio $A \vee \neg A$ è una tautologia, in quanto risulta vera sia nel caso in cui A è una proposizione vera, sia nel caso in cui A è una proposizione falsa. La formula $A \wedge \neg A$ è invece contraddittoria. La formula $\neg(A \vee B)$ non è nè tautologica nè contraddittoria. Un altro esempio di tautologia è $((A \rightarrow B) \wedge \neg B) \rightarrow \neg A$. Usando le tavole si vede infatti facilmente che essa risulta vera nei quattro possibili casi per i valori di A e B (A vera e B vera, A vera e B falsa, A falsa e B vera, A falsa e B falsa).

OSSERVAZIONE 9.3. Un metodo per riconoscere se una formula con n variabili proposizionali è una tautologia è quello di considerare i 2^n possibili casi per i valori di verità delle sue variabili e verificare usando le tavole che in ognuno dei casi la proposizione composta che ne risulta è vera. Esistono altri metodi per controllare se una formula è una tautologia, ma tutti i metodi noti richiedono una quantità di passaggi esponenziale al crescere del numero delle variabili. Il problema di stabilire se esistano metodi più efficienti (che permettano di riconoscere le tautologie in tempo polinomiale anziché esponenziale) è tuttora irrisolto.

Una proposizione ottenuta per sostituzione da una tautologia sarà anch'essa detta tautologia, e una proposizione ottenuta per sostituzione da una formula proposizionale contraddittoria sarà essa stessa detta contraddittoria. Ad esempio la proposizione “piove \vee \neg piove” è una tautologia essendo ottenuta per sostituzione dalla tautologia $A \vee \neg A$. Come si vede da questo esempio una tautologia ha contenuto informativo nullo. Affermare “piove o non piove” non ci dà alcuna informazione sul fatto se piova o meno. In generale un enunciato che esprime una tautologia è vero a prescindere dalla verità o falsità degli enunciati elementari che lo costituiscono, e quindi non comunica nulla riguardo alla verità o falsità di questi ultimi.

Visto che non comunicano informazione, è lecito domandarsi a cosa servano le tautologie. Una possibile risposta è che esse giocano un ruolo importante nelle dimostrazioni. Consideriamo il seguente esempio:

ESEMPIO 9.4. Consideriamo la seguente argomentazione logica: “L’assassino è il professore o l’assessore. Ma non è l’assessore. Quindi è il professore.” Per condurre il ragionamento, cioè per mostrare che la tesi è implicata logicamente delle premesse, abbiamo implicitamente utilizzato la tautologia $((A \vee B) \wedge \neg B) \rightarrow A$, applicandola al caso in cui A sta per “l’assassino è il professore”, e B sta per “l’assassino è l’assessore”.

ESEMPIO 9.5. Diamo altri schemi di ragionamento per tautologie. Per gli “esperti” abbiamo asteriscato le regole che possono portare a “dimostrazioni non costruttive”.

- (Modus ponens) Da A e $A \rightarrow B$ posso ottenere B .
- (Taglio) Da $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$ posso ottenere $A \rightarrow C$ (la formula B viene “tagliata”).

- (Terzo escluso*) Da $A \rightarrow B$ e $\neg A \rightarrow B$, posso ottenere B . (Il nome “terzo escluso” deriva dal fatto che i due casi A e $\neg A$ esauriscono tutte le possibilità.)
- (Altra forma del terzo escluso*) Posso inserire $A \vee \neg A$ in qualunque punto di una dimostrazione.
- (Ragionamento per assurdo*) Conveniamo di indicare con \perp una proposizione contraddittoria, come ad esempio una proposizione della forma $q \wedge \neg q$. La regola dell’assurdo dice che da $\neg p \rightarrow \perp$ posso ottenere p .
- (Negazione) Da $p \rightarrow \perp$ posso ottenere $\neg p$.
- (Doppia negazione*) Da $\neg\neg p$ posso ottenere p .
- (Ex falso quod libet) Da \perp posso ottenere qualunque altra proposizione.
- (Contronominale) Da $A \rightarrow B$ posso ottenere $\neg B \rightarrow \neg A$.
- Da $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ posso ottenere $(A \wedge B) \rightarrow C$.
- Da $(A \wedge B) \rightarrow C$ posso ottenere $A \rightarrow (B \rightarrow C)$.

Predicati e quantificatori

1. Predicati

Un **predicato** P associa a ciascun elemento x di un dato dominio Ω di oggetti una proposizione $P(x)$, che può essere vera o falsa. Ad esempio se P è il predicato “essere un numero primo” ed x è un numero, allora $P(x)$ è la proposizione “ x è un numero primo”. Useremo anche il termine “**relazione**” come sinonimo di “predicato”. Il termine relazione suggerisce una pluralità di soggetti che per l'appunto stanno in relazione, e quindi verrà impiegato preferibilmente per i predicati a più argomenti. Ad esempio il predicato “è minore di” tra numeri reali associa a ciascuna coppia ordinata (x, y) di numeri reali la proposizione “ $x < y$ ”, che sarà ovviamente vera o falsa a seconda di come si scelgono x ed y .

2. Quantificatore universale ed esistenziale

Introduciamo ora il quantificatore universale \forall (“per ogni”) e il quantificatore esistenziale \exists (“esiste”). Se P è un predicato unario, la proposizione $(\exists x \in \Omega) P(x)$ esprime il fatto che esiste almeno un oggetto x nel dominio Ω che verifica il predicato, ovvero tale che valga $P(x)$. La proposizione $(\forall x \in \Omega) P(x)$ dice che per tutti gli oggetti x del dominio Ω vale $P(x)$. La “ x ” è una variabile “muta”, ovvero al posto di “ x ” possiamo usare “ y ” o qualunque altra variabile senza cambiare il significato dell’espressione: dire che per tutti gli x vale $P(x)$ è la stessa cosa che dire che per tutti gli y vale $P(y)$. Valgono dunque le equivalenze

FATTO 2.1.

$$\begin{aligned}(\forall x \in \Omega) P(x) &\equiv (\forall y \in \Omega) P(y) \\(\exists x \in \Omega) P(x) &\equiv (\exists y \in \Omega) P(y).\end{aligned}$$

Se il dominio Ω su cui variano le variabili è sottinteso o irrilevante possiamo scrivere semplicemente $\forall x P(x)$ al posto di $(\forall x \in \Omega) P(x)$ ed $\exists x P(x)$ al posto di $(\exists x \in \Omega) P(x)$.

ESEMPIO 2.2. Sia \mathbb{R} l’insieme dei numeri reali. Dato un numero reale x , la proposizione $x^2 \geq 0$ è sempre vera. Per esprimere questo fatto scriviamo

$$(\forall x \in \mathbb{R})(x^2 \geq 0)$$

o semplicemente

$$\forall x(x^2 \geq 0)$$

se sottintendiamo che x vari in \mathbb{R} .

ESEMPIO 2.3. Consideriamo l’equazione $2x = 1$. Tale equazione ha soluzione nel dominio \mathbb{R} dei numeri reali (basta prendere $x = 1/2$), ma non nel dominio \mathbb{Z} dei numeri interi (perché l’unica soluzione $1/2$ non è intera). Possiamo dunque affermare che

$$(\exists x \in \mathbb{R})(2x = 1)$$

ma non che

$$(\exists x \in \mathbb{Z})(2x = 1).$$

Quest'ultimo enunciato è falso, ed è pertanto vera la sua negazione

$$(\neg \exists x \in \mathbb{Z})(2x = 1),$$

la quale si può anche esprimere scrivendo

$$(\forall x \in \mathbb{Z})(2x \neq 1),$$

ovvero “per ogni intero x , $2x$ è diverso da 1”.

In generale le negazioni trasformano i \forall in \exists e viceversa secondo le seguenti regole, il cui significato intuitivo dovrebbe essere chiaro:

FATTO 2.4.

$$\begin{aligned} \neg \forall x P(x) &\equiv \exists x \neg P(x) \\ \neg \exists x P(x) &\equiv \forall x \neg P(x) \end{aligned}$$

Ad esempio dire “non tutte le ciambelle riescono col buco” equivale a “esiste una ciambella senza buco”, e “non c'è rosa senza spine” equivale a “tutte le rose hanno le spine”.

OSSERVAZIONE 2.5. Si noti che se Ω è vuoto, $(\forall x \in \Omega) P(x)$ è sempre vero. Per convincersene osserviamo che la sua negazione equivale alla proposizione $(\exists x \in \Omega) \neg P(x)$, che è chiaramente falsa se Ω è vuoto. Ad esempio: “tutti gli unicorni bevono caffè” è una proposizione vera per il semplice fatto che gli unicorni non esistono e quindi non è possibile trovare un unicorno che non beva caffè. Quindi in generale non possiamo dire che $(\forall x \in \Omega) P(x) \implies (\exists x \in \Omega) P(x)$ a meno di non sapere che Ω è non vuoto.

Per predicati in più variabili possiamo quantificare separatamente ciascuna variabile.

ESEMPIO 2.6. Per esprimere il fatto che $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ è sempre vera, ovvero che vale per qualsiasi scelta di x, y (numeri reali), usiamo due quantificatori universali:

$$\forall x \forall y ((x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2)$$

che possiamo anche abbreviare con

$$\forall x, y ((x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2)$$

In generale possiamo scambiare l'ordine dei quantificatori se sono tutti universali o tutti esistenziali:

FATTO 2.7.

$$\begin{aligned} \forall x \forall y P(x, y) &\equiv \forall y \forall x P(x, y) \\ \exists x \exists y P(x, y) &\equiv \exists x \exists y P(x, y) \end{aligned}$$

Più complicato è il caso in cui abbiamo una alternanza di quantificatori \forall ed \exists come ad esempio in $\forall x \exists y P(x, y)$. Un enunciato di questa forma significa che per ogni x vale la proposizione $\exists y P(x, y)$, ovvero per ogni x è possibile trovare un y , che in generale dipenderà da x , che verifica $P(x, y)$. Se alteriamo l'ordine dei quantificatori il significato cambia: $\exists y \forall x P(x, y)$ significa che è possibile trovare un y che va bene per tutti gli x , ovvero esiste un y tale che $\forall x P(x, y)$.

ESEMPIO 2.8. Se il dominio delle variabili è un insieme di persone, e $P(x, y)$ è la relazione “ y è la mamma di x ”, $\forall x \exists y P(x, y)$ dice che ogni persona ha una mamma, mentre $\exists y \forall x P(x, y)$ asserisce l'esistenza di una persona y che è la mamma di tutti (inclusa se stessa).

ESEMPIO 2.9. La proposizione

$$\forall x \exists y (y > x)$$

esprime il fatto che, dato un x , esiste un y (che dipende da x) tale che $y > x$. Nel dominio dei numeri reali tale proposizione è vera: basta prendere $y = x + 1$. La proposizione

$$\exists y \forall x (y > x)$$

esprime invece l'esistenza di un elemento y che verifichi la condizione $\forall x (y > x)$, ovvero che è maggiore di ogni numero reale. Tale proposizione è ovviamente falsa.

Per comprendere il significato di una proposizione complessa conviene prima decifrare le proposizioni più semplici contenute al suo interno per poi risalire via via verso l'esterno. Lo stesso procedimento si può adottare nel momento in cui si tratta di scrivere una formula complessa (anziché leggerla). Il seguente esempio chiarirà cosa intendiamo dire.

ESEMPIO 2.10. Data una costante c consideriamo l'equazione $cx = 1$. Chiediamoci se l'equazione abbia una soluzione x (reale), ovvero se valga $\exists x (cx = 1)$. La risposta è positiva a condizione che $c \neq 0$: basta prendere $x = 1/c$. Vale quindi l'implicazione $c \neq 0 \rightarrow \exists x (cx = 1)$. Questa implicazione è vera per ogni valore di c (anche $c = 0$ visto che una implicazione con premessa falsa è vera), e possiamo quindi affermare

$$\forall c (c \neq 0 \rightarrow \exists x (cx = 1)).$$

Abbiamo costruito con poca fatica una proposizione con due quantificatori partendo dall'interno.

La comprensione di una proposizione con tre quantificatori alternati può essere difficile. Ad esempio $\forall x \exists y \forall z P(x, y, z)$ significa che per ogni a vale la proposizione $\exists y \forall z P(a, y, z)$, la quale a sua volta significa che esiste un b , in generale dipendente da a , che verifica la proposizione $\forall z P(a, b, z)$, la quale a sua volta significa che per ogni c vale $P(a, b, c)$. Anche in questo caso conviene partire dall'interno, e cercare di capire prima di tutto cosa significhi $\forall z P(a, b, z)$ (dipenderà ovviamente da chi è P).

3. Ambito di quantificazione

Dato un numero intero x , scriviamo $P(x)$ per “ x è pari” e $Q(x)$ per “ x è dispari”. La proposizione $\exists x P(x)$ dice “esiste un numero pari” e la proposizione $\exists x Q(x)$ dice “esiste un numero dispari”. Si tratta di due proposizioni vere, e pertanto lo è anche la loro congiunzione $\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$. Ciò è ben diverso dal dire $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$, la quale invece afferma l'esistenza di un x che verifica $P(x) \wedge Q(x)$, ovvero l'esistenza di un numero che è sia pari che dispari, cosa ovviamente falsa. Riepilogando:

OSSERVAZIONE 3.1. In generale, dati due predicati P e Q , l'enunciato

$$\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x) \tag{1}$$

non equivale a

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)). \tag{2}$$

L'enunciato (1) è la congiunzione di $A = \exists x P(x)$ e $B = \exists x Q(x)$, e poiché $\exists x Q(x)$ equivale a $\exists y Q(y)$, abbiamo

$$(1) \equiv \exists x P(x) \wedge \exists y Q(y).$$

La cosa importante da osservare è che $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$ è la *congiunzione* di due enunciati e quindi dal punto di vista sintattico va considerato come un enunciato che “inizia” con un \wedge , ovvero \wedge è il suo “connettivo principale” (anche se tipograficamente inizia con un \exists). All’interno di $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$ si trovano due enunciati con un \exists come connettivo principale, il primo è $\exists xP(x)$ e il secondo è $\exists xQ(x)$. La regola generale è che l’*ambito* di un quantificatore è limitato all’enunciato di cui lui è il connettivo principale, ovvero il quantificatore non agisce sulle variabili al di fuori del suo ambito.

Dimostrazioni e regole di inferenza

Abbiamo visto che lo scopo di una dimostrazione è quello di convincere qualcuno, ma soprattutto sé stessi, che una certa tesi segue da certe ipotesi. Diamo alcune regole generali per scrivere le dimostrazioni. Di alcune ne abbiamo già parlato in precedenza ma è bene riassumerle in forma sintetica.

1. Introduzione e scaricamento di una ipotesi

Ne abbiamo già parlato nella sezione 3 e basterà quindi uno schema sintetico:

Passaggi vari della dimostrazione D Assumiamo p (inizio della sottodimostrazione D') Passaggi vari q Quindi $p \rightarrow q$, scaricando l'ipotesi p (ritorno a D).

2. Ragionamento per tautologie:

Ne abbiamo già accennato nella sezione 9. La regola generale è la seguente. Se ϕ è una tautologia posso inserire ϕ in qualunque punto di una dimostrazione. Se $\phi \rightarrow \psi$ è una tautologia, e se nel corso di una dimostrazione ho ottenuto ϕ , posso ottenere ψ . Più in generale se $(\phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_n) \rightarrow \psi$ è una tautologia, e se ho ottenuto ϕ_1, \dots, ϕ_n , posso ottenere ψ . Detto in altri termini: se ho ottenuto ϕ_1, \dots, ϕ_n e in base alle tavole di verità riesco a mostrare che in tutti i casi in cui sono vere ϕ_1, \dots, ϕ_n è vera anche ψ , allora posso ottenere ψ .

3. Uguaglianza

Dato a , posso inserire $a = a$ in qualunque punto di una dimostrazione.

Vale inoltre la regola di sostituzione (vedi sezione 1.1): Da $a = b$ e $P(a)$ posso dedurre $P(b)$. In forma schematica:

$$\frac{a = b, P(a)}{P(b)}$$

La regola va interpretata nel senso che posso sostituire *qualche* occorrenza di a con b ma non è necessario sostituirle *tutte*. Ad esempio da $a = b$ e $Q(a, a)$ posso dedurre $Q(a, b)$.

L'equivalenza tra proposizioni è equiparata ad una uguaglianza: da $A \leftrightarrow B$ e $C[A]$ posso dedurre $C[B]$, dove $C[A]$ è una proposizione complessa contenente A al suo interno. Anche in questo caso si intende che possiamo sostituire *qualche* A con B , non necessariamente tutte.

4. Assiomi

In qualunque punto di una dimostrazione posso inserire le proposizioni che decido di “dare per buone”. Chiameremo tali proposizioni “assiomi”. Tecnicamente gli assiomi possono essere pensati come ipotesi generali che decidiamo di non scaricare mai.

In una dimostrazione “formale” è necessario specificare gli assiomi una volta per tutte e non si può dare per buono assolutamente nulla che non sia stato preventivamente inserito nella lista degli assiomi. Tuttavia nelle dimostrazioni informali saremo più rilassati e ci riserveremo la possibilità di inserire, via via che se ne presenti la necessità, tutto ciò che riteniamo di poter dare per buono. Ad esempio si può decidere di dare per buono che $2 + 2 = 4$ e dedurre che $3 \cdot (2 \cdot 2) = 3 \cdot 4$ in base alla regola di sostituzione. Oppure, supponendo di aver ottenuto due proposizioni della forma “ $(k \geq 6) \rightarrow B$ ” e “ $(k < 6) \rightarrow B$ ”, posso ottenere B in base ad un ragionamento per tautologie dando per buono che $k \geq 6$ equivalga alla negazione di $k < 6$.

5. Regole per i quantificatori

5.1. Esistenza costruttiva. Da $P(a)$ posso ottenere $\exists xP(x)$.

5.2. Esistenza non costruttiva. Da $\neg\forall xP(x)$ posso ottenere $\exists x\neg P(x)$.

5.3. Particolarizzazione. Da $\forall xP(x)$ posso ottenere $P(a)$, dove a è una qualunque espressione che abbia senso sostituire al posto di x . Ad esempio se x è una variabile di tipo “numero”, a deve essere una espressione numerica (come $2 + 4$, o $k + 4$, etc.), possibilmente contenente altre variabili al suo interno.

5.4. Generalizzazione. Se ho ottenuto $P(a)$ per un a “generico”, posso ottenere $\forall xP(x)$. Qui “generico” significa che a non deve comparire in alcuna ipotesi non ancora scaricata nel momento in cui ho ottenuto $P(a)$ (eventuali assiomi contano come ipotesi: quindi a non deve comparire negli assiomi). A livello intuitivo la regola è giustificata dal fatto che se sono riuscito ad arrivare a $P(a)$ senza fare alcuna ipotesi su a , nello stesso modo potevo arrivare a $P(x)$ per qualsiasi x .

ATTENZIONE: La regola *non* consente di dimostrare $P(a) \rightarrow \forall xP(x)$, ma solo di dimostrare $\forall xP(x)$ qualora si sia già riusciti a dimostrare $P(a)$ (con a generico).

5.5. Scelta di un elemento. Dopo aver ottenuto $\exists xP(x)$ si può proseguire la dimostrazione dicendo “sia a tale che $P(a)$ ”, ovvero si introduce l’ipotesi $P(a)$. Se a partire da questa ipotesi su a si riesce ad ottenere una proposizione Q che non contiene a , si può a questo punto ottenere Q scaricando l’ipotesi.

In forma grafica:

$\exists xP(x)$ Introduzione dell’ipotesi $P(a)$ (inizio della sottodimostrazione D') Passaggi vari Q (siamo ancora in D') Quindi Q , scaricando l’ipotesi $P(a)$ (ritorno alla dimostrazione principale).
--

A livello intuitivo la motivazione della regola è la seguente. Sapendo che esiste almeno un elemento che verifica P , posso immaginare di “sceglierne” uno e dargli come nome “ a ” (o un altro nome non precedentemente impiegato), e quindi l’ipotesi $P(a)$ è “gratuita”,

ovvero può essere effettuata “senza perdita di generalità” (per questo la posso poi scaricare a costo zero, ovvero senza introdurre implicazioni). Devo in ogni caso usare un nome “nuovo” per battezzare l’elemento scelto altrimenti potrei cadere in errore. Ad esempio se P è un predicato numerico e so che $\exists xP(x)$, non posso dire che vale $P(4)$ perché questa sarebbe ovviamente una ipotesi restrittiva, ma posso invece supporre senza perdita di generalità che valga $P(a)$: se uso “ a ” non sto infatti nè affermando nè escludendo che a sia proprio il numero 4, come è giusto che sia in mancanza di informazioni a riguardo.

ESERCIZIO 5.1. Cosa c’è di sbagliato nel seguente ragionamento? 2 è pari, quindi per la regola di generalizzazione tutti i numeri sono pari.

SOLUZIONE: Per concludere che 2 è pari ho usato alcune proprietà di 2 che o compaiono negli assiomi (ad esempio ci potrebbe essere l’assioma definitorio $2 = 1 + 1$) o in altre ipotesi implicite “date per buone”. Quindi 2 non può essere considerato come un elemento generico. \square

ESERCIZIO 5.2. Da $(\forall x(P(x) \rightarrow Q)$ e $\exists xP(x)$) ottengo Q .

SOLUZIONE: Assumiamo $\forall x(P(x) \rightarrow Q)$ e $\exists xP(x)$. Sia a tale che $P(a)$. Per particolareggiamento abbiamo $P(a) \rightarrow Q$. Siccome abbiamo anche $P(a)$ otteniamo Q per tautologie. Quindi Q , scaricando l’ipotesi $P(a)$. \square

ESERCIZIO 5.3. Si mostri che, in presenza delle altre regole, la regola “scelta di un elemento” equivale alla regola espressa dall’esercizio precedente.

6. Equivalenze notevoli

ESERCIZIO 6.1. Valgono le seguenti equivalenze:

$$\begin{array}{ll}
 \forall xP(x) & \equiv \quad \forall yP(y) \\
 \exists xP(x) & \equiv \quad \exists yP(y) \\
 \neg\forall xP(x) & \equiv \quad \exists x\neg P(x) \\
 \neg\exists xP(x) & \equiv \quad \forall x\neg P(x) \\
 \exists x(P(x) \vee Q(x)) & \equiv \quad \exists xP(x) \vee \exists xQ(x) \\
 \forall x(P(x) \wedge Q(x)) & \equiv \quad \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x) \\
 \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x) & \equiv \quad \exists x\exists y(P(x) \wedge Q(y)) \\
 \forall xP(x) \vee \forall xQ(x) & \equiv \quad \forall x\forall y(P(x) \vee Q(y)) \\
 \exists x(P(x) \wedge R) & \equiv \quad (\exists xP(x)) \wedge R \\
 \forall x(P(x) \vee R) & \equiv \quad (\forall xP(x)) \vee R \\
 \exists x(P(x) \vee R) & \equiv \quad (\exists xP(x)) \vee R \\
 \forall x(P(x) \wedge R) & \equiv \quad (\forall xP(x)) \wedge R
 \end{array}$$

dove “ $P(x)$ ” sta per “ x verifica il predicato P ”, “ $Q(x)$ ” sta per “ x verifica il predicato Q ”, e la proposizione R non dipende da x (ma potrebbe dipendere da altri parametri z, w, \dots).

ESERCIZIO 6.2.

$$(\exists xP(x)) \rightarrow Q \equiv \forall x(P(x) \rightarrow Q)$$

Per trovare altre equivalenze notevoli coinvolgenti l’implicazione e i quantificatori basta scrivere $A \rightarrow B$ nella forma equivalente $\neg A \vee B$ applicare le equivalenze precedentemente viste.

ESERCIZIO 6.3.

$$\exists x(P(x) \rightarrow Q) \equiv (\exists x\neg P(x)) \vee Q$$

SOLUZIONE: La prima formula equivale a $\exists x(\neg P(x) \vee Q)$, che equivale (in quanto Q non dipende da x) a $(\exists x\neg P(x)) \vee Q$. \square

Le equivalenze sopra viste sono sufficienti a spostare tutti i quantificatori verso l'esterno, come nell'esempio seguente:

ESERCIZIO 6.4. Si dimostri l'equivalenza:

$$\exists xP(x) \rightarrow \exists yQ(y) \equiv \forall x\exists y(P(x) \rightarrow Q(y))$$

Tutte le formule che abbiamo scritto in questa sezione sono esempi di “formule predicative”, ovvero espressioni costruite per mezzo dei connettivi e dei quantificatori a partire da certi simboli $P(-), Q, \dots$ che rappresentano dei predicati o delle proposizioni. Una formula predicativa è *logicamente valida* se è sempre vera indipendentemente da quali predicati e proposizioni sostituiamo al posto di tali simboli (e dal dominio in cui variano le variabili, purchè non sia vuoto). Le regole dimostrative che abbiamo dato sono in linea di principio sufficienti a dimostrare tutte le formule predicative logicamente valide.

7. Esercizi vari

ESERCIZIO 7.1. Formalizzare usando i connettivi logici e le operazioni e relazioni aritmetiche $+, \cdot, 0, 1, \leq$
 x è primo.
 x divide y .

ESERCIZIO 7.2. Formalizzare: “Ogni coppia di interi positivi ha un massimo comun divisore”.

ESEMPIO 7.3. (Uno o due quantificatori) Determinare quali formule sono vere in \mathbb{N} (cioè assumendo che il dominio delle variabili sia \mathbb{N}), quali in \mathbb{Z} , quali in \mathbb{R} .

$$\begin{aligned} &\forall x(x \geq 0) \\ &\exists x(x^2 > 3x) \\ &\forall x(x^2 > 3x) \\ &\forall x, y((x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2) \\ &\exists x, y((x + y)^2 = x^2 + 2x + 1) \\ &\forall x\forall y(x > y) \\ &\exists x\exists y(x > y) \\ &\forall x\exists y(x > y) \\ &\exists y\forall x(x > y) \\ &\forall x\exists y(x + y = 0) \\ &\exists x\forall y(x + y = 0) \\ &\forall x\exists y(xy = 1) \\ &\exists x\forall y(xy = 1) \\ &\exists x\forall y(xy = y) \end{aligned}$$

ESEMPIO 7.4. (Tre quantificatori) Determinare quali formule sono vere in \mathbb{Z} .

1. $\forall x \exists y \forall z (x + y = z)$
2. $\exists x \forall y \exists z (x + y = z)$
3. $\forall x \exists y \forall z (z(x + y) = z)$

ESEMPIO 7.5. (Per chi conosce le funzioni) Data $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, formalizzare usando i quantificatori: f è iniettiva. f è crescente. f è surgettiva. f è limitata. f è continua in 0, f è continua in tutti i punti. Formalizzare poi la negazione di ognuna spingendo le negazioni all'interno.

CAPITOLO 4

Insiemi

1. Appartenenza e notazioni

Un **insieme** è una qualsiasi collezione di oggetti. Ad esempio possiamo considerare l'insieme degli studenti di una data classe. Scriviamo $x \in A$ per indicare il fatto che l'oggetto x **appartiene** all'insieme A , cioè A contiene x come elemento. Per indicare il fatto che x non appartiene ad A scriviamo $\neg(x \in A)$ o per brevità $x \notin A$.

Indicheremo con il simbolo \emptyset l'insieme vuoto, ossia l'insieme che non contiene nessun elemento. Per denotare un insieme si possono elencare tra parentesi graffe gli elementi dell'insieme oppure si può specificare una proprietà caratteristica degli elementi dell'insieme. Ad esempio $\{2, 3, 5, 7, 11\}$ è l'insieme dei numeri primi minori o uguali a 11, che si può scrivere anche nella forma $\{x \mid x \text{ è un numero primo } \leq 11\}$ (si legge: l'insieme degli x tali che x è un numero primo ≤ 11). In generale la barra verticale si può leggere “tale che” e la notazione $\{x \mid P(x)\}$ indica dunque l'insieme degli oggetti x che verificano la condizione $P(x)$. Dato un oggetto a , dire che $a \in \{x \mid P(x)\}$ è la stessa cosa che dire $P(a)$:

$$a \in \{x \mid P(x)\} \iff P(a).$$

Una variante di questa notazione è la seguente. Se A è un insieme, scriviamo $\{x \in A \mid P(x)\}$ per indicare l'insieme degli elementi x di A che verificano la condizione $P(x)$. Abbiamo quindi:

$$a \in \{x \in A \mid P(x)\} \iff (a \in A) \wedge P(a).$$

Spesso quando si usa la notazione $\{x \mid P(x)\}$ si sottintende che x vari all'interno di un insieme A prefissato. Ad esempio $\{x \mid x \text{ è un numero primo } \leq 11\}$ è la stessa cosa di $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ è un numero primo } \leq 11\}$, dove \mathbb{N} è l'insieme dei numeri naturali.

ESEMPIO 1.1. Consideriamo l'insieme $A = \{\mathbb{N}, \{1, 2, 3\}, 4, +\}$. Si tratta di un insieme con 4 elementi ben distinti fra loro : l'insieme \mathbb{N} , l'insieme $\{1, 2, 3\}$, il numero 4 e il simbolo $+$. Dunque scriveremo:

$$\mathbb{N} \in A, \quad \{1, 2, 3\} \in A, \quad 4 \in A, \quad + \in A$$

Questi e solo questi sono gli elementi di A . Per esempio, non è vero che $1 \in A$, anche se $1 \in \mathbb{N}$ e $1 \in \{1, 2, 3\}$.

Due insiemi A, B sono uguali se hanno gli stessi elementi, ovvero, dato un oggetto qualunque x , vale la doppia implicazione $x \in A \leftrightarrow x \in B$. Ad esempio $\{11, 7, 5, 3, 2, \}$ è lo stesso insieme di $\{2, 3, 5, 7, 11\}$ anche se gli elementi sono elencati in modo diverso. Se scriviamo $\{11, 2, 3, 5, 7, 5\}$ otteniamo ancora una volta lo stesso insieme anche se il 5 è stato elencato due volte. Quando scriviamo un insieme nella forma $\{a, b, c, d, \text{etc.}\}$ l'unica cosa che conta è chi c'è e chi non c'è nell'elenco, l'ordine e le ripetizioni sono del tutto irrilevanti.

ESEMPIO 1.2. Quanti diversi insiemi compaiono nella seguente lista?

$$\{1, 5, 4, 5\}, \{5, 4, 1\}, \{5, 5\}, \{5\}, \{1, 3, 4, 5\}, \{5, 4, 3, 1\}, \{1, 3, 6\}$$

SOLUZIONE: Nella lista compaiono quattro insiemi distinti fra loro: $\{5\}$, $\{5,4,1\}$, $\{1,3,6\}$, $\{5,4,3,1\}$. \square

2. Stringhe

Non bisogna confondere gli insiemi con le **stringhe**, in cui a differenza che negli insiemi l'ordine e le ripetizioni contano. Ad esempio un numero di telefono non è un insieme di numeri ma è piuttosto una stringa di numeri. Per rendersene conto basta osservare che il numero di telefono 0502213261 è diverso da 0502213216, sebbene l'insieme delle cifre che vi compaiono sia lo stesso. Per indicare una stringa si possono usare le parentesi tonde anzichè le graffe: ad esempio il numero di telefono 0502213261 può essere identificato con la stringa $(0, 5, 0, 2, 2, 1, 3, 2, 6, 1)$, che è diversa da $(0, 5, 0, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 6)$ sebbene l'insieme $\{0, 5, 0, 2, 2, 1, 3, 2, 6, 1\}$ sia uguale a $\{0, 5, 0, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 6\}$ (entrambi sono uguali a $\{0, 5, 2, 1, 3, 6\}$).

Mentre per definire l'uguaglianza tra gli insiemi conta solo chi vi appartiene e chi no, per le stringhe conta anche l'ordine. In altre parole due stringhe sono uguali se hanno la stessa lunghezza, gli stessi primi elementi, gli stessi secondi elementi, eccetera.

ESEMPIO 2.1. Se vi si chiede di trovare tutti i valori x, y tali che $(1, 3) = (x, y)$ l'unica soluzione è $x = 1, y = 3$. Se invece vi si chiede di trovare tutti i valori x, y tali che $\{1, 3\} = \{x, y\}$ ci sono due soluzioni: $x = 1, y = 3$ oppure $x = 3, y = 1$ (in quanto $\{1, 3\}$ è uguale non solo a $\{1, 3\}$ ma anche a $\{3, 1\}$).

In generale per le stringhe di lunghezza due (dette anche coppie ordinate) vale il principio:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \wedge b = d$$

mentre invece, per quanto appena visto, per gli insiemi non vale:

$$\{a, b\} = \{c, d\} \iff a = c \wedge b = d$$

Vale invece (esercizio..) che $\{a, b\} = \{c, d\}$ se e solo se $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$.

3. Il prodotto cartesiano

DEFINIZIONE 3.1. Dati due insiemi A e B , il prodotto cartesiano $A \times B$ è l'insieme di tutte le coppie ordinate in cui il primo elemento è un elemento di A e il secondo elemento è un elemento di B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

ESEMPIO 3.2. Il piano cartesiano con ascisse e ordinate è una rappresentazione del prodotto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (abbreviato \mathbb{R}^2). Da questo potete capire bene come l'ordine sia importante per gli elementi di un prodotto cartesiano: per esempio il punto $(7, 5)$ nel piano è diverso dal punto $(5, 7)$.

ESEMPIO 3.3. Sia $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e sia $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Allora $A \times B$ ha $30 = 5 \cdot 6$ elementi, perché è costituito da tutte le coppie in cui il primo elemento è un elemento di A (5 scelte) e il secondo elemento è un elemento di B (6 scelte). Elenchiamoli tutti:

$$(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (1, 9), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8), (2, 9)$$

$$(3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (3, 8), (3, 9), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 8), (4, 9) \\ (5, 4), (5, 5), (5, 6), (5, 7), (5, 8), (5, 9)$$

Notate che $(4, 5)$ e $(5, 4)$ sono due elementi distinti, e che $(4, 4)$ e $(5, 5)$ appartengono ad $A \times B$ visto che $4 \in A \cap B$ e $5 \in A \cap B$.

In generale, se l'insieme A ha n elementi e l'insieme B ha m elementi, il prodotto cartesiano $A \times B$ ha $n \cdot m$ elementi.

Osserviamo che se $A \neq B$ allora l'insieme $A \times B$ è diverso da $B \times A$ (anche se i due insiemi hanno lo stesso numero di elementi). Per convincersene, prendiamo di nuovo in considerazione gli stessi insiemi $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ dell'esempio precedente; gli elementi di $B \times A$ sono sempre 30, ma sono:

$$(4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5) \\ (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (7, 1), (7, 2), (7, 3), (7, 4), (7, 5) \\ (8, 1), (8, 2), (8, 3), (8, 4), (8, 5), (9, 1), (9, 2), (9, 3), (9, 4), (9, 5)$$

L'elemento $(8, 1)$, per esempio, appartiene a $B \times A$ ma non ad $A \times B$. L'intersezione $(A \times B) \cap (B \times A)$ è costituita solo da 4 elementi:

$$(A \times B) \cap (B \times A) = \{(4, 4), (4, 5), (5, 4), (5, 5)\}$$

La definizione di prodotto cartesiano si generalizza immediatamente al caso del prodotto di n insiemi:

DEFINIZIONE 3.4. . Dati n insiemi (con $n \geq 2$) A_1, A_2, \dots, A_n , il prodotto cartesiano $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ è l'insieme di tutte le stringhe di n elementi in cui il primo elemento è un elemento di A_1 , il secondo elemento è un elemento di A_2 ... e, in generale, l' i -esimo elemento è un elemento di A_i :

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i\}$$

ESEMPIO 3.5. Se $C = \{0, 1\}$, $D = \{2, 3\}$, $E = \{0\}$, $F = \{6, 7, 8\}$, il prodotto cartesiano $C \times D \times F$ ha 12 elementi: $(0, 2, 6)$, $(0, 2, 7)$, $(0, 2, 8)$, $(0, 3, 6)$, $(0, 3, 7)$, $(0, 3, 8)$, $(1, 2, 6)$, $(1, 2, 7)$, $(1, 2, 8)$, $(1, 3, 6)$, $(1, 3, 7)$, $(1, 3, 8)$. Continuate l'esempio descrivendo i prodotti cartesiani

$$C \times D \times E, \quad C \times F \times F, \quad F \times F \times F.$$

4. Inclusione

DEFINIZIONE 4.1. Dati due insiemi A, B diciamo che A è incluso in B , o che A è un sottoinsieme di B (e scriviamo $A \subseteq B$) se ogni elemento di A è anche elemento di B . L'inclusione $A \subseteq B$ può essere espressa usando i quantificatori nel modo seguente

$$\forall x (x \in A \rightarrow x \in B).$$

Si noti che $A = B$ se e solo se valgono le due inclusioni $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$.

OSSERVAZIONE 4.2. I seguenti enunciati sono equivalenti:

$$(4.1) \quad \{x \mid P(x)\} \subseteq \{x \mid Q(x)\}$$

$$(4.2) \quad \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$$

Ad esempio dire che $\forall x (x \geq 9 \rightarrow x \geq 5)$ equivale a dire che la semiretta $\{x \mid x \geq 9\}$ è inclusa nella semiretta $\{x \mid x \geq 5\}$.

Osserviamo che, come conseguenza della Definizione 4.1 l'insieme vuoto \emptyset è un sottoinsieme di ogni insieme. Infatti, riscriviamo la definizione con $A = \emptyset$; otteniamo che \emptyset è un sottoinsieme di B se e solo se è vera:

$$z \in \emptyset \rightarrow z \in B$$

Una implicazione $p \rightarrow q$, come sappiamo, è vera solo nei seguenti casi:

- 1) p è falsa
- 2) p è vera e q è vera

Qui siamo nel caso 1), perché $z \in \emptyset$ è sempre una proposizione falsa, visto che \emptyset non contiene nessun elemento.

Dunque qualunque sia l'insieme B che consideriamo, vale $\emptyset \subseteq B$.

ESEMPIO 4.3. Sia B l'insieme $\{1, \{2, 3\}, \{4\}\}$. Tale insieme ha 3 elementi:

$$1 \in B, \quad \{2, 3\} \in B, \quad \{4\} \in B$$

Dunque fra gli elementi c'è il numero 1 e l'insieme $\{4\}$ che è un insieme costituito da un solo elemento, il numero 4. Vorrei sottolineare che 4 e $\{4\}$ sono due oggetti diversi. Scrivere $\{4\} \in B$ è giusto, mentre scrivere $4 \in B$ è sbagliato. Quali sono i sottoinsiemi di B ? Sono 8, guardiamoli uno per uno:

- Uno è \emptyset , come sappiamo.
- Poi ci sono tre sottoinsiemi costituiti da un solo elemento di B : il sottoinsieme $\{1\}$, il sottoinsieme $\{\{2, 3\}\}$ (notate che ci sono due parentesi graffe, perché $\{2, 3\}$ è elemento di B , dunque il sottoinsieme che è costituito da tale elemento si indica con $\{\{2, 3\}\}$) e il sottoinsieme $\{\{4\}\}$.
- Poi abbiamo i tre sottoinsiemi che sono costituiti da due elementi ciascuno: $\{1, \{2, 3\}\}$, poi $\{1, \{4\}\}$, e infine $\{\{2, 3\}, \{4\}\}$.
- Infine c'è l'insieme B stesso.

Per concludere con un esercizietto riassuntivo, provate a pensare cosa vogliono dire le seguenti proposizioni :

$$1 \in B, \{1\} \subseteq B, \{4\} \in B, \{\{4\}\} \subseteq B, 2 \notin B, 4 \notin B, \{2, 3\} \not\subseteq B, \{2, 3\} \in B$$

e verificate che sono tutte vere.

5. Le leggi per l'intersezione, l'unione e il complementare fra insiemi.

DEFINIZIONE 5.1. Dati A e B sottoinsiemi di un insieme universo Ω , definiamo:

- l'*intersezione* di A e B

$$A \cap B = \{x \in \Omega \mid x \in A \quad \wedge \quad x \in B\}$$

- l'*unione* di A e B

$$A \cup B = \{x \in \Omega \mid x \in A \quad \vee \quad x \in B\}$$

- la *differenza* A meno B

$$A - B = \{x \in \Omega \mid x \in A \quad \wedge \quad x \notin B\}$$

- il *complementare* di A in Ω

$$A^c = \{x \in \Omega \mid x \notin A\}$$

Queste operazioni insiemistiche obbediscono a delle regole che discendono direttamente dalle equivalenze notevoli per proposizioni elencate nell'Esempio 6.1:

TEOREMA 5.2. *Siano A, B, C sottoinsiemi di un insieme universo Ω . Allora valgono le seguenti identità:*

- *Leggi di idempotenza:* $A \cap A = A$, $A \cup A = A$
- *Legge della doppia negazione:* $(A^c)^c = A$
- *Leggi commutative:* $A \cap B = B \cap A$, $A \cup B = B \cup A$
- *Leggi associative:* $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$, $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- *Leggi distributive:* $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- *Leggi di De Morgan:* $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- *Leggi di assorbimento:* $A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$

DIMOSTRAZIONE. Le leggi contenute in questo teorema sono già automaticamente dimostrate se abbiamo dimostrato (con le tabelle di verità, per esempio) le corrispondenti equivalenze per proposizioni. Vediamo perché. Dimostriamo per esempio una delle leggi di De Morgan:

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Sappiamo che per tre generiche proposizioni p, q, r vale la legge di De Morgan

$$\neg (p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$$

Dato un elemento x nell'universo Ω , scegliamo queste tre proposizioni: p : " $x \in A$ ", q : " $x \in B$ ", r : " $x \in C$ ". Applicata a queste tre proposizioni particolari, cosa ci dice la legge di De Morgan? Dice che

$$\neg (x \in A \wedge x \in B)$$

è equivalente a

$$\neg (x \in A) \vee \neg (x \in B)$$

Tradotto nel linguaggio degli insiemi questo significa che $x \in (A \cap B)^c$ è equivalente a $x \in A^c \cup B^c$. Dunque quando si sceglie un elemento x dell'universo Ω la sua appartenenza all'insieme $(A \cap B)^c$ è equivalente all'appartenenza all'insieme $A^c \cup B^c$. \square

Naturalmente le leggi contenute nel teorema precedente si potrebbero dimostrare anche senza citare esplicitamente le leggi di equivalenza fra proposizioni. Per esercitare il nostro linguaggio, mostriamo con un esempio come si potrebbe procedere:

ESEMPIO 5.3 (Dimostrazione di una delle leggi distributive). Scriviamo la dimostrazione della prima delle due leggi, ossia

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Cominciamo col provare che

$$A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Per far questo dobbiamo dimostrare che se un elemento x di Ω appartiene a $A \cup (B \cap C)$ allora deve appartenere anche a $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. In simboli:

$$x \in A \cup (B \cap C) \implies x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Infatti se un elemento x appartiene a $A \cup (B \cap C)$ allora vuol dire che $x \in A$ o $x \in B \cap C$. Se $x \in A$ allora $x \in A \cup B$ e $x \in A \cup C$, dunque $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ come volevamo dimostrare. Se $x \in B \cap C$ allora, visto che $x \in B$ e $x \in C$ di nuovo vale che $x \in A \cup B$ e $x \in A \cup C$, dunque $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Resta ora da far vedere che

$$A \cup (B \cap C) \supseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Seguiamo come prima la strategia di mostrare che per un elemento $y \in \Omega$ vale

$$y \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \implies y \in A \cup (B \cap C)$$

Sia dunque $y \in A \cup B$ e $y \in A \cup C$. Perché queste due relazioni siano vere bisogna che $y \in A$ oppure, se ciò non è vero, allora deve essere $y \in B - A$ e $y \in C - A$. Nel primo caso (ossia $y \in A$) segue subito che $y \in A \cup (B \cap C)$ come volevamo dimostrare. Nel secondo caso, $y \in B - A$ e $y \in C - A$ implica che $y \in B$ e $y \in C$ e dunque $y \in B \cap C$, da cui di nuovo segue subito $y \in A \cup (B \cap C)$.

Facciamo ancora un esercizio in cui compare una dimostrazione dello stesso stile.

ESERCIZIO 5.4. $A \subseteq U \wedge (A \cap (U \setminus B) = \emptyset) \implies A \subseteq B$.

SOLUZIONE: Visto che dobbiamo dimostrare una implicazione cominciamo con l'assumere la premessa $A \subseteq U \wedge (A \cap (U \setminus B) = \emptyset)$ e cerchiamo di ottenere $A \subseteq B$. Ricordiamo che per definizione questo significa $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$. Consideriamo quindi un generico oggetto x , assumiamo $x \in A$, e cerchiamo di dimostrare $x \in B$. Per le ipotesi fatte sappiamo che $A \subseteq U$, e quindi x deve appartenere ad U . Se per assurdo non appartenesse a B mettendo insieme tutto ciò che sappiamo su x avremmo $x \in A \cap (U \setminus B)$, contraddicendo l'ipotesi che tale insieme è vuoto. \square

6. L'insieme delle parti

DEFINIZIONE 6.1. Dato un insieme A , l'insieme $\mathcal{P}(A)$ delle parti di A è l'insieme i cui elementi sono tutti i sottoinsiemi di A :

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$$

Osserviamo in particolare che $A \in \mathcal{P}(A)$ e $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$.

Per esempio, se $A = \{1, 2\}$, il suo insieme delle parti è costituito da 4 elementi:

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, A\}$$

Nel Paragrafo 4 (Esempio 4.3) abbiamo visto, contandoli uno per uno, che i sottoinsiemi di un insieme di tre elementi sono 8. Provate già da ora a intuire quanti sono gli elementi di $\mathcal{P}(A)$ se l'insieme di partenza A ha n elementi (discuteremo questa formula più avanti, nel Paragrafo 4 del Capitolo 9).

7. Esercizi

ESERCIZIO 7.1. Dati tre insiemi A, B, C in un universo Ω , consideriamo i seguenti insiemi:

$$X = A \cup B \cup C^c; \quad Y = [(A^c \cap B^c) \cap (B \cup C)]^c; \quad Z = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Dire se – qualunque sia la scelta di A, B, C – ci sono delle relazioni di inclusione fra gli insiemi X, Y, Z e anche se, in particolare, ci sono relazioni di uguaglianza.

SOLUZIONE: Per prima cosa usiamo le leggi di De Morgan per semplificare l'espressione che definisce Y :

$$Y = [(A^c \cap B^c) \cap (B \cup C)]^c = (A^c \cap B^c)^c \cup (B \cup C)^c =$$

ancora per De Morgan (e per la legge del doppio complementare)

$$= (A \cup B) \cup (B^c \cap C^c)$$

Usando la legge distributiva,

$$Y = (A \cup B) \cup (B^c \cap C^c) = (A \cup B \cup B^c) \cap (A \cup B \cup C^c)$$

Ora, $A \cup B \cup B^c$ è uguale all'insieme universo Ω e dunque abbiamo

$$Y = \Omega \cap (A \cup B \cup C^c) = A \cup B \cup C^c$$

Abbiamo a questo punto dimostrato che $Y = X$. Visto che Z e X si costruiscono a partire da $A \cup B$ ma nel caso di Z poi si prosegue con una intersezione e nel caso di X si prosegue con una unione (con C^c), si deduce che $Z \subseteq X = Y$. In generale non vale $Z = X$. \square

ESERCIZIO 7.2. Siano a, b numeri reali e consideriamo i seguenti insiemi:

$$(1) A = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \geq a \wedge y \geq b\};$$

$$(2) B = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \geq a \vee y \leq b\};$$

$$(3) C = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \geq a \wedge y < b\}.$$

(i) Quali inclusioni tra i tre insiemi sopra elencati valgono per ogni scelta di a, b ?

(ii) Quali inclusioni sono certamente false per ogni scelta di a, b ?

SOLUZIONE: L'esercizio ci chiede di controllare se, per ogni scelta di a e b , sono vere o false le seguenti sei proposizioni:

$$A \subseteq B \quad A \subseteq C \quad B \subseteq A \quad B \subseteq C \quad C \subseteq A \quad C \subseteq B$$

Innanzitutto notiamo che, vale $A \subseteq B$. Infatti A è incluso nell'insieme $D = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \geq a\}$ mentre $D \subseteq B$. Anche C è incluso in D , dunque è vera $C \subseteq B$. Gli insiemi C e A sono disgiunti, ossia $A \cap C = \emptyset$: infatti, un elemento (x, y) che appartenesse ad $A \cap C$ dovrebbe soddisfare contemporaneamente $y \geq b$ e $y < b$, il che è impossibile. Visto che gli insiemi A e C non sono vuoti, sono dunque false $A \subseteq C$ e $C \subseteq A$. Restano da valutare $B \subseteq A$ e $B \subseteq C$. Per vedere che la prima è falsa, basta mostrare un elemento che appartiene a B ma non ad A , per esempio l'elemento $(a, b-1)$, oppure anche $(a-1, b-1)$. Quest'ultimo elemento $(a-1, b-1)$ mostra anche che $B \subseteq C$ è falsa, dato che appartiene a B ma non a C . \square

ESERCIZIO 7.3. Si consideri un predicato $P(x)$ dove la variabile x va scelta nell'insieme A . Definiamo l'*insieme di verità* $V(P(x))$ di $P(x)$ come il sottoinsieme di A costituito dagli elementi $a \in A$ tali che $P(a)$ è vera:

$$V(P(x)) = \{a \in A \mid P(a) \text{ è vera} \}$$

Tradurre con delle formule contenenti i quantificatori \forall e \exists le seguenti affermazioni a riguardo di $V(P(x))$:

- $V(P(x)) = \emptyset$
- $V(P(x)) \neq \emptyset$
- $V(P(x)) \neq A$
- $V(P(x)) = A$

ESERCIZIO 7.4. Sia a un numero naturale e consideriamo i seguenti insiemi:

- (1) $A = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x + y \geq 2a\}$
- (2) $B = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \geq a \wedge y \geq a\}$
- (3) $C = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x < a \rightarrow y \geq a\}$
- (4) $D = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \geq a \rightarrow y < a\}$

- (i) Ci sono inclusioni tra i quattro insiemi sopra elencati che valgono per ogni scelta di a ?
- (ii) Quali inclusioni sono certamente false per ogni scelta del parametro a ?

ESERCIZIO 7.5. Si trovino degli insiemi A, B, C di numeri naturali che verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- (1) $A \cap B \cap C^c$ ha tre elementi,
- (2) $(A \cup B \cup C) \cap (A \cap B \cap C)^c$ ha dieci elementi.

ESERCIZIO 7.6. Si consideri la seguente uguaglianza insiemistica:

$$(*) \quad (A \cap B) \times C = A \times (B \cap C)$$

- (1) Stabilire se si possono scegliere gli insiemi A, B, C in modo che l'uguaglianza (*) sia vera.
- (2) Stabilire se si possono scegliere gli insiemi A, B, C in modo che l'uguaglianza (*) sia falsa.
- (3) Stabilire se (*) è sempre vera nel caso in cui $B \subseteq A$ e $C \subseteq A$.
- (4) Stabilire se (*) è sempre vera nel caso in cui $A \cup C \subseteq B$.

ESERCIZIO 7.7. Dati due insiemi A, B la loro differenza simmetrica $A \Delta B$ è definita da:

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

- (1) Dimostrare che $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$ (Quindi possiamo omettere le parentesi senza rischio di ambiguità).
- (2) Semplificare le espressioni
 - (i): $A \Delta A$,
 - (ii): $A \Delta B \Delta A \Delta B \Delta B$,

(iii): $A \Delta B \Delta A \Delta A \Delta B \Delta B$.

- (3) Supponendo che $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 3, 4\}$, elencare gli elementi degli insiemi (i), (ii) e (iii) sopra definiti.

ESERCIZIO 7.8. Si considerino i seguenti insiemi:

- $A = \{n \mid \exists k \in \mathbb{N} \ k \leq 3 \wedge n = 3k\}$;
- $B = \{2n + 1 \mid n \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq n \leq 5\}$;
- $C = \{(1, 2), (3, 4), (3, 3), (6, 7), (9, 9), (0, 3), (9, 7)\}$.

- (1) Elenca gli elementi di A e di B ;
 (2) Elenca gli elementi di $(A \times B) \cap (B \times A)$;
 (3) Elenca gli elementi di $D = \{b \in B \mid \exists a \in A (a, b) \in C\}$.

ESERCIZIO 7.9. Si considerino i seguenti sottoinsiemi di \mathbb{N} :

- $A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$;
- $B = \{4, 5, 6, 7, 9, 10, 11\}$;
- $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11\}$.

- (1) Elenca gli elementi di

$$D = (A \cap B) \times (C \cap (B^c \cup (B \cap A)))$$

(l'operazione di complementare si intende rispetto all'insieme \mathbb{N}).

- (2) Elenca gli elementi di

$$E = \{(x, y) \in D \mid x + y \leq 8\}$$

- (3) Quante sono le funzioni

$$g : A \cap B \rightarrow C \cap (B^c \cup (B \cap A))$$

tali che l'insieme

$$G_g = \{(x, g(x)) \in (A \cap B) \times (C \cap (B^c \cup (B \cap A)))\}$$

è un sottoinsieme di E ? (L'insieme G_g è il "grafico" della funzione g ; questo concetto verrà discusso più estesamente nel Capitolo 7).

ESERCIZIO 7.10. Sia $D \subset \mathbb{Z}$ l'insieme dei numeri pari, $T \subset \mathbb{Z}$ l'insieme dei numeri multipli di 3 e $C \subset \mathbb{Z}$ l'insieme dei multipli di 5.

- a) Costruire un insieme X tale che

$$D \cap T \cap C^c \subseteq X \subseteq (D \cup T \cup C) \cap (D \cap T \cap C)^c$$

- b) Dire quanti sono gli insiemi X che soddisfano la condizione del punto a) e la ulteriore richiesta

$$X \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 100\}$$

ESERCIZIO 7.11. Sia $P = \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ l'insieme delle parti di $\{1, 2, 3\}$.

- (1) Elencare gli elementi di P e dire quanti sono.

- (2) Stabilire se $\forall X, Y \in P (X \subseteq Y \vee Y \subseteq X)$.
- (3) Stabilire se $\exists X, Y \in P (X \subseteq Y \vee Y \subseteq X)$.
- (4) Stabilire se $\forall X \in P \exists Y \in P (X \cup Y = \{1, 2, 3\} \wedge X \cap Y = \emptyset)$.
- (5) Stabilire se $\exists X \in P \forall Y \in P (X \cup Y = \{1, 2, 3\} \wedge X \cap Y = \emptyset)$.
- (6) Stabilire se $\exists X \in P \forall Y \in P (X \cup Y = \{1, 2, 3\} \vee X \cap Y = \emptyset)$.

CAPITOLO 5

Induzione

1. Definizioni per induzione o “ricorsive”

Una successione di numeri è definita ricorsivamente se è data una regola che specifica il valore del termine iniziale e mostra come calcolarne un qualsiasi altro termine conoscendo il precedente. Un tipico esempio è la definizione della funzione fattoriale.

DEFINIZIONE 1.1. $0! = 1, (n + 1)! = (n + 1)n!$.

Prendendo $n = 4$ e applicando ripetutamente le regole otteniamo $4! = 4 \cdot 3! = 4 \cdot 3 \cdot 2! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$. Quindi il fattoriale $n!$ di un intero positivo n è il prodotto di tutti gli interi da 1 ad n .

In generale una definizione ricorsiva di una successione di numeri è data da una regola che specifica il valore del termine iniziale e mostra come calcolare il termine $n + 1$ -esimo a partire dal termine n -esimo.

Anche 2^n (il prodotto di n termini uguali a 2) può essere definito in maniera ricorsiva:

DEFINIZIONE 1.2. $2^0 = 1, 2^{n+1} = 2^n \cdot 2$.

Più in generale abbiamo:

DEFINIZIONE 1.3. Per ogni $x \in \mathbb{R}$, $x^0 = 1, x^{n+1} = x^n \cdot x$.

2. Dimostrazioni per induzione

Le dimostrazioni per induzione seguono un principio simile a quello delle definizioni ricorsive, con la differenza che in questo caso si tratta di uno strumento per *dimostrare* qualcosa anziché per *definire* qualcosa. Prima di enunciare il principio di induzione, illustriamolo con il seguente esempio.

ESEMPIO 2.1. Supponiamo di colorare i numeri interi con vari colori: verde, blu, giallo, rosso. Supponiamo di sapere che 4 è colorato di verde (Base dell'induzione) e che il successore di un numero verde è verde (Passo induttivo). Cosa possiamo concludere?

Un momento di riflessione ci porta inevitabilmente a:

SOLUZIONE: Tutti gli interi maggiori o uguali a 4 sono sicuramente verdi. Su quelli minori di 4 non abbiamo informazione: potrebbero essere verdi o di un altro colore. \square

Vediamo ora come applicare lo stesso tipo di ragionamento per risolvere il seguente problema:

ESERCIZIO 2.2. Per quali n vale $n! > 2^n$?

SOLUZIONE: Coloriamo di verde gli n che verificano $n! > 2^n$ e di rosso tutti gli altri. Facili calcoli mostrano che 0, 1, 2, 3 sono rossi ma 4 è verde. Chiediamoci cosa accade per i numeri maggiori di 4. A tal fine supponiamo che n sia un numero verde maggiore o uguale a 4, ovvero uno dei numeri ≥ 4 che verifica $2^n < n!$, e chiediamoci se il suo successore sia necessariamente verde, ovvero se $2^{n+1} < (n+1)!$. Quest'ultima è riscrivibile come $2 \cdot 2^n < (n+1)n!$. Visto che $2 < (n+1)$ e che $2^n < n!$ (in quanto stiamo supponendo che n sia verde), il prodotto dei termini a sinistra è minore del prodotto dei termini a destra, ovvero $2 \cdot 2^n < (n+1)n!$, che è proprio quello che volevamo. Abbiamo quindi mostrato che il successore di un qualsiasi numero verde maggiore di 4 è verde, e visto che 4 stesso è verde, ne segue che tutti gli interi ≥ 4 sono verdi, cioè $\forall n \geq 4$ vale $n! > 2^n$. \square

ESERCIZIO 2.3. Per quali $n \in \mathbb{N}$ vale $n^2 \leq 2^n$?

SOLUZIONE: Coloriamo di verde i numeri naturali n che verificano $n^2 \leq 2^n$ e di rosso tutti gli altri. Ad esempio facendo i calcoli si vede che 1, 2, 4, 5 sono verdi, ma 3 è rosso. Visto che 4 è verde, se riuscissimo a dimostrare che il successore di un numero verde maggiore o uguale a 4 è verde, ne potremmo concludere che tutti gli interi n maggiori o uguali a 4 sono verdi. Per fare questa verifica supponiamo dunque che $n \geq 4$ sia un numero verde, ovvero uno dei numeri che verifica $n^2 \leq 2^n$, e cerchiamo di capire se il suo successore debba necessariamente essere verde, ovvero se $(n+1)^2 \leq 2^{n+1}$. Osserviamo che $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 \leq 2^n + 2n + 1$, dove la disuguaglianza segue dal fatto che n era verde. Se riuscissimo a mostrare che

$$2^n + 2n + 1 \leq 2^{n+1} \quad (*)$$

avremmo concluso componendo le disuguaglianze. Affrontiamo dunque la verifica di (*). Il termine destro 2^{n+1} si lascia riscrivere come $2 \cdot 2^n = 2^n + 2^n$, e cancellando un 2^n a sinistra e a destra la (*) diventa:

$$2n + 1 \leq 2^n. \quad (**)$$

D'altra parte, siccome stiamo assumendo che n sia verde, abbiamo $n^2 \leq 2^n$, e pertanto per finire è sufficiente dimostrare che $2n + 1 \leq n^2$. Dividendo entrambi i membri per n , questa diventa $2 + 1/n \leq n$, che è sicuramente vera per $n \geq 4$ (anzi addirittura per $n \geq 3$) in quanto $1/n$ è minore di 1. Possiamo concludere che per ogni $n \geq 4$ vale $n^2 \leq 2^n$. \square

Il principio di induzione (forma semplice).

Supponiamo che $P(n)$ sia un predicato che dipende da un numero intero $n \in \mathbb{Z}$. Se, dato un numero intero n_0 , vale che:

- $P(n_0)$ è vera (*questa si chiama BASE dell'induzione*);
- per ogni intero $k \geq n_0$, è vera l'implicazione $P(k) \implies P(k+1)$ (*questo si chiama PASSO INDUTTIVO e la $P(k)$ si chiama IPOTESI INDUTTIVA*);

allora possiamo concludere che è vera la proposizione Q : “per ogni $n \geq n_0$, $P(n)$ è vera”.

Espresso a parole, il passo induttivo dice che il successore di un numero $\geq n$ che gode della proprietà P gode anch'esso della proprietà P . La base dice che n gode della proprietà P . Si noti che n può anche essere negativo. Ad esempio se $n = -3$ la conclusione è che P vale sugli interi maggiori o uguali a -3 .

Come potete notare, nell'enunciare il principio di induzione non abbiamo premesso la voce “Teorema”, o “Proposizione”. Per noi è come un assioma, ossia un fatto la cui validità

sta alla base di tutti i nostri ragionamenti. In effetti il principio di induzione è legato all'esistenza dei numeri naturali, e lo accettiamo così come accettiamo i numeri naturali.

3. Somme parziali di successioni

Cominciamo con un breve richiamo sulle sommatorie.

DEFINIZIONE 3.1. Sommatorie: data una successione¹ di numeri $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$ scriviamo $\sum_{i=m}^n a_i$ per indicare la somma di tutti i termini a_i della successione con i che varia tra m ed n (assumendo $m \leq n$). Ad esempio $\sum_{i=0}^4 a_i = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4$. Osserviamo che $\sum_{i=0}^0 a_i = a_0$ e $\sum_{i=0}^{n+1} a_i = (\sum_{i=0}^n a_i) + a_{n+1}$. Quest'ultima uguaglianza dice che la somma di tutti i termini a_i per i che va da 0 ad $n+1$ si può spezzare nella somma degli a_i per i che va da 0 ad n a cui va poi sommato l'ultimo termine a_{n+1} .

La variabile i è “muta”, nel senso che può essere sostituita con qualsiasi altra variabile non già utilizzata per altri scopi senza cambiare il significato dell'espressione. Ad esempio $\sum_{i=0}^n a_i$ può anche essere scritto come $\sum_{k=0}^n a_k$.

In questo paragrafo, studieremo alcune successioni “celebri” e troveremo delle formule per le somme dei primi n numeri della successione. Dimostreremo tali formule in vari modi (compresa l'induzione). Cominciamo dalla somma dei primi n numeri interi positivi.

ESERCIZIO 3.2. Dimostrare che, per ogni numero naturale positivo n vale:

$$\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2$$

SOLUZIONE: Proponiamo innanzitutto una “dimostrazione intuitiva”. Consideriamo un rettangolo $n \times (n+1)$ (in Figura 1 troviamo il disegno nel caso 4×5). Una spezzata come quella in figura lo divide in due parti di area $\sum_{i=1}^n i$, dunque vale che $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.




FIGURA 1. Un rettangolo 4×5 diviso in due parti ciascuna di area $1 + 2 + 3 + 4$.

Dimostriamo di nuovo la nostra formula, stavolta per induzione. Per prima cosa scegliamo il predicato $P(n)$. L'idea più semplice che viene in mente è quella giusta, e poniamo $P(n) = \text{“}\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2\text{”}$.

La base dell'induzione in questo caso consiste nel verificare che $P(1)$ è vera e il passo induttivo consiste nel verificare che per ogni intero $k \geq 1$, è vera l'implicazione $P(k) \rightarrow P(k+1)$.

¹Questo equivale a dire che, per ogni $i \in \mathbb{N}$, a_i è un numero intero. Sulle successioni torneremo in seguito con maggiori dettagli.

BASE. Questo non presenta difficoltà perché si verifica subito che $\sum_{i=1}^1$ è uguale a $\frac{1(1+1)}{2}$.

PASSO INDUTTIVO. Sia $k \geq 1$ un intero. Dobbiamo dimostrare che è vera l'implicazione:

$$\sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2} \rightarrow \sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{(k+1)(k+1+1)}{2}$$

Per far ciò basta dimostrare, che, se assumiamo vera la nostra ipotesi induttiva, ossia $\sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2}$, allora deve essere vera $\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{(k+1)(k+1+1)}{2}$.

Procediamo; scriviamo $\sum_{i=1}^{k+1} i$ spezzando la somma così:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \left(\sum_{i=1}^k i \right) + (k+1)$$

Ma l'ipotesi induttiva ci permette di scrivere, al posto di $\left(\sum_{i=1}^k i \right)$, il suo valore $\frac{k(k+1)}{2}$.

Dunque otteniamo

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{k(k+1)}{2} + k+1$$

che, riorganizzando il secondo membro, è proprio

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

come volevamo.

Il principio di induzione interviene a questo punto e ci permette di concludere che è vera la proposizione Q : “per ogni $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, $P(n)$, ossia per ogni $n \in \mathbb{N} - \{0\}$ la somma dei primi n numeri naturali positivi è uguale a $\frac{n(n+1)}{2}$.”

□

ESERCIZIO 3.3. Dato un numero intero positivo n , la somma dei primi n numeri dispari è n^2 .

SOLUZIONE: Diamo tre dimostrazioni.

La prima è di natura intuitiva e si riferisce alla Figura 2. Un quadrato di lato n e di area n^2 può essere ottenuto sommando n “cornici” di area dispari, precisamente di area $1, 3, 5, \dots, 2n-1$.

Proponiamo anche in questo caso una dimostrazione per induzione. Come predicato $P(n)$ scegliamo

$$P(n) : \sum_{i=0}^{n-1} (2i+1) = n^2$$




FIGURA 2. Il quadrato di lato 4 e area 4^2 si ottiene sommando “cornici” e quindi la sua area si può calcolare anche con la somma dei primi 4 numeri dispari: $1 + 3 + 5 + 7$.

BASE. Si verifica subito che $P(1)$ è vera visto che si traduce nell’uguaglianza $1 = 1$.

PASSO INDUTTIVO. Sia $k \geq 1$ un intero. Dobbiamo dimostrare che è vera l’implicazione:

$$\sum_{i=0}^{k-1} (2i + 1) = k^2 \rightarrow \sum_{i=0}^k (2i + 1) = (k + 1)^2$$

Procediamo; scriviamo $\sum_{i=0}^k (2i + 1)$ spezzando la somma così:

$$\sum_{i=0}^k (2i + 1) = \left(\sum_{i=0}^{k-1} (2i + 1) \right) + (2k + 1)$$

Ma l’ipotesi induttiva ci permette di scrivere, al posto di $\left(\sum_{i=0}^{k-1} (2i + 1) \right)$, il suo valore k^2 .

Dunque otteniamo

$$\sum_{i=0}^k (2i + 1) = k^2 + 2k + 1$$

che, riorganizzando il secondo membro, è proprio

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = (k + 1)^2$$

come volevamo.

Dimostriamo infine la formula ancora in un terzo modo. Possiamo esprimere la somma dei primi n numeri dispari con la sommatoria $\sum_{i=1}^n (2i - 1)$. Alcuni passaggi algebrici ci permettono di scrivere:

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = 2 \left(\sum_{i=1}^n i \right) + \sum_{i=1}^n (-1)$$

A questo punto conosciamo entrambe le sommatorie che compaiono nel membro di destra: la prima è uguale (vedi esercizio precedente) a $2(n(n + 1)/2)$, la seconda a $-n$. Dunque

abbiamo ottenuto che

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n(n + 1) - n = n^2$$

□

Generalizziamo:

ESEMPIO 3.4. Diremo che una successione di numeri reali a_0, a_1, \dots, a_n è una *progressione aritmetica* se le differenze $a_i - a_{i-1}$ sono tutte uguali fra loro (diciamo che siano tutte uguali al numero a). In generale una progressione aritmetica si può scrivere dicendo che, per ogni $i \in \mathbb{N}$, $a_i = ai + b$ per certi numeri reali fissati a e b .

Quanto vale $\sum_{i=0}^n (ai + b)$? Possiamo scrivere

$$\sum_{i=0}^n (ai + b) = a \left(\sum_{i=0}^n i \right) + \sum_{i=0}^n b = a(n(n + 1)/2) + (n + 1)b$$

Se in un problema capita di incontrare una sommatoria che non parte da 1 o da 0 ci si può sempre ricondurre, se conviene, al caso in cui parte da 1 o da 0. Ad esempio:

ESERCIZIO 3.5. Calcolare la somma di tutti i numeri dispari compresi tra 100 a 1000.

SOLUZIONE: Il primo dispari nell'intervallo è $101 = 2 \cdot 51 - 1$, l'ultimo è $999 = 2 \cdot 500 - 1$. Il valore cercato è $\sum_{i=51}^{500} (2i - 1) = \sum_{i=1}^{500} (2i - 1) - \sum_{i=1}^{50} (2i - 1) = 500^2 - 50^2$. □

Occupiamoci ora di un altro tipo di successioni, le *progressioni geometriche*. Cominciamo con questo esercizio:

ESERCIZIO 3.6. Dimostrare che, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{i=0}^n 1/2^i = 2 - 1/2^n$$

SOLUZIONE: Possiamo procedere per induzione, scegliendo il predicato $P(n) : \sum_{i=0}^n 1/2^i = 2 - 1/2^n$. La base dell'induzione si riduce alla seguente verifica: $1 = 2 - 1/2^0$. Il passo induttivo richiede, assumendo vero $\sum_{i=0}^n 1/2^i = 2 - 1/2^n$, di dimostrare che $\sum_{i=0}^{n+1} 1/2^i = 2 - 1/2^{n+1}$. Possiamo scrivere:

$$\sum_{i=0}^{n+1} 1/2^i = \left(\sum_{i=0}^n 1/2^i \right) + 1/2^{n+1}$$

A questo punto, usando l'ipotesi induttiva, otteniamo

$$\sum_{i=0}^{n+1} 1/2^i = 2 - 1/2^n + 1/2^{n+1}$$

Visto che $-1/2^n + 1/2^{n+1} = -1/2^{n+1}$ abbiamo trovato l'uguaglianza desiderata². □

²La somma che abbiamo appena calcolato richiama il paradosso di Zenone di Elea (si tratta in realtà di una variante del celebre paradosso). Quando ci avviciniamo ad un oggetto possiamo osservare il nostro moto così: percorriamo metà della distanza che ci separa, poi metà della distanza rimanente, e così via... Lo raggiungeremo mai? Vedi □ per qualche approfondimento

ESEMPIO 3.7. Diremo che una successione di numeri reali non nulli b_0, b_1, \dots, b_n è una *progressione geometrica* se i rapporti $\frac{b_i}{b_{i-1}}$ sono tutti uguali fra loro (diciamo che siano tutte uguali al numero k). In generale una progressione geometrica si può scrivere dicendo che, per ogni $i \in \mathbb{N}$, $b_i = ck^i$ per certi numeri reali non nulli fissati c e k .

Quanto vale $\sum_{i=0}^n ck^i$? Possiamo rispondere osservando che $\sum_{i=0}^n ck^i = c \sum_{i=0}^n k^i$. Se $k = 1$ allora la progressione geometrica è in realtà una successione costante, e la somma vale $ck(n+1)$. Se invece $k \neq 1$, possiamo partire calcolando

$$(1 + k + k^2 + \dots + k^n)(k - 1)$$

Svolgendo i calcoli si vede che molti termini si cancellano e rimane $k^{n+1} - 1$. Quindi vale:

$$1 + k + k^2 + \dots + k^n = \frac{k^{n+1} - 1}{k - 1}$$

e possiamo concludere che

$$\sum_{i=0}^n ck^i = c \frac{k^{n+1} - 1}{k - 1}$$

4. Esercizi

ESERCIZIO 4.1. Determinare per quali numeri naturali n si ha $2^n > n^2 + 3n + 1$.

SOLUZIONE: Si comincia con dei tentativi e si scopre subito che la disuguaglianza non è vera per $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$, mentre è vera per $n = 6$ in quanto $2^6 = 64 > 6^2 + 3 \cdot 6 + 1 = 55$. Proviamo allora per induzione che il predicato $T(n) : 2^n > n^2 + 3n + 1$ è vero per ogni $n \geq 6$. La base dell'induzione è stata già verificata. Dimostriamo allora il passo induttivo: fissiamo un intero k maggiore o uguale a 6 e proviamo che $T(k) \Rightarrow T(k+1)$. In altre parole, prendendo per vero che (ipotesi induttiva):

$$2^k > k^2 + 3k + 1$$

dobbiamo dimostrare che:

$$2^{k+1} > (k+1)^2 + 3(k+1) + 1$$

Osserviamo che $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k$ e allora, usando l'ipotesi induttiva possiamo scrivere:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2(k^2 + 3k + 1)$$

A questo punto ci rendiamo conto che se è vera la disuguaglianza:

$$2(k^2 + 3k + 1) > (k+1)^2 + 3(k+1) + 1$$

abbiamo finito perché vale allora la catena di disuguaglianze:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2(k^2 + 3k + 1) > (k+1)^2 + 3(k+1) + 1$$

Mostriamo dunque che

$$2(k^2 + 3k + 1) > (k+1)^2 + 3(k+1) + 1$$

Con qualche calcolo si nota che ciò equivale a

$$2k^2 + 6k + 2 > k^2 + 2k + 1 + 3k + 3 + 1 = k^2 + 5k + 5$$

che, semplificando ancora, diventa:

$$k^2 + k > 3$$

Visto che stiamo considerando i valori k maggiori o uguali a 6 questa ultima disuguaglianza è vera (se volete, potremmo concludere notando che, visto che $k \geq 6$, allora $k^2 + k \geq k \geq 6 > 3$). \square

ESERCIZIO 4.2. Determinare per quali numeri naturali n si ha $n! > 2^n$.

SOLUZIONE: Verifichiamo subito che la disuguaglianza non è vera per $n = 0, 1, 2$ e 3 , mentre è vera per $n = 4$ in quanto $4! = 24 > 16 = 2^4$. Proviamo allora per induzione che il predicato $P(n) : n! > 2^n$ è vero per ogni $n \geq 4$. La base dell'induzione $n = 4$ è stata appena verificata, dobbiamo quindi dimostrare il passo induttivo: fissiamo un intero k maggiore o uguale a 4 e proviamo che $P(k) \Rightarrow P(k+1)$.

Infatti $(k+1)! = (k+1) \cdot k! > (k+1)2^k > 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$, dove nella prima disuguaglianza abbiamo usato l'ipotesi induttiva, cioè $P(k)$ è vera, e nella seconda disuguaglianza usiamo $k+1 > 2$, sicuramente vero per ogni $k \geq 4$ (in realtà basta $k \geq 1$). \square

ESERCIZIO 4.3. Trovare (e dimostrare rigorosamente che è valida) una formula per la somma dei primi n (con $n \geq 1$) numeri pari positivi.

ESERCIZIO 4.4. Dimostrare che, per ogni $n \in \mathbb{N} - \{0\}$ vale:

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

ESERCIZIO 4.5. Dimostrare che, per ogni $n \in \mathbb{N} - \{0\}$ vale:

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

ESERCIZIO 4.6. Dimostrare per induzione la seguente formula per la somma dei cubi dei primi n numeri pari positivi:

$$\sum_{k=1}^n (2k)^3 = 2n^2(n+1)^2$$

ESERCIZIO 4.7. Dimostrare che per ogni $n \geq 1$ si ha

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sqrt{n}$$

ESERCIZIO 4.8. Sia $H_k = \sum_{i=1}^k \frac{1}{i}$. Si dimostri che $H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$.

ESERCIZIO 4.9. Dimostrare che per ogni intero $n \geq 1$ vale:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$$

ESERCIZIO 4.10. Dimostrare che, per ogni n intero positivo, esistono almeno n numeri primi distinti che dividono il numero $2^{2^n} - 1$. [Suggerimento: $2^{2^{n+1}} - 1 = (2^{2^n} - 1)(2^{2^n} + 1)$.]

ESERCIZIO 4.11. Consideriamo la formula

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{9}\right)\left(1 - \frac{1}{16}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{an + b}{cn}$$

Proporre dei valori $a, b, c \in \mathbb{Z}$ per cui questa formula è vera per ogni $n \geq 2$ e dimostrare in tale caso la formula per induzione. La scelta di tali valori è unica? Il numero $\frac{a}{c}$ è univocamente determinato?

ESERCIZIO 4.12. Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 14$ esistono interi non negativi $x, y \in \mathbb{N}$ tali che $n = 3x + 8y$.

ESERCIZIO 4.13. Trovare, motivando la risposta, il più piccolo numero $n_0 \in \mathbb{N}$ tale che, per ogni $n \geq n_0$, valga

$$4^n \geq n^2 + 5n + 1$$

ESERCIZIO 4.14.

a) Dati due numeri reali a, b compresi strettamente tra 0 e 1 si dimostri che

$$(1 - a)(1 - b) > 1 - a - b$$

b) Più in generale, dato $n \geq 2$ e dati n numeri reali a_1, a_2, \dots, a_n strettamente maggiori di zero e strettamente minori di uno, si dimostri per induzione che $(1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n) > 1 - a_1 - a_2 - \dots - a_n$.

ESERCIZIO 4.15 (Disuguaglianza di Bernoulli). Dimostrare che, per ogni $n \in \mathbb{N}$ e per ogni numero reale $x > -1$ vale

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx$$

ESERCIZIO 4.16. Da un fagiolo magico germoglia una piantina alta un centimetro, che ogni giorno cresce di $1/30$ della sua altezza. Dimostrare che dopo un anno la piantina avrà superato i 40 metri di altezza.

ESERCIZIO 4.17. Togliamo una casella da una scacchiera di $2^n \times 2^n$ caselle. Dimostrare che è possibile ricoprire la parte rimanente con tessere tutte uguali fatte a L che ricoprono 3 caselle.

Approfondimenti sull'induzione

1. I numeri di Fibonacci e le successioni definite per ricorrenza.

Consideriamo la successione di numeri F_n ($n \in \mathbb{N} - \{0\}$) così definita:

- $F_1 = 1$
- $F_2 = 1$
- per ogni $n \geq 3$,

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Per prima cosa “costruiamo” i primi numeri della successione :

$$F_1 = 1$$

$$F_2 = 1$$

$$F_3 = F_2 + F_1 = 1 + 1 = 2$$

$$F_4 = 2 + 1 = 3$$

$$F_5 = 3 + 2 = 5$$

$$F_6 = 5 + 3 = 8$$

$$F_7 = 8 + 5 = 13$$

$$F_8 = 13 + 8 = 21$$

e così via.. I numeri F_n si dicono **numeri di Fibonacci** (con riferimento a Leonardo da Pisa, che pubblicò sotto il nome di Fibonacci il suo libro più celebre, *Liber abaci*, nel 1202).

Intuitivamente è facile convincersi che questa successione è ben definita, ossia comunque scegliamo un numero $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, possiamo, in n passi, grazie a quel “e così via”, costruire il numero F_n .

Osserviamo che, per conoscere il numero F_n non ci basta conoscere il numero precedente F_{n-1} , ma bisogna conoscere anche il numero F_{n-2} .

Una successione di questo tipo, ossia in cui il termine ennesimo si costruisce sapendo i termini precedenti, si dice *successione definita per ricorrenza*. Perché la successione sia ben definita, bisogna conoscere i valori iniziali. Per esempio, nel caso di Fibonacci, visto che ogni termine chiama in causa i due precedenti, F_1 e F_2 devono essere noti fin dall'inizio (non possono essere ricavati dalla “regola ricorsiva” $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ che non li riguarda).

Un altro esempio di successione definita per ricorrenza potrebbe essere: $b_0 = 7$ e, per ogni $n \geq 1$, $b_n = 4b_{n-1}^2$.

2. Una formula per i numeri di Fibonacci

Partiamo da una successione, molto semplice, definita per ricorrenza:

$$a_0 = 1$$

$$a_n = 3a_{n-1} \quad \forall n \geq 1$$

Sappiamo trovare una *formula* per a_n , ossia una equazione che ci permetta di calcolare a_n direttamente, senza dover calcolare prima a_{n-1} ? Proviamo a scrivere i primi termini della

successione:

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = 3 \cdot 1 = 3$$

$$a_2 = 3 \cdot 3 = 3^2$$

$$a_3 = 3 \cdot 3^2 = 3^3$$

e così via.. Non ci mettiamo molto a congetturare che la formula giusta per a_n potrebbe essere:

$$a_n = 3^n$$

Dalla congettura alla dimostrazione in questo caso il passo è breve: ci basta notare che le due successioni $\{a_n\}$ e $\{3^n\}$ soddisfano le stesse leggi ricorsive e la stessa condizione iniziale, dunque si mostra facilmente per induzione che devono coincidere termine a termine, ossia $a_n = 3^n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Ma torniamo a Fibonacci: come possiamo trovare una formula per i numeri F_n ? Memori dell'esempio precedente, possiamo cominciare da un tentativo; proviamo se può funzionare una formula del tipo:

$$F_n = \alpha^n$$

per un qualche $\alpha \in \mathbb{R} - \{0\}$ (certamente $\alpha = 0$ non andrebbe bene, essendo $F_1 = 1..$).

Se fosse così, allora, visto che per $n \geq 3$ vale $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, dovremmo avere

$$\alpha^n = \alpha^{n-1} + \alpha^{n-2}$$

che, dividendo per α^{n-2} , diventa

$$\alpha^2 = \alpha + 1$$

Quindi il nostro numero α dovrebbe essere una radice del polinomio $x^2 - x - 1$. Sappiamo che le radici di tale polinomio sono 2:

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

Cominciamo a pensare di essere sulla strada giusta: infatti, rifacendo il ragionamento a ritroso, notiamo che con il nostro tentativo abbiamo trovato due numeri $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ e $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ che soddisfano:

$$\alpha^2 = \alpha + 1 \quad \beta^2 = \beta + 1$$

e quindi anche, per ogni $n \geq 3$:

$$\alpha^n = \alpha^{n-1} + \alpha^{n-2} \quad \beta^n = \beta^{n-1} + \beta^{n-2}$$

In altre parole, entrambe le successioni $\{\alpha^n\}$ e $\{\beta^n\}$ soddisfano la stessa richiesta ricorsiva di quella $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ della successione di Fibonacci: per $n \geq 3$, il termine n -esimo è somma dei due termini precedenti.

Il problema è che né α^1 né β^1 né α^2 né β^2 sono uguali a 1. In altre parole queste successioni non "partono" dagli stessi numeri con cui parte la successione di Fibonacci, dunque i loro termini sono poi molto diversi dai numeri di Fibonacci.

Possiamo rimediare però osservando che anche una successione del tipo $\{a \alpha^n + b \beta^n\}$, con a e b numeri reali qualunque, soddisfa la richiesta che il termine n -esimo sia somma dei due termini precedenti:

$$a\alpha^n + b\beta^n = (a\alpha^{n-1} + b\beta^{n-1}) + (a\alpha^{n-2} + b\beta^{n-2})$$

Dunque potremmo provare a scegliere a e b in modo che $a\alpha^1 + b\beta^1 = 1$ e $a\alpha^2 + b\beta^2 = 1$. Si vede subito che il sistema di equazioni:

$$\begin{aligned} a \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + b \frac{1 - \sqrt{5}}{2} &= 1 \\ a \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 + b \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^2 &= 1 \end{aligned}$$

ha come unica soluzione $a = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $b = -\frac{1}{\sqrt{5}}$. Dunque la successione $\{c_n\}$ dove per ogni $n \in \mathbb{N} - \{0\}$

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

soddisfa tutte le richieste della successione di Fibonacci.

Ripetiamo allora, per metterlo bene in evidenza, il ragionamento conclusivo: poiché entrambe le successioni soddisfano le stesse leggi ricorsive e le stesse condizioni iniziali, allora (si tratta di una facile applicazione del principio di induzione¹) coincidono, ossia $c_n = F_n$ per ogni $n \in \mathbb{N} - \{0\}$.

Abbiamo dunque dimostrato il seguente:

TEOREMA 2.1. *Dato $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, vale la seguente formula per i numeri di Fibonacci:*

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

3. Un metodo per le ricorrenze lineari a coefficienti costanti

Il metodo che abbiamo usato per trovare la formula per i numeri di Fibonacci è partito da un tentativo (-vediamo se per caso vanno bene soluzioni del tipo α^n -) ma si è rivelato poi molto efficace. Osserviamo che, ripetendo il ragionamento, il metodo si può generalizzare al caso di successioni definite per ricorrenza in cui la legge ricorsiva sia *lineare e a coefficienti costanti*, ossia del tipo:

$$a_n = \gamma_1 a_{n-1} + \gamma_2 a_{n-2} + \gamma_3 a_{n-3} + \cdots + \gamma_i a_{n-i}$$

dove i γ_j sono numeri reali.

Per esempio prendiamo, per $n \geq 4$, la legge

$$a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$$

con le condizioni iniziali

$$a_1 = 4 \quad a_2 = 22 \quad a_3 = 82$$

Lo stesso ragionamento usato per Fibonacci ci porta a cercare le radici del polinomio $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$. Tali radici sono 1, 2 e 3, allora tutte le successioni del tipo

$$a \cdot 1^n + b \cdot 2^n + c \cdot 3^n$$

¹Il predicato è $P(n)$: "per ogni $i \leq n$ vale $c_i = F_i$ ". La base è la verifica che $c_1 = F_1$. Il passo induttivo chiede di verificare che, se tutti i termini fino all'ennesimo coincidono, allora vale anche $c_{n+1} = F_{n+1}$.

con a, b, c numeri reali qualsiasi soddisfano la legge ricorsiva data. Facendo il sistema di tre equazioni per imporre che valgano le 3 condizioni iniziali si trova che la formula per la successione a_n è, per ogni $n \geq 1$:

$$a_n = -2 \cdot 1^n + (-3) \cdot 2^n + 4 \cdot 3^n$$

Quindi quando avete di fronte una successione definita per ricorrenza lineare e a coefficienti costanti potete tentare di applicare questo metodo per trovare la formula per il termine ennesimo.

Vi avvertiamo però che, quando cercate le radici del polinomio, possono capitare situazioni che richiedono ulteriori approfondimenti. Per esempio studiamo il caso di una successione che soddisfa, per $n \geq 2$, la legge

$$b_n = 4b_{n-1} - 4b_{n-2}$$

con le condizioni iniziali

$$b_0 = 5 \quad b_1 = 7$$

Il polinomio associato è $x^2 - 4x + 4$ che è $(x - 2)^2$ ossia ha come radice 2 “ripetuta due volte” (detto meglio: con molteplicità due). Questo è dunque un caso che prima non avevamo trattato: qui le successioni che si usano sono $\{2^n\}$ e la sua “derivata” $\{n2^{n-1}\}$. Le successioni del tipo

$$a 2^n + b n 2^{n-1}$$

con a, b numeri reali qualsiasi soddisfano tutte la legge ricorsiva data. Facendo il sistema di due equazioni per imporre che valgano le due condizioni iniziali si trova che la formula per la successione b_n è, per ogni $n \geq 0$:

$$b_n = 5 \cdot 2^n - 3 \cdot n 2^{n-1}$$

Altre difficoltà ancora possono sorgere, ma per ora non possiamo dire di più; vorremmo però intanto incuriosirvi con alcune domande, che forse vi sarete posti anche voi: e se il polinomio che troviamo non avesse radici reali? O se ne avesse poche, cioè meno del suo grado? E poi, chi ci garantisce che il sistema finale che mette in gioco le condizioni iniziali abbia sempre una unica soluzione? ²

Suggerimento per una piccola ricerca. Il numero $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ è il cosiddetto “rapporto aureo”, ossia il rapporto fra la lunghezza di un segmento e quella della sua “sezione aurea”. Sapete cosa è?

4. Forme equivalenti del principio di induzione: il principio del minimo e il principio di induzione forte

Ci sono altri due modi con cui si può enunciare il principio di induzione: l'assioma del buon ordinamento (detto anche principio del minimo) e il principio di induzione “forte”. Anche se a prima vista non sembrerebbe, si può in realtà dimostrare che il principio di induzione, il principio di induzione forte e l'assioma del buon ordinamento sono equivalenti. Come conseguenza pratica, questo vuol dire che se un problema si può risolvere usando uno di questi tre assiomi, allora c'è sicuramente il modo di risolverlo anche usando uno qualunque

² Le risposte a questi dubbi passano attraverso l'introduzione dei numeri complessi e lo studio dei sistemi in algebra lineare, vedi per esempio [].

degli altri due.

Il principio di induzione forte.

Supponiamo che $P(n)$ sia un predicato che dipende da un numero naturale $n \in \mathbb{N}$. Se, dato un numero naturale n_0 , vale che:

- $P(n_0)$ è vera (*questa si chiama BASE dell'induzione*);
- per ogni intero $k \geq n_0$, è vera l'implicazione

$$(P(n_0) \wedge P(n_0 + 1) \wedge \cdots \wedge P(k)) \rightarrow P(k + 1)$$

(*questo si chiama PASSO INDUTTIVO e la $P(n_0) \wedge P(n_0 + 1) \wedge \cdots \wedge P(k)$ si chiama IPOTESI INDUTTIVA*);

allora possiamo concludere che è vera la proposizione Q : “per ogni $n \geq n_0$, $P(n)$ è vera”.

Osserviamo che, in questo caso, la base dell'induzione è la stessa del normale principio di induzione, ma il passo induttivo è diverso. Nell'induzione normale, si deve dimostrare che, per ogni intero $k \geq n_0$, è vera l'implicazione $P(k) \rightarrow P(k + 1)$. Questo si traduce nel tentativo di dimostrare $P(k + 1)$ assumendo come vera la $P(k)$. Dunque, nel momento in cui dimostriamo la $P(k + 1)$, abbiamo un'arma a nostro vantaggio, ossia la $P(k)$.

Nell'induzione forte, invece, il passo induttivo chiede di dimostrare che, per ogni intero $k \geq n_0$, è vera l'implicazione

$$(P(n_0) \wedge P(n_0 + 1) \wedge \cdots \wedge P(k)) \rightarrow P(k + 1)$$

Questo si traduce come prima nel tentativo di dimostrare la $P(k + 1)$, ma stavolta si possono assumere come vere tutte le proposizioni $P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(k)$; dunque nel momento in cui dimostriamo la $P(k + 1)$ siamo più forti (ecco perché si chiama induzione “forte”), perché abbiamo a nostro vantaggio molte armi, non solo la $P(k)$, che avevamo anche nell'induzione normale, ma anche le altre proposizioni $P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(k - 1)$ (*ricordatevi però che siamo più forti solo apparentemente, perché in realtà l'induzione forte è equivalente all'induzione semplice*).

ESEMPIO 4.1. Dimostrare usando l'induzione forte che ogni numero intero ≥ 2 o è primo o si può scrivere come prodotto di numeri primi³.

La proposizione che vogliamo provare per induzione forte è Q : “per ogni $n \geq 2$ il numero n o è primo o si può scrivere come prodotto di numeri primi”.

Consideriamo dunque il predicato $P(n)$: “il numero n o è primo o si può scrivere come prodotto di numeri primi”.

La base, ossia la dimostrazione di $P(2)$, è immediata, perché 2 è appunto un numero primo.

Adesso occupiamoci del passo induttivo. Supponiamo (induzione forte!) che siano vere tutte le proposizioni $P(j)$ con $2 \leq j \leq k$ e cerchiamo di dimostrare che è vera $P(k + 1)$, ossia dobbiamo dimostrare che: “il numero $k + 1$ o è primo o si può scrivere come prodotto di numeri primi”.

³Chi vuole rivedere la definizione di numero primo può consultare più avanti il Capitolo 13.

Ora si possono verificare due casi: o $k + 1$ è primo, e in tal caso la dimostrazione del passo induttivo è già finita, oppure $k + 1$ non è primo. In questo secondo caso, allora $k + 1$ è composto e si potrà scrivere come prodotto di due numeri a e b , $k + 1 = ab$, dove $1 < a < k + 1$ e $1 < b < k + 1$. Quindi a e b sono tali che le proposizioni $P(a)$ e $P(b)$ risultano vere per ipotesi induttiva, garantendoci che a e b o sono primi o si possono scrivere come prodotto di numeri primi. Di conseguenza $k + 1 = ab$ si scrive come prodotto di numeri primi (quelli della decomposizione di a per quelli della decomposizione di b ...).

OSSERVAZIONE 4.2. Per dimostrare questa stessa proposizione usando l'induzione semplice, basta cambiare il predicato, quello giusto è $T(n)$: "ogni numero intero maggiore o uguale a 2 e minore o uguale a n è o primo o prodotto di primi". Provate a completare la dimostrazione, che è simile alla precedente

Quando, nel Capitolo 5 abbiamo introdotto il principio di induzione abbiamo detto che è legato alla esistenza dei numeri naturali. Questo viene messo particolarmente in luce se enunciamo il principio di induzione in questa forma:

Assioma del buon ordinamento (chiamato anche Principio del minimo).

Ogni sottoinsieme NON VUOTO di \mathbb{N} ha un elemento minimo.

Vedremo più avanti in questo corso alcune dimostrazioni in cui risulta naturale applicare l'induzione nella forma data dall'assioma del buon ordinamento. Per il momento torniamo all'esempio precedente e vediamo come il principio del minimo possa essere usato per dare una variante della dimostrazione.

ESEMPIO 4.3. Dimostrare usando il principio del minimo che ogni numero intero ≥ 2 o è primo o si può scrivere come prodotto di numeri primi.

Consideriamo il predicato $P(n)$: "il numero n o è primo o si può scrivere come prodotto di numeri primi" e sia S l'insieme dei numeri interi $m \geq 2$ tali che la proposizione $P(m)$ è falsa.

Osserviamo che dimostrare l'enunciato equivale a dimostrare che S è vuoto. Procediamo per assurdo e supponiamo dunque per assurdo che S non sia vuoto. Allora S , che è un sottoinsieme non vuoto di \mathbb{N} , per il principio del minimo ha un elemento minimo, che chiamiamo s .

Riassumendo, cosa sappiamo di s ? Sappiamo che è un intero ≥ 2 tale che $P(s)$ è falsa, ossia che non è né primo né prodotto di primi, e che è il più piccolo numero con queste caratteristiche.

In particolare, non essendo primo si potrà scrivere come prodotto di due numeri a e b , $s = ab$, dove $1 < a < s$ e $1 < b < s$. Quindi a e b , essendo ≥ 2 e strettamente minori di s sono tali che le proposizioni $P(a)$ e $P(b)$ sono vere (altrimenti sarebbe uno di loro, e non s , il minimo dell'insieme S ..). Questo vuol dire che a e b sono o primi o prodotto di primi e ci permette di ottenere una decomposizione in primi di s . Abbiamo ottenuto un assurdo, perché s per costruzione non può ammettere una decomposizione in primi.

Siccome aver assunto che S sia diverso dall'insieme vuoto ci ha portati ad un assurdo, abbiamo dunque dimostrato che $S = \emptyset$ come volevamo.

5. Esercizi

ESERCIZIO 5.1. Sia $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ la successione così definita:

$$\begin{aligned} u_0 &= 0 \\ u_{k+1} &= 3u_k + 3^k \end{aligned}$$

Dimostrare che $u_k = k3^{k-1} \forall k \in \mathbb{N}$.

SOLUZIONE: Base: $u_0 = 0 = 0 \cdot 3^{-1}$.

Passo Induttivo: suppongo che, per un $k \geq 0$, sia vero $u_k = k3^{k-1}$ (ipotesi induttiva) e voglio dimostrare $u_{k+1} = (k+1)3^k$. Ma $u_{k+1} = 3u_k + 3^k$ per come è definita la successione. Ora, utilizzando l'ipotesi induttiva posso scrivere che

$$3u_k + 3^k = 3(k3^{k-1}) + 3^k = k3^k + 3^k = (k+1)3^k$$

In conclusione ho trovato $u_{k+1} = (k+1)3^k$ come volevo. Il principio di induzione garantisce allora che $u_k = k3^{k-1} \forall k \in \mathbb{N}$. \square

ESERCIZIO 5.2. Sia $\{(a_n, b_n)\}_{n \geq 0}$ una successione di elementi di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definita da

$$\begin{cases} (a_0, b_0) = (1, -1), \\ (a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_n + b_n, a_n - b_n) \text{ per } n \text{ maggiore o uguale a } 0. \end{cases}$$

Dimostrare che per ogni $n \geq 0$ si ha:

- (i) la somma $a_n + b_n$ è un numero pari,
- (ii) $(a_{2n}, b_{2n}) = (2^n, -2^n)$,
- (iii) $(a_{2n+1}, b_{2n+1}) = (0, 2^{n+1})$.

SOLUZIONE: (i) Per $n = 0$ abbiamo $a_0 + b_0 = 1 - 1 = 0$ che è un numero pari.

Inoltre per ogni intero naturale n abbiamo $a_{n+1} + b_{n+1} = (a_n + b_n) + (a_n - b_n) = 2a_n$; ciò prova che $a_{n+1} + b_{n+1}$ è un numero pari.

- (ii) Osserviamo che per $n \geq 1$, usando due volte la definizione induttiva della successione, abbiamo

$$\begin{aligned} (a_{2(n+1)}, b_{2(n+1)}) &= (a_{2n+1} + b_{2n+1}, a_{2n+1} - b_{2n+1}) \\ &= (a_{2n} + b_{2n} + a_{2n} - b_{2n}, a_{2n} + b_{2n} - a_{2n} + b_{2n}) \\ &= (2a_{2n}, 2b_{2n}). \end{aligned}$$

Possiamo ora facilmente dimostrare per induzione che il predicato $p(n) : (a_{2n}, b_{2n}) = (2^n, -2^n)$ è vero per ogni intero naturale $n \geq 0$. Per quel che riguarda la base dell'induzione abbiamo $(a_0, b_0) = (1, -1) = (2^0, -2^0)$ dalla definizione e quindi $p(0)$ è vera.

Vediamo ora il passo induttivo. Supponiamo quindi vera $p(k)$ e dimostriamo che anche $p(k+1)$ è vera. Per quanto visto sopra abbiamo $(a_{2(k+1)}, b_{2(k+1)}) = (2a_{2k}, 2b_{2k}) = (2 \cdot 2^k, -2 \cdot 2^k) = (2^{k+1}, -2^{k+1})$. La proposizione $\forall n \geq p(n)$ è quindi provata.

- (iii) Usando quanto appena dimostrato nel punto precedente e la definizione induttiva della successione abbiamo: $(a_{2n+1}, b_{2n+1}) = (a_{2n} + b_{2n}, a_{2n} - b_{2n}) = (2^n - 2^n, 2^n + 2^n) = (0, 2^{n+1})$. E quindi quanto richiesto è provato. \square

ESERCIZIO 5.3. Definiamo per ricorrenza $a_0 = 0, a_1 = 12$ e $a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n$. Trovare una formula per a_n .

ESERCIZIO 5.4. Si consideri la successione data da $a_0 = 1$ e $a_{n+1} = 2a_n + 3$.

- a) Si dimostri che, per ogni $n \geq 1$, $2^n \mid a_n + 3$.
 b) Si trovi una formula per a_n .

ESERCIZIO 5.5. Si consideri la successione data da $a_0 = 1$, $a_1 = 1$ e $a_n = a_{n-2} + n$.

- a) Trovare, motivando la risposta, il più piccolo numero $n_0 \in \mathbb{N}$ tale che, per ogni $n \geq n_0$, vale $a_n \geq 2n$.
 b) Trovare una formula per a_n .

ESERCIZIO 5.6. Sia a_n una successione di numeri interi tale che $a_0 = 1$, $a_{n+1} \geq 2a_n$ se n è pari, e $a_{n+1} \geq 3a_n$ se n è dispari. Dimostrare che per ogni $n \in \mathbb{N}$, $a_{2n} \geq 6^n$.

ESERCIZIO 5.7. Questo problema è ricavato dal *Liber Abaci* (del 1202..) di Fibonacci. “Un uomo mise una coppia di conigli in un luogo circondato da tutti i lati da un muro. Quante coppie di conigli possono essere prodotte dalla coppia iniziale in un anno, supponendo che ogni mese ogni coppia produca una nuova coppia in grado di riprodursi a sua volta dal secondo mese?”

ESERCIZIO 5.8. Dato $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, sia S_n il numero di tutte le possibili stringhe (cioè liste ordinate) di cifre binarie (ossia 0 e 1) che hanno le seguenti caratteristiche:

- hanno lunghezza n
- se $n = 1$ la stringa è 0, se $n \geq 2$ la lista comincia per 01
- non ci sono mai tre cifre uguali consecutive

Per esempio $S_5 = 5$ e le stringhe in questione sono 01001, 01010, 01011, 01100, 01101. Dimostrare che, per ogni $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, $S_n = F_n$.

ESERCIZIO 5.9. Una lista di numeri interi strettamente crescente si dice *di parità alterna* se inizia con un numero dispari, ha come secondo termine un numero pari, poi il terzo termine è dispari, il quarto è pari, e così via. La lista vuota viene considerata anch'essa una lista di parità alterna. Sia $P(n)$ il numero delle liste di parità alterna i cui termini costituiscono un sottoinsieme di $\{1, 2, \dots, n\}$. Che relazione c'è fra le successioni $\{P_n\}$ e $\{F_n\}$?

ESERCIZIO 5.10. Fate finta di non aver letto la dimostrazione contenuta in questo capitolo e poniamo che vi venga proposta, facendola “cadere dal cielo”, la formula per i numeri di Fibonacci:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

Dimostrate la usando l' induzione forte.

ESERCIZIO 5.11. Provare che per i numeri di Fibonacci F_n ($n \geq 1$) vale la seguente formula:

$$F_{n+4} = F_3 F_n + F_4 F_{n+1}$$

ESERCIZIO 5.12. Provare che per i numeri di Fibonacci F_n vale la seguente formula ($n \geq 1$ e $m \geq 2$):

$$F_{n+m} = F_{m-1}F_n + F_mF_{n+1}$$

ESERCIZIO 5.13. Provare che per i numeri di Fibonacci si ha che F_n divide F_{mn} ($n \geq 1$, $m \geq 1$).

ESERCIZIO 5.14. Provare che per i numeri di Fibonacci si ha che $F_n \geq n^2$ per $n \geq 3$.

ESERCIZIO 5.15. Si definisca una successione tramite la regola $a_0 = 2$, $a_1 = 1$ e, per ogni $n \geq 1$, $a_{n+1} = a_n + 6a_{n-1}$. Si dimostri che, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n \geq 3^{n-1}$$

Si trovi una formula per il termine generale a_n .

ESERCIZIO 5.16. Data la successione $\{a_n\}$ definita da $a_0 = 1$,

$$a_n = 1 + a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1} \quad \forall n \geq 1$$

dimostrare che per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale

$$a_n = 2^n$$

Trovare una formula per la successione $\{b_n\}$ definita da $b_0 = 1$,

$$b_n = 1 - b_0 + b_1 - b_2 + \cdots + (-1)^n b_{n-1} \quad \forall n \geq 1$$

ESERCIZIO 5.17. Consideriamo la successione definita per ricorrenza da $a_0 = 8$, $a_1 = -1$ e, per ogni numero intero $n \geq 2$, dalla regola:

$$a_n = -a_{n-1} + 2a_{n-2}$$

- Scrivere i primi 4 termini della successione.
- Dimostrare che se n è pari allora a_n è positivo, se n è dispari allora a_n è negativo.
- Determinare se esistono degli interi a, b tali che per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$a_n = a(-2)^n + b$$

ESERCIZIO 5.18. Dato un poligono convesso con n lati, determinare il massimo numero di diagonali che è possibile tracciare da un vertice a un altro del poligono in modo che due di tali diagonali non si intersechino mai al di fuori dei vertici.

Prodotto cartesiano, relazioni e funzioni

1. Le definizioni di funzione

Consideriamo due insiemi X e Y .

DEFINIZIONE 1.1. Una funzione f da X a Y assegna ad ogni elemento x di X uno ed un solo elemento $f(x)$ di Y . Dato $x \in X$, l'elemento $y = f(x) \in Y$ è l'“immagine” di x tramite f , mentre, dato $y \in Y$, un elemento $z \in X$ tale che $f(z) = y$ è una “controimmagine” di y (ce ne può essere una, più di una, o nessuna). Si scrive

$$f : X \rightarrow Y$$

per indicare il fatto che f è una funzione da X ad Y . L'insieme X si chiama “dominio” della funzione e l'insieme Y “codominio” della funzione. L'immagine $\text{Im } f$ della funzione è il sottoinsieme di Y costituito dalle immagini degli elementi di X tramite la funzione, ossia:

$$\text{Im } f = \{y \in Y \mid \exists x \in X \quad f(x) = y\}.$$

Per indicare l'immagine di f si usa anche la notazione

$$\text{Im } f = \{f(x) \mid x \in X\}$$

Osserviamo che l'immagine di f è il sottoinsieme degli elementi di Y che hanno almeno una controimmagine.

Rimarchiamo che una funzione è specificata da una **terna** di informazioni: il dominio, il codominio e la legge che spiega come assegnare ad ogni elemento del dominio la sua immagine. Due funzioni f e g sono uguali se e solo se hanno lo stesso dominio, lo stesso codominio e per ogni x nel comune dominio si ha $f(x) = g(x)$.

2. Primi esempi

ESEMPIO 2.1. Consideriamo le seguenti funzioni:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} & f(x) &= x^4 \\ g : \mathbb{R}^{\geq 0} &\rightarrow \mathbb{R} & g(x) &= x^4 \\ h : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} & h(x) &= x^4 \\ \phi : \mathbb{R}^{\geq 0} &\rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} & \phi(x) &= x^4 \end{aligned}$$

Si tratta di funzioni tutte diverse fra loro, anche se la legge è la stessa (ossia elevare alla quarta il numero x); si differenziano l'una dall'altra perché cambiano il dominio e/o il codominio.

Quando si vuole costruire una funzione, bisogna sempre prestare molta attenzione a che sia ben definita, ossia che soddisfi tutte le richieste della Definizione 1.1.

ESEMPIO 2.2. Ecco un tentativo di costruire una funzione:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{1}{x}$$

Questa **non** è una buona definizione. Infatti quanto abbiamo scritto non dice quale è l'immagine dell'elemento 0 che appartiene al dominio ($\frac{1}{0}$ non è definito).

Le funzioni f_1 e f_2 seguenti sono invece ben definite:

$$f_1 : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{1}{x}$$

$$f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{1}{x} \text{ se } x \neq 0 \text{ e } f(0) = 42$$

ESEMPIO 2.3. Può capitare che stessa funzione venga descritta in più modi apparentemente diversi. Ecco tre diverse presentazioni della stessa funzione. Siano $X = \{1, 2, 5, 30, 1000\}$ e $Y = \{1, 4, 25, 26, 900, 950, 999, 1000000, 10101010\}$.

Prima presentazione:

$$f : X \rightarrow Y \quad f(x) \text{ è il più piccolo elemento di } Y \text{ che è maggiore o uguale a } x$$

Seconda presentazione:

$$f : X \rightarrow Y \quad f(x) = x^2$$

Terza presentazione:

$$f : X \rightarrow Y \quad f(1) = 1, f(2) = 4, f(5) = 25, f(30) = 900, f(1000) = 1000000$$

L'ultima presentazione di f specifica esplicitamente una per una le immagini degli elementi di X . Una simile descrizione si può utilizzare quando il dominio è un insieme finito (e gli elementi non sono troppi...).

3. Funzioni iniettive, surgettive, bigettive

DEFINIZIONE 3.1 (Funzione iniettiva). Consideriamo una funzione $f : X \rightarrow Y$.

Se per ogni elemento $y \in Y$ vale che y ha al più una controimmagine (cioè ne ha zero o una sola), la funzione si dice *iniettiva*. Questo si può esprimere anche scrivendo la seguente proposizione a riguardo della f :

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

o, in modo equivalente, utilizzando la contronominale dell'implicazione:

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

DEFINIZIONE 3.2 (Funzione surgettiva). Consideriamo una funzione $f : X \rightarrow Y$.

Se ogni elemento $y \in Y$ ha almeno una controimmagine, la funzione si dice *surgettiva*. Questo si può esprimere anche scrivendo la seguente proposizione:

$$\forall y \in Y \quad \exists x \in X \quad f(x) = y$$

oppure, in maniera equivalente, coinvolgendo l'insieme $\text{Im } f$:

$$\text{Im } f = Y$$




FIGURA 1. Una funzione iniettiva: non c'è nessun elemento di Y su cui arrivano due frecce.




FIGURA 2. Una funzione NON iniettiva: infatti gli elementi b e c di X hanno la stessa immagine.




FIGURA 3. Una funzione surgettiva: su ogni elemento di Y arriva almeno una freccia. La funzione non è iniettiva.




FIGURA 4. Una funzione NON surgettiva: infatti l'elemento $2 \in Y$ non è immagine di alcun elemento di X . La funzione non è iniettiva.

DEFINIZIONE 3.3 (Funzione bigettiva). Consideriamo una funzione $f : X \rightarrow Y$.

Se f è sia iniettiva sia surgettiva allora si dice *bigettiva*. Questo si può esprimere anche dicendo che ogni elemento $y \in Y$ ha esattamente una controimmagine, o scrivendo la seguente proposizione:

$$(\forall x_1, x_2 \in X \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)) \wedge (\forall y \in Y \quad \exists x \in X \quad f(x) = y)$$




FIGURA 5. Una funzione bigettiva: su ogni elemento di Y arriva una ed una sola freccia. Osserviamo che X e Y hanno lo stesso numero di elementi.

4. Provare a scoprire se una funzione è iniettiva, surgettiva, bigettiva...esempi

Come primo esercizio, potete studiare le quattro funzioni f, g, h, ϕ descritte nell'Esempio 2.1 del paragrafo precedente: f non è né surgettiva né iniettiva, g è iniettiva ma non surgettiva, h è surgettiva ma non iniettiva e ϕ è bigettiva.

Sia $X = Y = \{1, 2, 3, 4\}$ e consideriamo la funzione:

$$f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$$

tale che $f(1) = 1$ $f(2) = 1$ $f(3) = 4$ $f(4) = 3$. Questa funzione non è né iniettiva né surgettiva (e dunque neppure bigettiva). Non è iniettiva perché ci sono due elementi del dominio (i numeri 1 e 2) che hanno la stessa immagine e non è surgettiva perché c'è un elemento del codominio (il numero 2) che non appartiene a $\text{Im } f$.

Consideriamo adesso la funzione $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tale che $g(n) = 2n$ per ogni numero $n \in \mathbb{N}$. Questa funzione è iniettiva; per dimostrarlo possiamo per esempio verificare che, se accade che $g(n) = g(m)$, allora $n = m$. Questa verifica è immediata: infatti $g(n) = g(m)$ significa $2n = 2m$ da cui, dividendo per 2, si ricava subito $n = m$. La funzione invece non è surgettiva (e dunque non è bigettiva) perché $\text{Im } f$ è il sottoinsieme di \mathbb{N} costituito dai numeri pari e quindi non coincide con tutto il codominio \mathbb{N} .

Studiamo la funzione $h : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definita da $h(n, m) = 2n + 3m$, dove $(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Si osserva subito che non è iniettiva (infatti $h(3, 0) = h(0, 2)$). Inoltre è surgettiva. Infatti ogni numero intero appartiene a $\text{Im } h$: se considero un numero pari, diciamo $2k$, lo posso ottenere per esempio come immagine della coppia $(k, 0)$; se considero un numero dispari, diciamo $2l + 1$, lo posso ottenere come immagine della coppia $(l - 1, 1)$.

Domanda in più: dato un elemento in $y \in \mathbb{N}$, quante sono le sue controimmagini, ossia gli elementi (n, m) di $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tali che $h(n, m) = y$?...

Consideriamo infine la funzione θ da \mathbb{R} in \mathbb{R} data da $\theta(x) = x^3$ e dimostriamo che θ è biunivoca. Basta mostrare che θ è crescente. Sia $x < y$. Vogliamo mostrare $x^3 < y^3$.

Il caso difficile è quando x, y sono entrambi negativi. Ricordiamo che la moltiplicazione per un numero negativo rovescia le disuguaglianze. Da $x < y$ ottengo allora moltiplicando per x , $x^2 > xy$. Moltiplicando $x < y$ per y ottengo $xy > y^2$. Mettendo insieme le due disuguaglianze ottengo $x^2 > y^2$. Ora moltiplico questa per x e ottengo $x^3 < xy^2$. D'altra parte moltiplicando $x < y$ per il numero positivo y^2 ottengo $xy^2 < y^3$. Combinando le disuguaglianze ottenute ottengo $x^3 < y^3$.

5. Il grafico di una funzione

Siamo abituati a rappresentare una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con un grafico sul piano cartesiano. In questo paragrafo discutiamo cosa è in generale il grafico di una funzione.

DEFINIZIONE 5.1. Consideriamo una funzione $f : X \rightarrow Y$. Il grafico di f è il sottoinsieme G_f di $X \times Y$ definito da

$$G_f = \{(x, y) \in X \times Y \mid y = f(x)\}$$

Equivalentemente possiamo dire che G_f è il sottoinsieme di $X \times Y$ definito da

$$G_f = \{(a, f(a)) \mid a \in X\}$$

Per esempio, consideriamo la funzione

$$f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$$

definita da $f(1) = 3, f(2) = 2, f(3) = 3, f(4) = 3$. Il suo grafico è il sottoinsieme di $\{1, 2, 3, 4\} \times \{1, 2, 3\}$:

$$G_f = \{(1, 3), (2, 2), (3, 3), (4, 3)\}$$

che si può rappresentare con l'immagine di Figura 6 (dove abbiamo sistemato l'insieme $\{1, 2, 3, 4\}$ sulle "ascisse", l'insieme $\{1, 2, 3\}$ sulle "ordinate" e gli elementi del grafico sono quelli contrassegnati da una crocetta):

3	x (1,3)	·	x (3,3)	x (4,3)
2	·	x (2,2)	·	·
1	·	·	·	·
	1	2	3	4

FIGURA 6. Il grafico di una funzione (la funzione descritta non è né iniettiva né surgettiva.)

Ci possiamo chiedere: dati due insiemi X e Y , quali sottoinsiemi del prodotto cartesiano $X \times Y$ possono essere interpretati come grafici di una qualche funzione che ha X come dominio e Y come codominio?

Ci rendiamo subito conto che non tutti i sottoinsiemi di $X \times Y$ hanno questa proprietà. Infatti, sia G_g il grafico di una funzione $g : X \rightarrow Y$; visto che la funzione associa ad ogni elemento di X uno ed un solo elemento di Y , G_g deve contenere, per ogni $a \in X$, uno ed un solo elemento (a, y) , ossia con a come prima coordinata.

Detto “per immagini”, se sistemiamo X sulle ascisse e Y sulle ordinate, l’intersezione della colonna relativa all’elemento a col nostro sottoinsieme G_g contiene esattamente un elemento.

Viceversa, se un sottoinsieme \mathcal{L} di $X \times Y$ ha la caratteristica che, per ogni $x \in X$, esiste uno ed un solo elemento in \mathcal{L} che ha x come prima coordinata, lo chiameremo “sottoinsieme di tipo grafico” e si vede subito che è possibile costruire una funzione $f : X \rightarrow Y$ che ha \mathcal{L} come grafico.

Abbiamo dunque osservato che c’è una funzione bigettiva dall’insieme $F(X \rightarrow Y)$ di tutte le funzioni che hanno X come dominio e Y come codominio all’insieme di tutti i sottoinsiemi del cartesiano di tipo grafico.

Volendo esprimere questo fatto ancora con altre parole, possiamo dire che definire una funzione da X a Y equivale a descrivere un sottoinsieme di tipo grafico nel cartesiano $X \times Y$.

6. La composizione di funzioni

Dati tre insiemi X, Y e Z e due funzioni

$$f : X \rightarrow Y$$

$$g : Y \rightarrow Z$$

è possibile definire una nuova funzione che ha come dominio X e come codominio Z .

DEFINIZIONE 6.1. Dati X, Y, Z e f, g come sopra, la funzione g **composta con** f è la funzione

$$g \circ f : X \rightarrow Z$$

tale che, per ogni $x \in X$, $g \circ f(x) = g(f(x))$.

Osserviamo che, se $X = Y = Z$, le funzioni $f \circ g$ e $g \circ f$ hanno lo stesso dominio e lo stesso codominio (entrambi uguali a X , appunto). Possiamo chiederci: $f \circ g$ e $g \circ f$ sono la stessa funzione? In altri termini: questa operazione di composizione è *commutativa*? In generale, la risposta è no, come mostra il seguente esempio.

ESEMPIO 6.2. Siano

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^3$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad g(x) = x + 2$$

Allora

$$f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f \circ g(x) = f(g(x)) = (x + 2)^3$$

$$g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad g \circ f(x) = g(f(x)) = x^3 + 2$$

e queste sono due funzioni diverse !

OSSERVAZIONE 6.3. Per x reale, $\sqrt{x^2} = |x|$.

7. Funzioni invertibili

Cominciamo ponendoci questa domanda. Se componendo due funzioni f e g ottengo la funzione identità, ossia la funzione che manda ogni elemento in sé stesso, cosa posso dire di f e di g ?

PROPOSIZIONE 7.1. *Consideriamo due insiemi X, Y e due funzioni $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow X$. Se $g \circ f(u) = u$ per ogni elemento $u \in X$ allora g è surgettiva e f è iniettiva.*

DIMOSTRAZIONE. Se $f(u) = f(v)$ applicando g trovo $u = v$. Quindi f è iniettiva. Per risolvere $g(x) = b$, prendo $x = f(b)$. Quindi f è surgettiva. \square

Siano $f(x) = x^2$ e $g(x) = \sqrt{x}$, prendendo come dominio e codominio di entrambe l'insieme $\mathbb{R}^{>0}$ dei reali positivi. Allora, per ogni $x \in \mathbb{R}^{>0}$, vale $f \circ g(x) = x$ e $g \circ f(x) = x$. Diciamo in questo caso che f, g sono l'una l'inversa dell'altra. Diamo la definizione in generale:

DEFINIZIONE 7.2. Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione dall'insieme X all'insieme Y . Si dice che f è invertibile se esiste una funzione $g : Y \rightarrow X$ che soddisfa le seguenti due condizioni:

(1) $g \circ f : X \rightarrow X$ è uguale alla funzione identità su X . In simboli:

$$g \circ f = Id_X : X \rightarrow X$$

(2) $f \circ g : Y \rightarrow Y$ è uguale alla funzione identità su Y . In simboli:

$$f \circ g = Id_Y : Y \rightarrow Y$$

TEOREMA 7.3. *Date due funzioni $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow X$, se f, g sono l'una l'inversa dell'altra, allora f, g sono bigettive. Inoltre, se $y \in Y$ risulta che $g(y)$ è la controimmagine di y tramite f (quindi l'inversa di una funzione biunivoca è unica).*

DIMOSTRAZIONE. Possiamo applicare la Proposizione 7.1 a $g \circ f$ e a $f \circ g$. La prima volta otteniamo che f è iniettiva e che g è surgettiva, la seconda volta che g è iniettiva e che f è surgettiva. Dunque f e g sono bigettive. Ora, preso $y \in Y$, sia $x \in X$ la sua controimmagine tramite f (cioè $f(x) = y$). Allora applicando g trovo $g(f(x)) = g(y)$ e dunque $g(y) = x$. \square

Abbiamo dunque osservato che una funzione invertibile è bigettiva. Vale anche il viceversa, come possiamo intuire facilmente. Riassumiamo queste osservazioni nel seguente teorema.

TEOREMA 7.4. *Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione dall'insieme X all'insieme Y . Allora f è invertibile se e solo se è bigettiva. Inoltre, se è invertibile, la sua inversa è unica.*

DIMOSTRAZIONE. Resta da dimostrare che se f è bigettiva allora è invertibile. Basta costruire l'inversa. Il Teorema 7.3 ci suggerisce come fare: definiamo una funzione $g : Y \rightarrow X$ ponendo, per ogni $y \in Y$, $g(y)$ uguale alla controimmagine di y tramite la f . Si verifica subito che una tale g soddisfa $g \circ f = Id_X$ e $f \circ g = Id_Y$. \square

8. Esercizi

ESERCIZIO 8.1. Sia $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ data da $g(x) = x^2$. Trovare le controimmagini di 0, 2, 4.

ESERCIZIO 8.2. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione $f(x) = 3x - 2$. Determinare se f è iniettiva, surgettiva. Stessa domanda con \mathbb{N} al posto di \mathbb{R} come dominio e codominio.

ESERCIZIO 8.3. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x) = x^2$. Determinare se f è iniettiva, surgettiva. Siano $a < b$ in \mathbb{R} . Per quali valori di a, b la restrizione di f ad $[a, b]$ è iniettiva?

ESERCIZIO 8.4. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x) = (x - 3)^2 + 5$. Determinare se f è iniettiva, surgettiva. Per quali scelte di a e b , f ristretta ad $[a, b]$ è iniettiva?

ESERCIZIO 8.5. Sia $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da $g(x) = ax^2 + bx + c$. Trovate le controimmagini di zero. Suggerimento: $4ag(x) = (2ax + b)^2 + (4ac - b^2)$. Determinare se g è surgettiva. Determinare per quali a, b la restrizione di g ad $[a, b]$ è iniettiva.

ESERCIZIO 8.6. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x) = x + 2^x$. Determinare se f è iniettiva.

ESERCIZIO 8.7. Sia $f: \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$ data da $f(x, y) = x + y$. Determinare se f è iniettiva, surgettiva.

ESERCIZIO 8.8. Sia $f(x) = 3x + 5$ e $g(x) = 7x - 11$. Calcolare $f \circ g$ e $g \circ f$.

ESERCIZIO 8.9. Consideriamo la funzione $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$g(x) = 9x^2 - 6x + 2$$

Dire se è iniettiva, surgettiva o bigettiva. La stessa domanda per la funzione

$$g': \mathbb{R}^{\geq 0} \rightarrow \{z \in \mathbb{R} \mid z \geq 1\}$$

data dalla stessa legge $g'(x) = 9x^2 - 6x + 2$.

Risoluzione. Studiamo innanzitutto la surgettività della g , ossia prendiamo un $y \in \text{Im } g$ e studiamone le caratteristiche. Deve valere

$$y = 9x^2 - 6x + 2$$

per un qualche $x \in \mathbb{R}$. Si può anche riscrivere

$$y = (3x - 1)^2 + 1$$

da cui si nota subito che deve essere $y \geq 1$ (ossia $\text{Im } g \subset \{z \in \mathbb{R} \mid z \geq 1\}$). Dunque la g non è surgettiva, perché ha sempre immagini di valore ≥ 1 .

Studiamo la iniettività. Se $y \geq 1$, abbiamo

$$y - 1 = (3x - 1)^2$$

che ha senso perché $y - 1 \geq 0$ e possiamo ricavare

$$3x - 1 = \pm \sqrt{y - 1}$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{y - 1}}{3}$$

Da questa espressione si ricava che se $y \geq 1$ allora $y \in \text{Im } g$ (ossia $\text{Im } g = \{z \in \mathbb{R} \mid z \geq 1\}$), perché abbiamo mostrato una formula per ricavare le sue controimmagini. In particolare si nota che $y = 1$ ha una sola controimmagine, ossia $\frac{1}{3}$. Se invece $y > 1$ allora ha due controimmagini distinte in \mathbb{R} . Dunque la g non è iniettiva.

Consideriamo adesso la g' . Sia y nel codominio di g' , dunque $y \geq 1$. Vogliamo controllare se la g' è surgettiva, ossia se troviamo $x \in \mathbb{R}^{\geq 0}$ tale che

$$y = (3x - 1)^2 + 1$$

Provando a risolvere questa equazione si può scrivere, come abbiamo fatto prima,

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{y-1}}{3}$$

e, siccome fra le due soluzioni proposte ce ne è sempre una (la $x = \frac{1+\sqrt{y-1}}{3}$) che è ≥ 0 e dunque appartiene al dominio della g' , si conclude che la g' è surgettiva.

Quanto alla iniettività, se dimostriamo che, per certi valori di $y > 1$, l'altra soluzione (la $x = \frac{1-\sqrt{y-1}}{3}$, che è distinta dalla prima per $y > 1$) è anch'essa nel dominio, avremo mostrato che la g' non è iniettiva.

Bisogna controllare quando

$$\frac{1 - \sqrt{y-1}}{3} \geq 0$$

e troviamo che questa disuguaglianza è soddisfatta per $y \leq 2$. In conclusione, se scelgo un y tale che $1 < y \leq 2$, tale y ha due controimmagini secondo la g' , che dunque non è iniettiva.

Osservazione. La funzione g ha il grafico dato da una parabola con punto di minimo per $x = \frac{1}{3}$ e valore minimo 1; il grafico permette di "leggere" bene i risultati provati qui sopra.

ESERCIZIO 8.10.

(i) La funzione

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto (2x + 6y, x + 3y) \end{aligned}$$

è iniettiva, surgettiva, bigettiva?

(ii) Al variare di $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto (2ax + 6by, ax + 3by) \end{aligned}$$

è iniettiva, surgettiva, bigettiva?

Risoluzione.

(i) La funzione non è iniettiva, infatti: $f(0, 0) = 0$ e $f(3, -1) = (2 \cdot 3 + 6 \cdot (-1), 3 + 3 \cdot (-1)) = (0, 0)$. Proviamo ora che la funzione non è surgettiva. Osserviamo che abbiamo $f(x, y) = (2(x + 3y), x + 3y)$, cioè se un elemento $(u, v) \in \text{Im } f$ abbiamo $u = 2v$; in conclusione la funzione f non è surgettiva perchè ad esempio l'elemento $(1, 0)$ non appartiene all'immagine di f . In particolare la funzione non è neanche bigettiva.

(ii) Vogliamo ora provare che per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione f non è iniettiva e non è surgettiva. Infatti $f(3b, -a) = (2a \cdot 3b + 6b \cdot (-a), a \cdot 3b + 3b \cdot (-a)) = (0, 0) = f(0, 0)$, e quindi se la coppia $(a, b) \neq (0, 0)$ allora la funzione f non è iniettiva visto che i due elementi distinti $(3b, -a)$ e $(0, 0)$ hanno la stessa immagine. Se invece $a = b = 0$ allora abbiamo $f(x, y) = (0, 0)$ per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ e quindi f non è certamente iniettiva.

Proviamo ora che f non è surgettiva. Infatti per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ abbiamo $f(x, y) = (2(ax + 3by), ax + 3by)$; allora per ogni elemento $(u, v) \in \text{Im } f$ abbiamo $u =$

2v. Quindi, ad esempio, l'elemento $(1, 0)$ non è nell'immagine di f . In particolare la funzione f non è bigettiva.

ESERCIZIO 8.11. Dire, motivando la risposta, se la seguente è o no una definizione corretta di funzione:

$$g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

tale che

$$\forall y \in \mathbb{Z} \quad g(y) = (p, q) \text{ con } p \text{ e } q \text{ tali che } \frac{p}{q} = y$$

ESERCIZIO 8.12. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da:

$$f(x) = \begin{cases} -2x & \text{se } |x| \leq 10, \\ x & \text{se } |x| > 10. \end{cases}$$

Determinare se f è iniettiva, surgettiva, bigettiva.

ESERCIZIO 8.13. Definiamo $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ponendo

$$f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x} & \text{se } x \text{ è un quadrato,} \\ 2x + 1 & \text{se } x \text{ non è un quadrato} \end{cases}$$

Determinare se f è iniettiva, surgettiva, bigettiva.

ESERCIZIO 8.14. (a) Sia $f: \mathbb{Q} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Q}$ la funzione definita da

$$f(x) = \frac{x-1}{x} \quad \forall x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}.$$

La funzione f è iniettiva? La funzione f è surgettiva?

(b) Sia $g: \mathbb{Q} \setminus \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{Q} \setminus \{0, 1\}$ la funzione definita da

$$g(t) = \frac{t-1}{t} \quad \forall t \in \mathbb{Q} \setminus \{0, 1\}.$$

Dimostrare che g è bigettiva e determinare le funzioni $g \circ g$, g^{-1} .

ESERCIZIO 8.15. Sia $f: \mathbb{N} - \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{Z}$ la funzione definita nel seguente modo: se $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$ si decompone in fattori primi come $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n}$ allora

$$f(n) = (-1)^{p_1} a_1 p_1 + (-1)^{p_2} a_2 p_2 + \cdots + (-1)^{p_n} a_n p_n$$

Determinare se f è iniettiva, surgettiva, bigettiva.

ESERCIZIO 8.16. Consideriamo la funzione $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ che è definita dalla seguente relazione: se $n \in \mathbb{N}$ ha la scrittura decimale

$$n = a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0$$

allora $f(n) = a_k 3^k + a_{k-1} 3^{k-1} + \cdots + a_1 3 + a_0 3^0$. Dire se f è iniettiva, surgettiva, bigettiva.

ESERCIZIO 8.17. Siano $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ e $g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ le funzioni definite da

$$\begin{aligned} f(m, n) &= 2m + n^3 & \forall (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \\ g(m, n) &= 3m + n^2 & \forall (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Stabilire se f e g sono iniettive e/o surgettive.

ESERCIZIO 8.18. Dati due insiemi X e Y e un sottoinsieme $A \subseteq X \times Y$ di tipo grafico, determinare (scrivendo le opportune proposizioni in linguaggio formale) quali caratteristiche deve avere A perché

- la funzione individuata da A sia iniettiva;
- la funzione individuata da A sia surgettiva;
- la funzione individuata da A sia bigettiva;
- la funzione individuata da A non sia né iniettiva né surgettiva;
- la funzione individuata da A non sia bigettiva.

ESERCIZIO 8.19. Dati gli insiemi $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, consideriamo il seguente sottoinsieme $B \subseteq X \times Y$:

$$B = \{(1, 4), (2, 2), (3, 5), (4, 1), (5, 5), (6, 2), (6, 3), (7, 5), (7, 6)\}$$

- B è di tipo grafico?
- Quante funzioni $f : X \rightarrow Y$ esistono tali che $G_f \subseteq B$?

ESERCIZIO 8.20. Si considerino gli insiemi $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Quali dei seguenti sottoinsiemi di $A \times B$ possono essere ottenuti come grafici di una funzione da A a B ?

$$C = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 6), (5, 7), (6, 8)\}$$

$$D = \{(1, 4), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 7)\}$$

$$E = \{(1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6), (5, 6), (6, 6)\}$$

Data una funzione $f : A \rightarrow B$ e una funzione $g : B \rightarrow A$, è possibile che $g \circ f$ sia iniettiva? E che sia surgettiva? Stesse domande per la funzione $f \circ g$.

ESERCIZIO 8.21. Siano dati due insiemi A e B e due funzioni

$$f : A \longrightarrow B \text{ e } g : B \longrightarrow A$$

Per ciascuna delle affermazioni seguenti, dimostrare che è vera o trovare un controesempio

- (1) $f \circ g$ iniettiva implica f iniettiva.
- (2) $f \circ g$ iniettiva implica g iniettiva.
- (3) $f \circ g$ surgettiva implica f surgettiva.
- (4) $f \circ g$ surgettiva implica g surgettiva.

ESERCIZIO 8.22. Una funzione $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ è pari se $\forall x \in A \ f(x) = f(-x)$. Una funzione $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ è dispari se $\forall x \in A \ f(x) = -f(-x)$.

- a) Dare un esempio di funzione pari e uno di funzione dispari.
- b) Provare che la somma di funzioni pari è pari e che la somma di funzioni dispari è dispari.
- c) Sia f pari e g dispari. Determinare la parità/disparità delle funzioni $f \circ g$, $g \circ f$.

ESERCIZIO 8.23. Costruire una funzione $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ che sia iniettiva e una $g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ che sia surgettiva.

ESERCIZIO 8.24. Si considerino i seguenti sottoinsiemi di \mathbb{Z} :

$$A = \{m \in \mathbb{Z} \mid m \text{ è un multiplo di } 3\}$$

$$B = \{n \in \mathbb{Z} \mid n^2 < 144\}$$

$$C = \{2z + 2 \mid z \in A\}$$

- (1) Quanti elementi hanno gli insiemi $A \cap B$, $B \cap C$ e $A \cap B \cap C$?
- (2) Si elenchino gli elementi dell'insieme

$$D = \{(x, y) \in (A \cap B) \times (B \cap C) \mid x \cdot y \leq 0\}$$

- (3) Consideriamo la funzione $f : C \rightarrow A$ tale che $f(c) = c + 1$ per ogni $c \in C$. Dire se tale funzione è iniettiva, surgettiva, bigettiva.

ESERCIZIO 8.25. Trovare, se esistono, le inverse delle funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = 7x + 5$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $g(x) = x^3 + 5$. Trovare inoltre una funzione $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $h \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sia la funzione che manda ogni elemento $r \in \mathbb{R}$ nel suo quadrato.

ESERCIZIO 8.26. Sia $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definita da $f(x) = 2^x x$.

- (1) Determinare se f è iniettiva, surgettiva, bigettiva.
- (2) Calcolare la composizione $(f \circ f)(x)$.

ESERCIZIO 8.27. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione data da

$$f(x) = x + [x]$$

dove $[x]$ è la parte intera (inferiore) di x , ossia il più grande numero intero $\leq x$.

- a) Dire se f è iniettiva, surgettiva, bigettiva.
- b) Trovare (se possibile!) una funzione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che, per ogni $x \in \mathbb{R}$, $g \circ f(x) = x$ e una funzione $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che per ogni $x \in \mathbb{R}$, $f \circ h(x) = x$.

Calcolo combinatorio

1. Esercizi

Esercizio 1.1. Quante sono le funzioni $f: \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$ tali che per ogni x nel dominio di f si ha $f(x) \geq x$? Dimostrare per induzione un risultato generale.

Esempio 1.2. Sia $f: A \rightarrow B$ con A, B insiemi finiti, e supponiamo che ogni $b \in B$ abbia n controimmagini in A . Quale è il rapporto tra $|A|$ e $|B|$?

Esempio 1.3. Ci sono 2^n stringhe binarie di lunghezza n .

Esempio 1.4. Quante sono le funzioni surgettive da $\{1, 2, 3, 4\}$ a $\{1, 2\}$?

INSIEME DELLE PARTI

Esercizio 1.5. Un insieme con n elementi ha 2^n sottoinsiemi. Due dimostrazioni. Una riconducendosi alle stringhe, l'altra diretta per induzione.

Esempio 1.6. Quante sono le permutazioni di un insieme di n elementi?

Esempio 1.7. Quante sono le stringhe di k elementi distinti presi da un insieme di n elementi?

Esempio 1.8. Quanti sottoinsiemi di k elementi possiede un insieme X di n elementi?

Suggerimento: Sia A l'insieme delle stringhe di k elementi distinti presi da X . Sia B l'insieme dei sottoinsiemi di X di k elementi. Sia $f: A \rightarrow B$ la funzione che associa ad una stringa l'insieme dei suoi elementi. Quante controimmagini ha un generico $b \in B$?

Esercizio 1.9. Dato un intero n , quante sono le triple (x, y, z) di interi non negativi che verificano $x + y + z = n$?

Soluzione: tante quante le stringhe binarie di lunghezza $n + 2$ con esattamente due zeri. Quindi $\binom{n}{2}$.

Esempio 1.10. Triangolo di Tartaglia. Formule di Stiefel. Dimostrazione combinatoria e algebrica.

Esempio 1.11. Binomio di Newton. Dimostrazione combinatoria e induttiva.

CAPITOLO 9

Contare

1. La definizione di cardinalità e il lemma dei cassetti

Vogliamo discutere il concetto di cardinalità di un insieme (ossia la risposta alla domanda “quanti elementi ha?”). In questo capitolo (e nel successivo) tratteremo il caso degli insiemi finiti.

Cominciamo col preparare una collezione di insiemi che avranno il ruolo di insiemi campione; per ogni $n \in \mathbb{N} - \{0\}$ poniamo:

$$\mathbb{N}_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$$

A questo punto, lanciamo la:

DEFINIZIONE 1.1. Un insieme X è finito di cardinalità $n \in \mathbb{N} - \{0\}$ quando esiste una funzione bigettiva $g : X \rightarrow \mathbb{N}_n$. In tal caso si scrive che $|X| = n$. L'insieme vuoto è un insieme finito la cui cardinalità si pone uguale a 0; in simboli: $|\emptyset| = 0$.

DEFINIZIONE 1.2. Se un insieme non vuoto Y è tale che per nessun $n \in \mathbb{N} - \{0\}$ esiste una funzione bigettiva da Y a \mathbb{N}_n allora si dice che Y è infinito.

Tutto a posto? In realtà non ancora: per essere sicuri che queste definizioni siano ben date, bisogna fare una verifica. Prendiamo infatti un insieme X che ammette una funzione bigettiva $f : X \rightarrow \mathbb{N}_n$. La definizione ci dice che allora X ha cardinalità n . Ma (domanda cattiva) siamo sicuri che non si possa trovare un'altra funzione bigettiva $g : X \rightarrow \mathbb{N}_m$ con $m \neq n$? In tal caso avremmo un problema, il concetto di cardinalità non sarebbe definito univocamente.

L'intuizione ci rassicura: questo problema non accade. Formalmente quello che ci salva è il:

LEMMA 1.3 (Lemma dei cassetti, detto anche Lemma dei piccioni). *Supponiamo di avere una funzione $h : \mathbb{N}_n \rightarrow \mathbb{N}_m$ con $n > m$. Allora h non è iniettiva.*

Tale lemma si dimostra per induzione (per la dimostrazione, che non presentiamo qui, vedi per es. Eccles [E], capitolo 11).

Vediamo come mai il lemma “ci salva”: supponiamo per assurdo di avere X, f, g come sopra; dato che $n \neq m$, possiamo pensare che $n > m$. Allora possiamo costruire la funzione

$$g \circ f^{-1} : \mathbb{N}_n \rightarrow \mathbb{N}_m$$

Tale funzione è invertibile, essendo composizione di due funzioni bigettive e dunque invertibili (la sua inversa è $f \circ g^{-1} : \mathbb{N}_m \rightarrow \mathbb{N}_n$). Dunque $g \circ f^{-1}$, essendo invertibile, è anche bigettiva; in particolare è iniettiva. Ma ciò è assurdo perché è in contraddizione col lemma dei cassetti.

Ora che abbiamo apprezzato l'importanza del lemma dei cassetti, riuinciamolo in un linguaggio più generale:

LEMMA 1.4 (Lemma dei cassetti - enunciato generale). *Supponiamo di avere una funzione $f : X \rightarrow Y$, dove X è un insieme di cardinalità n e Y è un insieme di cardinalità m , con $n > m$. Allora f non è iniettiva.*

Possiamo facilmente ricavare questo corollario (dimostrazione per esercizio !):

COROLLARIO 1.5. *Se N oggetti sono sistemati in K scatole, allora c'è (almeno) una scatola che contiene almeno $\lceil \frac{N}{K} \rceil$ oggetti (qui $\lceil \frac{N}{K} \rceil$ è la parte intera superiore di $\frac{N}{K}$, ossia il più piccolo numero intero $\geq \frac{N}{K}$).*

2. Prime applicazioni ed esempi

Ecco qualche altro enunciato che conferma fatti da noi facilmente intuibili. Le dimostrazioni formali sono lasciate come esercizio.

TEOREMA 2.1. *Supponiamo che X e Y siano insiemi tali che $X \subseteq Y$ e Y sia finito. Allora anche X è finito e $|X| \leq |Y|$.*

TEOREMA 2.2. *Supponiamo che $f : X \rightarrow Y$ sia una funzione fra insiemi finiti e non vuoti tali che $|X| < |Y|$. Allora f non è surgettiva.*

TEOREMA 2.3. *Supponiamo che X e Y siano insiemi finiti non vuoti della stessa cardinalità. Allora una funzione $f : X \rightarrow Y$ è iniettiva se e solo se è surgettiva.*

OSSERVAZIONE 2.4. Dunque, in questo caso dove $|X| = |Y|$, per provare che una certa funzione $g : X \rightarrow Y$ è bigettiva basta provare una sola fra queste due proprietà: g è iniettiva o g è surgettiva.

Concludiamo con due esempi di applicazioni “s sofisticate” del lemma dei cassetti.

ESEMPIO 2.5. Dimostriamo che, dati $n+1$ numeri interi positivi distinti $a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}$ minori o uguali a $2n$, fra questi numeri ce n'è uno che ne divide un altro.

Scriviamo ogni a_j come prodotto di una potenza di 2 per un numero dispari:

$$a_j = 2^{k_j} q_j$$

dove q_j è un numero positivo dispari e $k_j \in \mathbb{N}$. Allora i numeri $q_1, q_2, \dots, q_n, q_{n+1}$ sono tutti dispari, positivi e minori di $2n$. Siccome ci sono solo n numeri dispari positivi minori di $2n$, per il lemma dei cassetti deve valere che due fra i numeri $q_1, q_2, \dots, q_n, q_{n+1}$ sono uguali. Supponiamo per esempio che $q_1 = q_2$. Allora, ricordando che

$$a_1 = 2^{k_1} q_1 \quad a_2 = 2^{k_2} q_2 = 2^{k_2} q_1$$

e che $k_1 \neq k_2$ (altrimenti a_1 e a_2 non sarebbero distinti) possiamo osservare che

- se $k_1 < k_2$ allora a_1 divide a_2 ,
- se $k_2 < k_1$ allora a_2 divide a_1 .

ESEMPIO 2.6. Dimostrare che se mettiamo n^2+1 numeri reali distinti in una lista ordinata $(a_1, a_2, \dots, a_{n^2+1})$, da tale lista possiamo estrarre una sottolista di $n+1$ numeri che risultano o strettamente crescenti o strettamente decrescenti¹.

¹Per chiarire cosa intendiamo, consideriamo questo gioco: dopo aver scritto sulla lavagna una lista ordinata di n^2+1 numeri reali distinti, chiamo uno di voi e gli chiedo di fare un cerchietto intorno a $n+1$ di questi numeri. Dopo che ha fatto i cerchietti, cancello tutti gli altri numeri e lascio solo quelli cerchiati.

Dimostriamolo per assurdo. Supponiamo che l'enunciato non sia vero. Allora, preso un qualunque numero x nella lista, consideriamo tutte le sottoliste crescenti che possiamo estrarre e che hanno x come primo elemento. Tali sottoliste devono essere composte da al massimo n elementi, altrimenti l'enunciato sarebbe vero. Prendiamo una di queste sottoliste che abbia lunghezza massima possibile e chiamiamo c_x la sua lunghezza, ossia il numero dei suoi elementi. Allo stesso modo, chiamiamo d_x la massima lunghezza di una sottolista strettamente decrescente con primo elemento x . Anche d_x deve essere $\leq n$. Possiamo dunque associare ad ogni elemento x della nostra lista un elemento di $\mathbb{N}_n \times \mathbb{N}_n$, esattamente la coppia (c_x, d_x) . Per il lemma dei cassetti, visto che la lista contiene $n^2 + 1$ elementi e che la cardinalità di $\mathbb{N}_n \times \mathbb{N}_n$ è n^2 , devono esistere due elementi distinti della lista, diciamo a_s e a_t , con $s < t$, a cui viene associata la stessa coppia, ossia tali che $(c_{a_s}, d_{a_s}) = (c_{a_t}, d_{a_t})$. Ora supponiamo che $a_s > a_t$. Allora, poiché a partire da a_t si può estrarre una sottolista di d_{a_t} numeri strettamente decrescenti, questo vuol dire che a partire da a_s si può estrarre una sottolista di almeno $d_{a_t} + 1$ numeri strettamente decrescenti, semplicemente aggiungendo a_s alla sottolista che partiva da a_t . Dunque, per la definizione di d_{a_s} , deve essere $d_{a_s} \geq d_{a_t} + 1$. Questo è ASSURDO visto che a_s e a_t erano tali che $(c_{a_s}, d_{a_s}) = (c_{a_t}, d_{a_t})$, che in particolare implica $d_{a_s} = d_{a_t}$. In modo simile si trova un assurdo se $a_s < a_t$.

3. Insiemi di funzioni

Siano X e Y due insiemi. Chiamiamo $F(X \rightarrow Y)$ l'insieme di tutte le funzioni che hanno X come dominio e Y come codominio:

$$F(X \rightarrow Y) = \{f \mid f : X \rightarrow Y \text{ è una funzione}\}$$

Fedeli al tema di questo capitolo, ossia il “contare”, ci chiediamo subito: quanti sono gli elementi di $F(X \rightarrow Y)$, ossia quante sono tutte le possibili funzioni che hanno X come dominio e Y come codominio?

TEOREMA 3.1. *Siano X e Y finiti non vuoti con $|X| = n$ e $|Y| = m$. Allora*

$$|F(X \rightarrow Y)| = m^n$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. Proviamo a costruire una funzione da X a Y .

Dove mandiamo x_1 ? Abbiamo m scelte: y_1, y_2, \dots, y_m .

Dove mandiamo x_2 ? Abbiamo sempre m scelte: y_1, y_2, \dots, y_m , perché non abbiamo fatto nessuna richiesta sulla funzione (tipo “che sia iniettiva” o “surgettiva” etc...).

In generale, dove mandiamo x_i con $i = 1, 2, \dots, n$? Abbiamo sempre m scelte.

Dunque alla fine possiamo costruire la nostra funzione in $\underbrace{m \cdot m \cdot m \cdots m}_{n \text{ volte}} = m^n$ modi diversi. □

Ripensiamo alla dimostrazione appena svolta: come mai se avevamo m scelte e poi ancora m scelte e poi ancora m scelte.... alla fine abbiamo moltiplicato $\underbrace{m \cdot m \cdot m \cdots m}_{n \text{ volte}}$? Siccome ci

capiterà di ripetere spesso ragionamenti simili a questo, vale la pena soffermarsi e riscrivere la dimostrazione da un altro punto di vista.

Se questi numeri rimasti sono scritti in ordine strettamente decrescente o strettamente crescente, allora ho perso. L'enunciato dell'esercizio equivale a dire che questo è un bel gioco per voi, perché dice che, qualunque sia la lista che io ho scritto alla lavagna, c'è sempre un modo di farmi perdere.

DIMOSTRAZIONE. In realtà individuare una funzione $f : X \rightarrow Y$ equivale ad individuare un elemento del prodotto cartesiano $\underbrace{Y \times Y \times \cdots \times Y}_{n \text{ volte}} = Y^n$. Infatti un elemento di Y^n è

una lista (a_1, a_2, \dots, a_n) di elementi di Y e per ogni tale lista noi possiamo porre $f(x_1) = a_1, f(x_2) = a_2, \dots, f(x_n) = a_n$. Viceversa, data una funzione $f : X \rightarrow Y$ possiamo costruire l'elemento $(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)) \in Y^n$.

Dunque vale $|F(X \rightarrow Y)| = |Y^n|$ e noi abbiamo già osservato (vedi Paragrafo 3) del Capitolo 4) che $|Y^n| = m^n$ (in realtà in quel paragrafo abbiamo osservato che se A e B sono insiemi finiti allora $|A \times B| = |A| \cdot |B|$, da cui per induzione si ottiene subito la formula per la cardinalità del prodotto cartesiano di m insiemi). \square

Chiamiamo ora $Inj(X \rightarrow Y)$ l'insieme di tutte le funzioni iniettive che hanno X come dominio e Y come codominio:

$$Inj(X \rightarrow Y) = \{f \mid f : X \rightarrow Y \text{ è una funzione iniettiva} \}$$

TEOREMA 3.2. *Siano X e Y finiti non vuoti con $|X| = n$ e $|Y| = m$. Allora*

$$|Inj(X \rightarrow Y)| = m(m-1)(m-2) \cdots (m-n+1)$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. Se $n > m$ il lemma dei Cassetti ci dice che $|Inj(X \rightarrow Y)| = 0$.

Supponiamo allora $n \leq m$ e proviamo a costruire una funzione iniettiva g da X a Y .

Dove mandiamo x_1 ? Abbiamo m scelte: y_1, y_2, \dots, y_m .

Dove mandiamo x_2 ? Abbiamo $m-1$ scelte, ossia gli elementi di $Y - \{g(x_1)\}$, visto che la funzione deve essere iniettiva.

In generale, dove mandiamo x_i con $i = 1, 2, \dots, n$? Abbiamo $m - (i-1)$ scelte, cioè gli elementi di $Y - \{g(x_1), g(x_2), \dots, g(x_{i-1})\}$. In particolare per l'ultimo elemento x_n avremo $m - (n-1)$ scelte.

Dunque alla fine possiamo costruire la nostra funzione in

$$m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdots (m-n+1)$$

modi diversi.

Come ultima osservazione notiamo che la formula ottenuta vale per ogni m e ogni n interi positivi, ossia

$$|Inj(X \rightarrow Y)| = m(m-1)(m-2) \cdots (m-n+1)$$

si adatta bene anche al caso in cui $n > m$: in tal caso infatti la nostra formula è un prodotto di fattori fra i quali è presente anche $m-m$ e dunque ha come risultato 0 che, come abbiamo osservato all'inizio, è proprio il numero di funzioni iniettive da X a Y . \square

Se $|X| = |Y|$ allora l'insieme delle funzioni bigettive che hanno X come dominio e Y come codominio è non vuoto. Chiamiamolo $Bij(X \rightarrow Y)$:

$$Bij(X \rightarrow Y) = \{f \mid f : X \rightarrow Y \text{ è una funzione bigettiva} \}$$

Come caso particolare del teorema appena dimostrato abbiamo:

TEOREMA 3.3. *Siano X e Y finiti non vuoti con $|X| = |Y| = n$. Allora*

$$|Bij(X \rightarrow Y)| = n!$$

DIMOSTRAZIONE. Visto che $|X| = |Y|$ allora $Bij(X \rightarrow Y) = Inj(X \rightarrow Y)$ e dunque si tratta solo di porre $n = m$ nell'enunciato del teorema precedente. \square

4. La cardinalità dell'insieme delle parti di un insieme finito

Dato un insieme A , cominciamo col ricordare la definizione, data nel Paragrafo 6 del Capitolo 4, di “insieme delle parti di A ”. L'insieme $\mathcal{P}(A)$ delle parti di A è l'insieme i cui elementi sono tutti i sottoinsiemi di A :

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$$

Osserviamo in particolare che $A \in \mathcal{P}(A)$ e $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$. In questo paragrafo vogliamo contare quanti elementi ha $\mathcal{P}(A)$ nel caso in cui A sia un insieme finito.

TEOREMA 4.1. *Se $|A| = n$ allora $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$*

DIMOSTRAZIONE. Se $A = \emptyset$ allora ho solo un sottoinsieme, e la formula torna. Se $|A| \geq 1$, per contare quanti sono i sottoinsiemi di A immaginiamo di doverne costruire uno. Osserviamo che per individuare un sottoinsieme basta sapere, per ognuno degli n elementi di A , se tale elemento appartiene o no al sottoinsieme. Possiamo dunque passare in rassegna gli elementi di A e per ognuno di loro abbiamo due scelte: SI (sta nel sottoinsieme) oppure NO. Dunque ci sono 2^n distinti sottoinsiemi di A . Osserviamo che l'insieme vuoto corrisponde al caso in cui abbiamo ricevuto sempre la risposta NO e l'insieme A al caso in cui abbiamo ricevuto sempre la risposta SI. \square

OSSERVAZIONE 4.2. Possiamo riformulare la dimostrazione appena svolta dicendo che contare i sottoinsiemi di A equivale a contare le funzioni da A all'insieme di 2 elementi $\{SI, NO\}$. Per il Teorema 3.1 sappiamo che queste sono 2^n .

Proponiamo una seconda dimostrazione del Teorema; è una dimostrazione per induzione che riteniamo significativa.

DIMOSTRAZIONE. Applichiamo il principio di induzione per provare la proposizione T : “per ogni $n \in \mathbb{N}$, se un insieme A ha n elementi, l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ ne ha 2^n ”.

Il predicato $Q(n)$ in questo caso è: “se un insieme A ha n elementi, l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ ne ha 2^n ”.

PASSO BASE: si verifica che $Q(0)$ è vera. Infatti $Q(0)$ dice che l'insieme $\mathcal{P}(\emptyset)$ ha 2^0 elementi. Questo è vero perché $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ e dunque possiede 1 elemento.

PASSO INDUTTIVO: sia $k \in \mathbb{N}$. Bisogna dimostrare che è vera l'implicazione

$$Q(k) \rightarrow Q(k+1)$$

Questo significa che prendiamo per vero che l'insieme delle parti di un insieme con k elementi ha 2^k elementi (è l'ipotesi induttiva) e dobbiamo dimostrare che, se prendiamo un insieme Y con $k+1$ elementi, allora l'insieme $\mathcal{P}(Y)$ ne ha 2^{k+1} .

Sia dunque

$$Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n, y_{n+1}\}$$

Scegliamo un elemento di Y , diciamo y_1 . Osserviamo che i sottoinsiemi di Y sono di due tipi:

- tipo I: sottoinsiemi che contengono y_1 .
- tipo II: sottoinsiemi che non contengono y_1 .

I sottoinsiemi di tipo II, visto che non contengono y_1 , coincidono con i sottoinsiemi di

$$\{y_2, \dots, y_n, y_{n+1}\}$$

che è un insieme di n elementi. Per l'ipotesi induttiva sappiamo dunque che i sottoinsiemi di tipo II sono 2^n .

I sottoinsiemi di tipo I sono anch'essi 2^n . Infatti per costruirli tutti possiamo fare così: prendiamo un sottoinsieme $C \subseteq \{y_2, \dots, y_n, y_{n+1}\}$ e gli aggiungiamo y_1 :

$$C \cup \{y_1\}$$

Quindi abbiamo tanti insiemi di tipo I quanti sono i sottoinsiemi di $\{y_2, \dots, y_n, y_{n+1}\}$ e, ancora per l'ipotesi induttiva, $|\mathcal{P}(\{y_2, \dots, y_n, y_{n+1}\})| = 2^n$.

In conclusione, gli elementi di $\mathcal{P}(Y)$ sono $2^n + 2^n$ ossia 2^{n+1} , e questo termina la verifica del passo induttivo. \square

5. I coefficienti binomiali

Dato un insieme X finito o infinito, costruiamo dei particolari sottoinsiemi del suo insieme delle parti $\mathcal{P}(X)$.

DEFINIZIONE 5.1. Dato $r \in \mathbb{N}$, chiamiamo $\mathcal{P}_r(X)$ l'insieme i cui elementi sono tutti i sottoinsiemi di X che hanno cardinalità r :

$$\mathcal{P}_r(X) = \{A \mid A \subseteq X \wedge |A| = r\}$$

Ora ci poniamo la domanda: se X è finito di cardinalità n , quanti elementi avrà $\mathcal{P}_r(X)$? Certamente $|\mathcal{P}_r(X)|$ sarà un numero naturale $\leq 2^n$, visto che se $r \leq n$ vale $\mathcal{P}_r(X) \subseteq \mathcal{P}(X)$ e se $r > n$ allora $\mathcal{P}_r(X)$ è vuoto.

Capire che numero è $|\mathcal{P}_r(X)|$ significa sapere quanti sono i possibili sottoinsiemi di r elementi di un insieme che ha n elementi. Questa informazione è cruciale nelle strategie che servono per "contare"; perciò $|\mathcal{P}_r(X)|$ merita un nome e un simbolo:

DEFINIZIONE 5.2. Indicheremo $|\mathcal{P}_r(X)|$ con il simbolo $\binom{n}{r}$ (si legge: "coefficiente binomiale n su r ").

Quindi, per esempio, se abbiamo un mazzo di 40 carte, diremo che ad un giocatore possono capitare $\binom{40}{5}$ diverse "mani" di 5 carte. Tra poco sapremo anche calcolare questo numero.

Cominciamo comunque subito ad osservare alcune proprietà dei coefficienti binomiali:

- $\binom{n}{0} = 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Infatti dato un qualunque insieme finito X , questo ha un solo sottoinsieme con 0 elementi, ossia l'insieme vuoto. In particolare vale $\binom{0}{0} = 1$.

Similmente si nota che $\binom{n}{n} = 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

- se $r > n$ allora $\binom{n}{r} = 0$. Infatti se X ha n elementi, non c'è nessun sottoinsieme di X con $r > n$ elementi.

- $\binom{n}{1} = n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Infatti se $n = 0$ si ricade nel punto precedente, se invece $n \geq 1$ allora si osserva che, dato X con n elementi, i suoi sottoinsiemi di cardinalità 1 sono solo i “singoletti” del tipo $\{a\}$, al variare di $a \in X$.
- $\binom{n}{n-1} = n$ per ogni $n \in \mathbb{N}^+$. Infatti, per n positivo deve valere $\binom{n}{n-1} = \binom{n}{1}$: dato X con n elementi, i suoi sottoinsiemi di cardinalità 1 sono tanti quanti i sottoinsiemi di cardinalità $n-1$. La corrispondenza biunivoca è data dall’operazione di prendere il complementare.
- Più in generale, dato $0 \leq r \leq n$, vale che $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$. Anche questa volta l’operazione di prendere il complementare stabilisce una corrispondenza biunivoca fra i sottoinsiemi di X con r elementi e quelli con $n-r$ elementi.

Ecco finalmente una formula esplicita per $\binom{n}{r}$:

TEOREMA 5.3. *Dati $n, r \in \mathbb{N}$, con $0 \leq r \leq n$, vale che*

$$\binom{n}{r} = \frac{n (n-1) (n-2) \cdots (n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r! (n-r)!}$$

OSSERVAZIONE 5.4. Ricordiamo che qui, come in tutto il resto del corso, stiamo usando la convenzione per cui $0! = 1$. Dunque la formula conferma, come già sappiamo, che $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = \frac{n!}{0! n!} = 1$.

DIMOSTRAZIONE. Come prima, fissato un insieme X con n elementi, cerchiamo di contare la cardinalità di $\mathcal{P}_r(X)$. Consideriamo $\mathbb{N}_r = \{1, 2, 3, \dots, r\}$ e una funzione iniettiva

$$f : \mathbb{N}_r \longrightarrow X$$

Chi è $\text{Im } f$? È un sottoinsieme di X di cardinalità r , dunque è un elemento di $\mathcal{P}_r(X)$, proprio uno di quelli che dobbiamo “contare”.

Sarà vero che ogni elemento di $\mathcal{P}_r(X)$ lo posso esprimere come immagine di una funzione iniettiva da \mathbb{N}_r a X ? Sì, preso infatti un elemento di $\mathcal{P}_r(X)$, cioè un sottoinsieme $\{a_1, a_2, \dots, a_r\} \subseteq X$, posso facilmente indicare una funzione iniettiva da \mathbb{N}_r a X la cui immagine sia proprio $\{a_1, a_2, \dots, a_r\}$: per esempio posso prendere la $g : \mathbb{N}_r \longrightarrow X$ definita da $g(1) = a_1, g(2) = a_2, \dots, g(r) = a_r$.

Insomma, con le funzioni iniettive da \mathbb{N}_r a X “raggiungiamo” tutti gli elementi di $\mathcal{P}_r(X)$. Per trovare $|\mathcal{P}_r(X)|$ potremmo allora cominciare a contare $|\text{Inj}(\mathbb{N}_r \rightarrow X)|$, ossia quante sono le funzioni iniettive da \mathbb{N}_r a X . Ma questo numero lo abbiamo già calcolato nel Teorema 3.2: è $n (n-1) (n-2) \cdots (n-r+1)$.

È vero allora che $|\mathcal{P}_r(X)| = n (n-1) (n-2) \cdots (n-r+1)$? NO, perché se scriviamo così commettiamo l’errore di contare ogni elemento di $\mathcal{P}_r(X)$ più volte. Precisamente, dato un sottoinsieme $\{a_1, a_2, \dots, a_r\} \subseteq X$ lo stiamo contando $|\text{Inj}(\mathbb{N}_r \rightarrow \{a_1, a_2, \dots, a_r\})|$ volte, cioè tante volte quante sono le diverse funzioni iniettive possibili da \mathbb{N}_r a $\{a_1, a_2, \dots, a_r\}$. Ma sappiamo quanto vale $|\text{Inj}(\mathbb{N}_r \rightarrow \{a_1, a_2, \dots, a_r\})|$: applicando la formula per il conto delle funzioni iniettive a questo caso particolare in cui dominio e codominio hanno la stessa cardinalità r (dunque stiamo in realtà considerando le funzioni bigettive), troviamo che $|\text{Inj}(\mathbb{N}_r \rightarrow \{a_1, a_2, \dots, a_r\})| = |\text{Bij}(\mathbb{N}_r \rightarrow \{a_1, a_2, \dots, a_r\})| = r!$.

Allora, visto che col numero $n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$ abbiamo contato $r!$ volte ogni elemento di $\mathcal{P}_r(X)$, per avere $|\mathcal{P}_r(X)|$ basterà dividerlo per $r!$:

$$\binom{n}{r} = |\mathcal{P}_r(X)| = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{r!}$$

□

Possiamo ora tornare all'esempio delle carte da gioco, e concludere che, se abbiamo un mazzo di 40 carte, ad un giocatore possono capitare

$$\binom{40}{5} = \frac{40!}{5!35!} = \frac{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36}{5!} = 658008$$

diverse “mani” di 5 carte.

6. Contare con i binomiali: esempi

In questo paragrafo presentiamo alcuni esempi di problemi di calcolo combinatorio, in cui giocano un ruolo importante i coefficienti binomiali.

Le partizioni di un numero: un primo assaggio

Dato un intero n , quante sono le triple (x, y, z) di interi non negativi che verificano $x + y + z = n$?

SOLUZIONE: Cominciamo, a sorpresa, ponendoci un'altra domanda: se devo mettere in fila n palline bianche uguali fra loro e due nere (sempre uguali fra loro), in quanti modi posso farlo? La risposta è $\binom{n+2}{2}$ perché basta scegliere le due posizioni (fra le $n+2$ posizioni della fila) in cui mettere le due palline nere. Ora, le due domande che abbiamo considerato “contano” lo stesso numero, dunque anche la risposta al problema delle triple è $\binom{n+2}{2}$. Questo procedimento è tipico dei problemi del contare: per contare quanti elementi ha un insieme, se ne considera un altro che sappiamo avere la stessa cardinalità ma in cui sappiamo “contare” meglio. Nel caso in questione, ci resta da spiegare perché le due domande conducono alla stessa risposta. Una fila in cui compaiono n palline bianche e due palline nere individua una tripla nel seguente modo (vedi Figura 1): chiamo x il numero palline bianche che trovo prima di incontrare la prima pallina nera, y il numero di palline bianche comprese fra le due palline nere, e infine z il numero di palline bianche che incontro dopo l'ultima pallina nera. Viceversa, data una tripla (x, y, z) di interi non negativi che verificano $x + y + z = n$ possiamo costruire una fila di n palline bianche e due palline nere ponendo prima x palline bianche, poi una nera, poi y bianche, poi una nera, e infine le restanti z bianche.

□

Possiamo generalizzare subito questo risultato:

ESERCIZIO 6.1. Dato un numero naturale m e un numero intero positivo n , dimostrare che le n -uple (x_1, x_2, \dots, x_n) di numeri non negativi tali che $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = m$ sono

$$\binom{m+n-1}{n-1}.$$




FIGURA 1. Due file di palline (“leggiamole” da sinistra a destra). Alla fila in alto associamo la tripla $(3, 4, 1)$ a quella in basso la tripla $(3, 0, 5)$.

In altre parole, usando il linguaggio dei polinomi, questo è il numero dei possibili monomi di grado m nelle variabili x_1, x_2, \dots, x_n .

Il poker

Supposto che le regole del poker a 52 carte (poker USA versione standard) siano note, determinare quante sono le mani che è possibile servire e che contengono:

- (1) una qualunque configurazione (in sostanza qui si chiede quale è il numero delle mani distinte che è possibile servire).
- (2) Scala reale massima.
- (3) Scala reale.
- (4) Colore.
- (5) Scala.
- (6) Nessun punto.
- (7) Poker.
- (8) Full.
- (9) Tris.
- (10) Doppia coppia.
- (11) Una coppia.

SOLUZIONE: (1) Devo scegliere 5 carte su 52, senza ripetizioni, nessuna restrizione. Il numero che cerco è quindi il numero di sottoinsiemi di 5 elementi di un insieme di 52 elementi, quindi $\binom{52}{5}$.

- (2) Per una scala reale massima le carte devono essere dello stesso seme, in scala e finire con un asso. C'è quindi una scala reale massima per ogni seme, quindi ce ne sono in totale 4.
- (3) Per una scala reale, le carte devono essere tutte e 5 dello stesso seme, e la più grande può essere $5, 6, \dots, A$, quindi ce ne sono 10 per seme. Per 4 semi, 40. Si ricorda che la scala reale minima ($A, 2, 3, 4, 5$ dello stesso seme) batte la massima.
- (4) Per avere un colore, le 5 carte devono essere tutte dello stesso seme. Ne dobbiamo scegliere quindi 5 su 13, cioè $\binom{13}{5}$. Dato che ci sono 4 semi il numero di colori è $\binom{13}{5} \cdot 4$. Il numero dei colori che non sono una scala reale è $\binom{13}{5} \cdot 4 - 40$.
- (5) Ci sono 10 sequenze di valori possibili per una scala. Dato che non abbiamo restrizioni sul seme da scegliere, il totale delle scale è $10 \cdot \binom{4}{1}^5$. Il numero delle scale non reali è $10 \cdot \binom{4}{1}^5 - 40$.

- (6) Per non avere nessun punto, devo non avere nessun valore uguale e devo poi sottrarre al numero ottenuto il numero delle scale reali, delle scale e dei colori. Il numero di mani senza un valore ripetuto è $\binom{13}{5} \cdot \binom{4}{1}^5$. Infatti devo scegliere 5 valori su 13 e per ciascuno un seme su quattro.
- (7) Poker: scelgo un valore su tredici $\binom{13}{1}$, quattro carte su quattro per quel valore $\binom{4}{4}$ e mi rimane una carta da scegliere su quarantotto $\binom{48}{1}$. Il numero totale è quindi $\binom{13}{1} \cdot \binom{4}{4} \cdot \binom{48}{1}$.
- (8) Full: scelgo il primo valore, quello per il tris, in $\binom{13}{1}$ modi; posso scegliere le tre carte del tris in $\binom{4}{3}$ modi diversi. Scelgo il valore per la coppia, (uno sui dodici rimanenti) $\binom{12}{1}$. Posso scegliere le due carte della coppia in $\binom{4}{2}$ modi diversi. Il numero totale è quindi $\binom{13}{1} \cdot \binom{4}{3} \cdot \binom{12}{1} \cdot \binom{4}{2}$.
- (9) Tris: scelgo un valore su tredici $\binom{13}{1}$; posso scegliere queste tre carte su quattro in $\binom{4}{3}$ modi diversi. Per le restanti due carte, devo avere: nessuna coppia, su le 48 carte rimanenti (48 e non 49 perchè voglio evitare di contare anche i poker che potrebbero essere generati da un tris). Devo quindi scegliere due valori su dodici $\binom{12}{2}$ senza restrizioni sul seme $\binom{4}{1}^2$. Il totale è $\binom{13}{1} \cdot \binom{4}{3} \cdot \binom{12}{2} \cdot \binom{4}{1}^2$.
- (10) Doppia coppia: scelgo il valore delle coppie $\binom{13}{2}$; posso scegliere le due carte in $\binom{4}{2}$ modi diversi per la prima coppia e similmente per la seconda. Scelgo il valore della carta rimanente $\binom{11}{1}$; posso scegliere questa carta in $\binom{4}{1}$ modi diversi. Il totale è quindi $\binom{13}{2} \cdot \binom{4}{2}^2 \cdot \binom{11}{1} \cdot \binom{4}{1}$.
- (11) Coppia: Scelgo il valore della coppia $\binom{13}{1}$; posso scegliere le due carte in $\binom{4}{2}$ modi diversi. Per le restanti tre carte, scelgo tre valori distinti $\binom{12}{3}$. Non ho restrizioni sul seme di queste tre carte, quindi il fattore è $\binom{4}{1}^3$. Il totale è quindi $\binom{13}{1} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{12}{3} \cdot \binom{4}{1}^3$. \square

OSSERVAZIONE 6.2. Un altro modo di calcolare il numero di mani che mi dà un tris è: in un tris ci devono essere tre valori distinti, che posso quindi scegliere in $\binom{13}{3}$ modi diversi. Posso scegliere le carte del tris in $\binom{4}{3}$ modi diversi, e le due carte rimanenti in $\binom{4}{1}$ modi ciascuna. Devo ancora considerare che devo scegliere quale dei tre valori scelti sia quello del tris, e questo posso farlo in 3 modi diversi. Il numero totale è quindi

$$\binom{13}{3} \cdot \binom{4}{3} \cdot \binom{4}{1}^2 \cdot 3$$

OSSERVAZIONE 6.3. Notiamo che le mani con un full sono 3744 mentre quelle con un colore sono 5108, in concordanza col fatto che nel poker americano il full batte il colore. Cosa accade nel poker "italiano", per esempio se le carte a disposizione sono solo 7,8,9,10, jack, donna, re e asso ?

Un cono dal gelataio.

Un gelataio ha 20 gusti di gelato, 12 alla frutta e 8 non di frutta.

- In quanti modi si può fare un cono con 4 gusti ?
- In quanti modi si può fare un cono con 4 gusti, di cui almeno due di frutta ?
- In quanti modi si può fare un cono con 4 gusti, di cui almeno due di frutta, ma in cui non

si trovano insieme il limone e il fiordilatte ?

SOLUZIONE: a) In $\binom{20}{4}$ modi, si tratta infatti di scegliere 4 elementi in un insieme di 20.

b) Qui bisogna stare attenti, conviene contare il complementare: infatti se dai $\binom{20}{4}$ coni possibili togliamo gli $\binom{8}{4}$ coni senza frutta e i $12\binom{8}{3}$ coni in cui c'è esattamente un solo gusto di frutta, quelli che restano sono i coni con almeno due gusti di frutta, ossia proprio quelli che ci interessano. Dunque la risposta è $\binom{20}{4} - \binom{8}{4} - 12\binom{8}{3}$.

c) Anche qui conviene contare il complementare: se dai $\binom{20}{4} - \binom{8}{4} - 12\binom{8}{3}$ coni con almeno due gusti di frutta si levano quelli che hanno fiordilatte e limone insieme, i coni che restano sono proprio quelli che ci interessano. Quanti sono i coni con almeno due gusti di frutta che hanno fiordilatte e limone insieme? Visto che fiordilatte e limone ci sono, restano da decidere due palline. Se sono entrambe di frutta, si possono scegliere in $\binom{11}{2}$ modi. Se sono una di frutta (11 possibilità) e una non di frutta (7 possibilità), si possono scegliere in $11 \cdot 7$ modi. Ricordiamo che non contempliamo il caso in cui sono entrambe non di frutta perché vogliamo che nel nostro cono ci siano almeno due gusti di frutta. Dunque la risposta è $\binom{20}{4} - \binom{8}{4} - 12\binom{8}{3} - \binom{11}{2} - 11 \cdot 7$. \square

Estrazioni.

In una scatola vi sono 30 palline numerate da 1 a 30. Le palline da 1 a 10 sono colorate di rosso, le palline da 11 a 20 sono colorate di verde e le palline da 21 a 30 sono colorate di giallo. In quanti modi diversi si possono estrarre:

- (i) 3 palline di diverso colore,
- (ii) 3 palline dello stesso colore,
- (iii) 3 palline di al più 2 colori.

N.B.: consideriamo come diversi due gruppi di palline con stessi colori ma diversi numeri.

SOLUZIONE: (i) Estrarre 3 palline di diverso colore significa estrarre una pallina rossa, una pallina verde ed una pallina gialla. Visto che le scelte sono indipendenti e che vi sono 10 palline per ogni colore, abbiamo 10^3 scelte possibili.

(ii) Abbiamo 3 modi di scegliere il colore e, una volta fissato il colore, basta estrarre 3 palline da un gruppo di 10 palline del colore fissato. Quindi il numero totale di scelte totale possibili è $3 \binom{10}{3}$

(iii) Scegliere 3 palline di al più 2 colori è equivalente ad escludere le scelte con 3 palline di colore diverso. Allora visto che tutte le possibili estrazioni sono $\binom{30}{3}$ abbiamo che le scelte cercate sono $\binom{30}{3} - 10^3$ per quanto visto sopra. \square

7. Il triangolo di Pascal-Tartaglia

Cominciamo questo paragrafo individuando una regola fondamentale che permette di costruire ricorsivamente i coefficienti binomiali.

8. Il teorema del binomio di Newton

Vediamo adesso perché i numeri $\binom{n}{r}$ si chiamano “coefficienti binomiali”. Date due variabili a e b , consideriamo il binomio $(a + b)$ e le sue prime potenze:

$$\begin{aligned}(a + b)^0 &= 1 \\ (a + b)^1 &= a + b \\ (a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\end{aligned}$$

Come possiamo notare, i coefficienti che compaiono in questi sviluppi sono, riga per riga, gli elementi delle prime righe del Triangolo di Pascal -Tartaglia: 1, 1-1, 1-2-1, 1-3-3-1.

Questa osservazione vale in generale: i coefficienti dello sviluppo del binomio $(a + b)^n$ sono proprio i “coefficienti binomiali” $\binom{n}{r}$.

TEOREMA 8.1 (Teorema del binomio di Newton). *Date due variabili a e b , per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale:*

$$(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^i$$

cioè

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{n-1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

DIMOSTRAZIONE. Cominciamo da un esempio, per avere un’idea di cosa succede. Calcoliamo lo sviluppo di $(a + b)^3$. Se non raggruppiamo i termini troviamo:

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= (a + b)(a + b)(a + b) = a(a + b)(a + b) + b(a + b)(a + b) = \\ &= aa(a + b) + ab(a + b) + ba(a + b) + bb(a + b) = aaa + aab + aba + abb + baa + bab + bba + bbb\end{aligned}$$

Abbiamo espresso $(a + b)^3$ come somma di 8 monomi, ognuno dei quali è stato ottenuto, tramite le proprietà distributiva e associativa, scegliendo o a o b da ogni parentesi che compare in $(a + b)(a + b)(a + b)$.

Quindi, raggruppando adesso i termini tramite la proprietà commutativa, quale sarà il coefficiente di a^2b ? Sarà uguale al numero dei monomi in cui troviamo due a e una b . E questi quanti sono? Sono $3 = \binom{3}{2}$, ossia sono tanti quanti sono i modi di scegliere due parentesi fra le tre del prodotto $(a + b)(a + b)(a + b)$ (queste saranno le parentesi da cui prendo la a): la prima e la seconda, la prima e la terza, la seconda e la terza. Dunque nello sviluppo avremo $3a^2b$. Ovviamente, saremmo arrivati allo stesso risultato contando i modi di scegliere una parentesi fra le tre del prodotto $(a + b)(a + b)(a + b)$ (quella da cui prendo la b), perché $\binom{3}{1} = \binom{3}{2} = 3$.

Passiamo al caso generale. Nello sviluppo di $(a + b)^n$ troveremo 2^n monomi, ciascuno ottenuto scegliendo o a o b da ognuna delle n parentesi del prodotto

$$(a + b)^n = (a + b)(a + b)(a + b) \cdots (a + b)(a + b)$$

Raggruppando i termini, preso un indice i con $0 \leq i \leq n$, quale sarà allora il coefficiente di $a^{n-i}b^i$? Sarà uguale al numero di modi con cui si possono scegliere i parentesi fra le n del prodotto $(a + b)(a + b)(a + b) \cdots (a + b)(a + b)$ (quelle da cui prendiamo la b); dunque

sarà uguale a $\binom{n}{i}$. Oppure sarà uguale al numero di modi con cui si possono scegliere $n - i$ parentesi fra le n del prodotto $(a + b)(a + b)(a + b) \cdots (a + b)(a + b)$ (quelle da cui prendiamo la a): infatti come sappiamo $\binom{n}{i} = \binom{n}{n-i}$. In conclusione, nello sviluppo di $(a + b)^n$ troveremo il termine $\binom{n}{i} a^{n-i} b^i$. Siccome questo è vero per ogni i , con $0 \leq i \leq n$, abbiamo dimostrato il teorema. \square

9. Esercizi

ESERCIZIO 9.1. Dato un insieme X di cardinalità n , quante sono le coppie $(a, b) \in X \times X$ tali che $a \neq b$?

Quante sono le n -uple $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in X^n$ tali che $a_i \neq a_j$ per ogni $i \neq j$?

Qual è la cardinalità di $\text{Inj}(\mathbb{N}_2 \rightarrow X)$?

Qual è la cardinalità di $\text{Inj}(\mathbb{N}_n \rightarrow X)$?

Rispondere a queste quattro domande ed evidenziare i collegamenti fra di loro.

ESERCIZIO 9.2. Contare quante sono le funzioni surgettive da \mathbb{N}_5 a \mathbb{N}_3 .

ESERCIZIO 9.3. Descrivere una funzione da \mathbb{N}_{15} a \mathbb{N}_{15} che non sia bigettiva. Quante sono tali funzioni?

ESERCIZIO 9.4. Sia $f: A \rightarrow B$ con A, B insiemi finiti, e supponiamo che ogni $b \in B$ abbia n controimmagini in A . Quale è il rapporto tra $|A|$ e $|B|$?

ESERCIZIO 9.5. Quante sono le funzioni $f: \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$ tali che per ogni x nel dominio di f si ha $f(x) \geq x$? Dimostrare per induzione un risultato generale.

ESERCIZIO 9.6. Dimostrare che per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$ (in base a quanto abbiamo visto nel corso, ci sono varie dimostrazioni possibili..).

ESERCIZIO 9.7. Dimostrare che per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale $\sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} = 0$.

ESERCIZIO 9.8. Trovare il più piccolo intero positivo n_0 tale che la disuguaglianza

$$\sum_{i=1}^n \binom{n}{i} \geq n^2 + 3n$$

sia valida per tutti gli interi $n \geq n_0$ e dimostrare questo fatto per induzione.

ESERCIZIO 9.9. Dimostrare che, per ogni intero positivo n vale

$$\sum_{i=0}^n i \binom{n}{i} = n2^{n-1}$$

ESERCIZIO 9.10. Si consideri il numero

$$2^3 3^4 5^7 11^6 = 281253024360$$

- Quanti sono i suoi divisori in \mathbb{Z} ?
- Quanti sono i suoi divisori che sono divisibili per 2 o per 3 ?

ESERCIZIO 9.11. Si consideri l'insieme dei primi venti numeri interi positivi $A = \{1, 2, \dots, 19, 20\}$. Diciamo che un sottoinsieme di A è misto se fra i suoi elementi ci sono almeno un numero pari e almeno un numero dispari.

- Quanti sono i sottoinsiemi di A che NON sono misti ?
- Quanti sono i sottoinsiemi misti che contengono esattamente 2 numeri pari ?
- Quanti sono i sottoinsiemi misti di cardinalità 7 ?

ESERCIZIO 9.12. In uno stato le targhe delle macchine sono composte da 13 caratteri. Un carattere può essere una cifra (ossia 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) o la lettera A.

- a) Quante sono le macchine che possono essere immatricolate ?
- b) Quante sono le targhe che contengono esattamente tre A ?
- c) Quante sono le targhe che contengono esattamente tre A consecutive ?
- d) Quante sono le targhe che contengono esattamente tre A e che sono palindrome, ossia sono uguali se lette da sinistra a destra o da destra a sinistra ?

ESERCIZIO 9.13. In una targa automobilistica compaiono due lettere, poi tre cifre e poi di nuovo due lettere, tipo: AX 456 TK. Sono ammesse le ripetizioni, le lettere sono scelte da un alfabeto di 26 lettere, le cifre possibili sono 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

- a) Quante sono tutte le possibili targhe?
- b) Quante sono le targhe in cui c'è una lettera che compare esattamente tre volte?
- c) Quante sono le targhe in cui c'è almeno una lettera che compare almeno due volte?
- d) Quante sono le targhe in cui le cifre pari che compaiono sono di più delle cifre dispari?

ESERCIZIO 9.14. Trenta studenti devono essere distribuiti in 3 classi: classe A, classe B e classe C. Quanti sono in modi di distribuire gli studenti nelle classi supponendo:

- che ogni classe deve contenere 10 studenti?
- che ogni classe può contenere un numero qualsiasi di studenti?
- che ogni classe può contenere un numero qualsiasi di studenti purché diverso da zero?

ESERCIZIO 9.15. L'alfabeto italiano consiste di 21 lettere di cui 5 vocali e 16 consonanti. Quante parole di 7 lettere si possono formare:

- Supponendo di non poter usare due volte la stessa lettera?
- Supponendo di non poter utilizzare due volte la stessa vocale?
- Supponendo di non poter affiancare due lettere uguali?

- In quanti modi diversi possiamo farlo se vogliamo che i numeri dispari stiano tutti su caselle dello stesso colore ?
- In quanti modi diversi possiamo farlo se vogliamo che tutti i multipli di 4 stiano su caselle nere ?
- In quanti modi diversi possiamo farlo se vogliamo che ogni colonna contenga esattamente 4 dispari ?

ESERCIZIO 9.21. Ad una gara di ciclismo sono presenti 20 squadre di 9 corridori ciascuna. Si vogliono scegliere 22 corridori per un controllo antidoping preventivo:

- In quanti diversi modi si può scegliere il gruppo di corridori da controllare ?
- In quanti diversi modi si può scegliere il gruppo di corridori da controllare se si vuole controllare almeno un corridore per squadra ?
- In quanti diversi modi si può scegliere il gruppo di corridori da controllare se si vuole che ci sia una e una sola squadra della quale sono chiamati al controllo tutti i corridori ?

ESERCIZIO 9.22. Sia $\mathbb{N}_{30} = \{1, 2, 3, 4, \dots, 28, 29, 30\}$.

- Quanti sono i sottoinsiemi di \mathbb{N}_{30} che contengono esattamente tre numeri pari e quattro numeri dispari ?
- Quanti sono i sottoinsiemi di \mathbb{N}_{30} che contengono un numero pari (positivo, non zero) di numeri pari ?
- Quanti sono i sottoinsiemi di \mathbb{N}_{30} che contengono almeno tre numeri pari e due numeri dispari ?

ESERCIZIO 9.23. Consideriamo i numeri interi x tali che $10000000 \leq x < 20000000$.

- a) In quanti di questi numeri, scritti in notazione decimale, la cifra 3 compare esattamente due volte?
- b) In quanti di questi numeri, scritti in notazione decimale, le cifre che compaiono sono tutte diverse fra loro?
- c) Quanti di questi numeri si scrivono (in notazione decimale) usando al più due cifre?

ESERCIZIO 9.24. Vogliamo costruire un numero di 13 cifre, usando solo le cifre 1,2,3,4,5,6.

- a) Quanti numeri possiamo costruire?
- b) Quanti numeri possiamo costruire in cui compaiono almeno due cifre distinte?
- c) Quanti numeri possiamo costruire in cui la cifra 1 compare esattamente quattro volte?

- d) Quanti numeri possiamo costruire in cui compaiono più cifre pari che cifre dispari?
 [Per evitare ambiguità in questa ultima domanda chiariamo per esempio che il numero 1111111111121 va considerato con 12 cifre dispari (anche se la cifra usata è sempre l'1) e una pari. Similmente, il numero 1112223334445 va considerato con sette cifre dispari e sei pari]

- SOLUZIONE: a) Per ognuna delle tredici posizioni da occupare con una cifra abbiamo 6 scelte. Dunque possiamo costruire 6^{13} numeri distinti.
- b) Conviene contare per complementare. I numeri in cui compaiono almeno due cifre sono tutti i numeri costruibili (che sono 6^{13}) eccetto i 6 numeri in cui si usa una sola delle cifre che abbiamo a disposizione. Dunque la risposta è $6^{13} - 6$.
- c) Bisogna scegliere le 4 posizioni dove comparirà la cifra 1. Questo si può fare in $\binom{13}{4}$ modi. Nelle nove caselle rimanenti possiamo mettere una delle cifre 2,3,4,5,6. Abbiamo dunque 5^9 modi di completare la costruzione del numero. In conclusione la risposta è $\binom{13}{4} 5^9$.
- d) Qui conviene pensare alla simmetria generale del problema. Possiamo usare tre cifre pari (2,4,6) e tre cifre dispari (1,3,5) per costruire il nostro numero. Ogni numero che costruiamo avrà più cifre pari che cifre dispari o viceversa (non potrà capitare che abbia tante cifre pari quante dispari perché il numero ha tredici cifre). Questo ci permette di intuire che la risposta sarà

$$\frac{6^{13}}{2}$$

ossia i numeri con più cifre pari saranno la metà del totale.

Formalizziamo meglio questa intuizione, mostrando una funzione bigettiva fra l'insieme dei numeri da noi costruibili con più cifre pari e l'insieme di quelli con più cifre dispari. Sia $f : \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ la funzione definita da $f(1) = 2, f(2) = 1, f(3) = 4, f(4) = 3, f(5) = 6, f(6) = 5^3$. A questo punto, se

$$a_{12}a_{11}a_{10}a_9 \dots a_3a_2a_1a_0$$

è uno dei 6^{13} numeri che possiamo ottenere, lo mettiamo in corrispondenza col numero

$$f(a_{12})f(a_{11})f(a_{10})f(a_9) \dots f(a_3)f(a_2)f(a_1)f(a_0)$$

Potete facilmente verificare che questa corrispondenza descrive una funzione bigettiva fra l'insieme dei numeri da noi costruibili con più cifre pari e l'insieme di quelli con più cifre dispari. Notate che al posto della f avremmo potuto scegliere un'altra permutazione dei numeri 1,2,3,4,5,6 che manda pari in dispari e dispari in pari. \square

³Usando il linguaggio che introdurremo nel Paragrafo 3 sul gruppo simmetrico possiamo dire che f è la permutazione $(1, 2)(3, 4)(5, 6)$.

Contare.... l'infinito

1. Prime osservazioni

Nel Capitolo 9 abbiamo dato la definizione di insieme infinito “per esclusione” (un insieme X è infinito quando non è finito.).

Quando consideriamo gli insiemi infiniti, una prima domanda naturale da porsi è se due insiemi infiniti si possono confrontare fra di loro, o, in altri termini, se si può stabilire se uno dei due è “più grande” dell'altro. Facciamo subito un esempio che ci fa capire come il concetto di “più grande” vada precisato.

PROPOSIZIONE 1.1. *Gli insiemi \mathbb{N} e \mathbb{Z} sono in corrispondenza biunivoca. Gli insiemi \mathbb{N} e $\mathbb{N}^{>0}$ sono in corrispondenza biunivoca.*

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo la funzione f da \mathbb{N} a \mathbb{Z} che manda un numero naturale pari $2k$ nella sua metà, ossia in k , e un numero naturale dispari $2k + 1$ in $-k - 1$. Non è difficile (esercizio !) dimostrare che f è bigettiva e dunque che \mathbb{N} e \mathbb{Z} sono equipotenti.

Costruiamo ora una funzione bigettiva g da \mathbb{N} a $\mathbb{N}^{>0}$. Basta porre, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $g(n) = n + 1$.

□

La proposizione appena dimostrata può apparire, da un certo punto di vista, sorprendente; infatti, dato che

$$\mathbb{N}^{>0} \subsetneq \mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$$

(il simbolo \subsetneq significa “incluso strettamente”) a prima vista, sbagliando, avremmo potuto pensare che non è possibile mettere in corrispondenza biunivoca gli elementi di \mathbb{N} con quelli di $\mathbb{N}^{>0}$ e di \mathbb{Z} .

Eppure è forte la nostra intuizione che, se fra due insiemi esiste una corrispondenza biunivoca, questi due insiemi hanno “la stessa cardinalità”. L'infinito mette dunque in crisi il concetto di “più grande”, o meglio, ci chiede di precisarlo: una cosa è l'inclusione, un'altra la cardinalità.

DEFINIZIONE 1.2. Diciamo che due insiemi X e Y hanno la stessa cardinalità ($|X| = |Y|$), o che sono equipotenti, se esiste una funzione bigettiva $f : X \rightarrow Y$. Se esiste una funzione iniettiva da X a Y si dice che X ha cardinalità minore o uguale a quella di Y e si scrive $|X| \leq |Y|$. Scriviamo $|X| < |Y|$ (e diciamo che X ha cardinalità strettamente minore di quella Y) quando vale $|X| \leq |Y|$ e X e Y non sono equipotenti.

Nello studio degli insiemi infiniti procederemo come abbiamo fatto per quelli di cardinalità finita, ossia individueremo alcuni insiemi “campione” che serviranno da confronto e riferimento per gli altri insiemi infiniti.

2. Gli insiemi infiniti numerabili

Il primo insieme “campione” che prendiamo in considerazione è \mathbb{N} : diremo che un insieme è “infinito numerabile” se è equipotente a \mathbb{N} .

Fra gli insiemi infiniti numerabili, oltre ad \mathbb{N} stesso, abbiamo già individuato \mathbb{Z} e $\mathbb{N}^{>0}$. Quest'ultimo è \mathbb{N} privato di uno dei suoi elementi.

Sorge subito una domanda: cosa accade se ad \mathbb{N} leviamo un numero finito, diciamo $m > 0$, di elementi? Abbiamo ancora un insieme infinito numerabile. La dimostrazione è analoga a quella della equipotenza di \mathbb{N} e $\mathbb{N}^{>0}$: come primo passo osserviamo che \mathbb{N} privato di m elementi è equipotente a $\mathbb{N} - \{0, 1, 2, 3, 4, \dots, m - 1\}$; ci resta dunque da trovare una funzione bigettiva fra \mathbb{N} e $\mathbb{N} - \{0, 1, 2, 3, 4, \dots, m - 1\}$...

Approfondiamo lo studio dei sottoinsiemi infiniti di \mathbb{N} . Possiamo dividerli in due famiglie: quelli che hanno complementare finito (ne abbiamo appena parlato) e quelli che hanno complementare infinito (per esempio l'insieme dei numeri pari, il cui complementare, l'insieme dei numeri dispari, è anch'esso infinito). Per entrambe le famiglie vale comunque

TEOREMA 2.1. *Sia A un sottoinsieme infinito di \mathbb{N} ; allora A è equipotente a \mathbb{N} .*

DIMOSTRAZIONE. Dobbiamo costruire una funzione bigettiva da \mathbb{N} ad A . Un modo per farlo, per esempio, è quello di mandare 0 nell'elemento minimo di A (chiamiamolo a_0 : esiste per il principio del minimo); poi mandiamo 1 nell'elemento minimo (che chiameremo a_1) di $A - \{a_0\}$, poi 2 nell'elemento minimo di $A - \{a_0, a_1\}$. E così via... \square

Non abbiamo difficoltà a riadattare questo teorema esprimendolo con un enunciato leggermente più generale:

TEOREMA 2.2. *Se U è un sottoinsieme infinito di un insieme infinito numerabile X , allora U è infinito numerabile: $|U| = |X|$.*

Torniamo ora all'osservazione che \mathbb{Z} è numerabile; possiamo esprimerla anche dicendo che l'unione di due copie di \mathbb{N} è ancora numerabile. Più in generale:

TEOREMA 2.3. *Se X è un insieme infinito numerabile e Y è un insieme finito o infinito numerabile, allora $X \cup Y$ è un insieme infinito numerabile.*

DIMOSTRAZIONE. Nel passare da X a $X \cup Y$, gli elementi che aggiungiamo veramente sono quelli di $Y - X$. Dividiamo dunque la dimostrazione in due casi a seconda che $Y - X$ risulti infinito o finito.

Se $Y - X$ è finito (poniamo che abbia $m > 0$ elementi), per mostrare che X è equipotente a $X \cup (Y - X)$ possiamo cominciare con l'osservare che X , essendo infinito numerabile, è equipotente a \mathbb{N} ma è anche equipotente, visto il Teorema 2.1, a $\mathbb{N} - \{0, 1, 2, \dots, m - 1\}$. Esiste dunque una funzione bigettiva da X a $\mathbb{N} - \{0, 1, 2, \dots, m - 1\}$. È facile a questo punto “estenderla” ad una funzione bigettiva da $X \cup (Y - X)$ a \mathbb{N} .

Se $Y - X$ è infinito, vuol dire che è infinito numerabile. Infatti siamo necessariamente nel caso in cui Y è infinito numerabile ed esiste dunque una funzione bigettiva da Y a \mathbb{N} , che per restrizione ci dà una funzione bigettiva da $Y - X$ ad un sottoinsieme di \mathbb{N} . Per il Teorema 2.1, sappiamo che tale sottoinsieme è infinito numerabile. Possiamo allora costruire una funzione bigettiva da $X \cup Y = X \cup (Y - X)$ a \mathbb{Z} , nel seguente modo: troviamo una funzione bigettiva da X al sottoinsieme di \mathbb{Z} dato dai numeri non negativi, e una funzione bigettiva da $Y - X$ al sottoinsieme dato dai numeri negativi (tali sottoinsiemi sono equipotenti a \mathbb{N}). Dunque $X \cup Y$ è equipotente a \mathbb{Z} , che, come sappiamo (Proposizione 1.1) è equipotente a \mathbb{N} .

□

3. Un'altra definizione di infinito

Nessuna cardinalità infinita è minore di quella numerabile: questo risultato, che è esposto nel seguente teorema, chiarisce come mai si sceglie \mathbb{N} come primo riferimento per valutare gli insiemi infiniti.

TEOREMA 3.1. *Sia X un insieme infinito. Allora X contiene un sottoinsieme infinito numerabile. Dunque vale*

$$|\mathbb{N}| \leq |X|$$

DIMOSTRAZIONE. Visto che X è infinito, dunque non vuoto, possiamo scegliere un elemento $x_0 \in X$. Consideriamo poi $X - \{x_0\}$: anche questo insieme non è vuoto, e scegliamo $x_1 \in X - \{x_0\}$. Visto che anche $X - \{x_0, x_1\}$ non è vuoto possiamo scegliere $x_2 \in X - \{x_0, x_1\}$ e così via.. Il sottoinsieme di X i cui elementi sono gli x_i è un sottoinsieme infinito numerabile¹. □

Il teorema appena dimostrato ci permette di fare una ulteriore importante osservazione:

TEOREMA 3.2. *Sia X un insieme infinito. Allora esiste un sottoinsieme proprio $V \subsetneq X$ equipotente a X .*

DIMOSTRAZIONE. L'enunciato si può dimostrare con un procedimento di "incollamento di funzioni". Sia infatti $\mathcal{N} \subset X$ un sottoinsieme numerabile di X (esiste, come ci garantisce il Teorema 3.1). Scegliamo un elemento $\gamma \in \mathcal{N}$. Nel paragrafo precedente abbiamo mostrato come costruire una funzione bigettiva da \mathbb{N} a $\mathbb{N} - \{0\}$; a partire da questa possiamo immediatamente costruire una funzione bigettiva h da \mathcal{N} a $\mathcal{N} - \{\gamma\}$. Poniamo $V = X - \{\gamma\}$. Possiamo ora ottenere una funzione bigettiva f da X a V nel seguente modo: definiamo $f(x) = x$ per ogni $x \in X - \mathcal{N}$ e $f(z) = h(z)$ per ogni $z \in \mathcal{N}$. La f , in altre parole, si comporta come l'identità su $X - \mathcal{N}$, mentre su \mathcal{N} è definita incollando un'altra funzione, la h , che è bigettiva fra \mathcal{N} e $\mathcal{N} - \{\gamma\}$. □

Questo risultato ci permette di dare una caratterizzazione degli insiemi infiniti²:

TEOREMA 3.3. *Un insieme è infinito se e solo se è equipotente ad un suo sottoinsieme proprio.*

DIMOSTRAZIONE. Che un insieme infinito abbia questa proprietà lo abbiamo appena visto col Teorema 3.2; che un insieme finito non goda di questa proprietà lo sappiamo grazie al lemma dei cassetti (che, lo ricordiamo, vale appunto per insiemi finiti). □

¹Questo procedimento nasconde una induzione...ed è simile a quello del Teorema 2.1. In questo caso l'induzione è "rafforzata", a ben guardare, da qualcosa di più, l'*assioma della scelta numerabile*. Non approfondiremo qui questo tema, convinti che la vostra intuizione consideri ragionevole la dimostrazione appena data.

²L'enunciato del Teorema 3.3 fu scelto da Dedekind con *definizione* di insieme infinito.

4. Numerabilità dell'insieme dei numeri razionali

Continuiamo a passare in rassegna alcuni insiemi infiniti, confrontandoli con l'insieme campione \mathbb{N} . Possiamo chiederci per esempio se $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ abbia più elementi di \mathbb{N} . La risposta è no, e la possiamo ottenere utilizzando il “primo procedimento diagonale di Cantor”:

TEOREMA 4.1 (Cantor, 1874). *Il prodotto cartesiano di due insiemi infiniti numerabili è infinito numerabile.*

DIMOSTRAZIONE. Siano A e B gli insiemi in questione. Dato che entrambi sono in corrispondenza biunivoca con \mathbb{N} , si osserva immediatamente che $A \times B$ è in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Ci basta dunque dimostrare che $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è infinito numerabile. Cominciamo col rappresentare il prodotto cartesiano $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ nel modo usuale, ossia come insieme di coppie disposte nel piano (possiamo pensare gli elementi di $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ come i punti di coordinate entrambe intere non negative nel piano cartesiano):

$$\begin{array}{cccc} \dots & \dots & & \\ (0, 3) & \dots & \dots & \\ (0, 2) & (1, 2) & \dots & \dots \\ (0, 1) & (1, 1) & (2, 1) & \dots \\ (0, 0) & (1, 0) & (2, 0) & (3, 0) \dots \end{array}$$

Ora stabiliamo fra $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ e \mathbb{N} la corrispondenza biunivoca suggerita dalla seguente figura:

$$\begin{array}{cccc} \dots & \dots & & \\ 9 & \dots & \dots & \\ 5 & 8 & \dots & \dots \\ 2 & 4 & 7 & \dots \\ 0 & 1 & 3 & 6 \dots \end{array}$$

Possiamo così costruire una funzione bigettiva:

$$f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

che manda $(0, 0)$ in 0, $(1, 0)$ in 1, $(0, 1)$ in 2, $(2, 0)$ in 3 e così via, “percorrendo” l'insieme $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ per diagonali che vanno dal basso verso l'alto e verso sinistra.

Possiamo anche descrivere f mediante una formula (questo calcolo viene lasciato per esercizio facoltativo):

$$f((m, n)) = \frac{1}{2}(m+n)(m+n+1) + n$$

□

Una conseguenza molto interessante di questo teorema è che anche i numeri razionali sono numerabili:

TEOREMA 4.2 (Cantor, 1874). *I numeri razionali sono equipotenti ai numeri naturali: $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}|$.*

DIMOSTRAZIONE. Per prima cosa scriviamo i numeri razionali come unione disgiunta di tre sottoinsiemi:

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}^{<0} \cup \{0\} \cup \mathbb{Q}^{>0}$$

Se dimostriamo che $\mathbb{Q}^{>0}$ è infinito numerabile allora possiamo concludere che \mathbb{Q} è infinito numerabile in base alla seguente argomentazione. Si osserva per prima cosa che $\mathbb{Q}^{<0}$ è

equipotente a $\mathbb{Q}^{>0}$ (pensiamo per esempio alla funzione bigettiva che manda ogni numero in $\mathbb{Q}^{>0}$ nel suo opposto, che appartiene a $\mathbb{Q}^{<0}$). Poi si nota che $\mathbb{Q}^{\geq 0}$ si può ottenere facendo l'unione di un insieme infinito numerabile ($\mathbb{Q}^{>0}$) con un insieme finito ($\{0\}$), e dunque, per il Teorema 2.3, sappiamo che $\mathbb{Q}^{\geq 0}$ è un insieme infinito numerabile. Infine si conclude che \mathbb{Q} è infinito numerabile esprimendolo come l'unione di due insiemi infiniti numerabili ($\mathbb{Q}^{\geq 0}$ e $\mathbb{Q}^{<0}$) e usando ancora il Teorema 2.3.

Il punto cruciale da dimostrare è dunque che $\mathbb{Q}^{>0}$ è infinito numerabile. Per questo, per prima cosa costruiamo una funzione iniettiva:

$$g : \mathbb{Q}^{>0} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

Definiamola così: preso $r \in \mathbb{Q}^{>0}$ lo scriviamo come

$$r = \frac{a}{b}$$

dove a e b sono numeri interi positivi primi fra loro (questo concetto sarà discusso nel Capitolo 12, ma già sapete, comunque, cosa vuol dire: chiediamo che l'unico intero positivo divisore comune di a e di b sia 1). Visto che c'è un unico modo di esprimere r come frazione di due numeri interi positivi a e b primi fra loro, la funzione che manda $r \in \mathbb{Q}^{>0}$ nella coppia $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è ben definita ed è questa la nostra g .

Si osserva immediatamente che g è iniettiva: se infatti avessimo $g(r) = g(s)$, con $r, s \in \mathbb{Q}$, allora questo significherebbe $g(r) = (a, b) = g(s)$ e dunque per costruzione $r = \frac{a}{b}$ ma anche $s = \frac{a}{b}$, ossia $r = s$.

OSSERVAZIONE 4.3. Certamente g non è surgettiva (la coppia $(6, 4)$, per esempio, non essendo composta da numeri primi fra loro, non può appartenere all'immagine di g) ma questo non è rilevante per la dimostrazione che stiamo facendo.

Ora, l'injectività di g ci garantisce che $\mathbb{Q}^{>0}$ ha la stessa cardinalità di $g(\mathbb{Q}^{>0})$. Ma $g(\mathbb{Q}^{>0})$ è un sottoinsieme infinito di $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ e, per il Teorema 4.1, sappiamo che $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è infinito numerabile. Dunque, per il Teorema 2.2 possiamo concludere che $g(\mathbb{Q}^{>0})$ è infinito numerabile, e allora anche $\mathbb{Q}^{>0}$ è infinito numerabile. \square

5. Un insieme infinito non numerabile: i numeri reali

I numeri reali sono un esempio di insieme infinito non numerabile:

TEOREMA 5.1. (Cantor, 1874) *I numeri reali hanno cardinalità strettamente maggiore di quella dei numeri naturali: $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$.*

DIMOSTRAZIONE. Visto che $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$, vale $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$. Resta allora da dimostrare che non può valere l'uguale, ossia che i due insiemi non sono equipotenti: $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$. Questo, data la definizione di equipotenza, equivale a dimostrare che non può esistere una funzione bigettiva da \mathbb{N} a \mathbb{R} .

Osserviamo che, se mostriamo che non può esistere una funzione surgettiva da \mathbb{N} a \mathbb{R} , in particolare non può esistere una funzione bigettiva, dunque sarà sufficiente mostrare che non può esistere una funzione surgettiva da \mathbb{N} a \mathbb{R} .

Osserviamo ancora che, se mostriamo che non può esistere una funzione surgettiva da \mathbb{N} all'intervallo $[0, \frac{1}{2}] \subseteq \mathbb{R}$ (con $[0, \frac{1}{2}]$ indichiamo l'intervallo con 0 incluso e $\frac{1}{2}$ escluso), allora

non può esistere neppure una funzione surgettiva da \mathbb{N} a \mathbb{R} (infatti se esistesse una funzione surgettiva da \mathbb{N} a \mathbb{R} , sarebbe facile modificarla in modo da ottenerne una surgettiva da \mathbb{N} a $[0, \frac{1}{2})$).

Ci siamo dunque ridotti a dimostrare che non può esistere una funzione surgettiva da \mathbb{N} a $[0, \frac{1}{2})$, e lo dimostriamo per assurdo. Supponiamo che $f : \mathbb{N} \rightarrow [0, \frac{1}{2})$ sia surgettiva ed elenchiamo tutti gli elementi dell'immagine $f(\mathbb{N})$, scritti in notazione decimale:

$$\begin{aligned} f(0) &= 0, a_{00}a_{01}a_{02}a_{03}a_{04}a_{05} \dots \\ f(1) &= 0, a_{10}a_{11}a_{12}a_{13}a_{14}a_{15} \dots \\ f(2) &= 0, a_{20}a_{21}a_{22}a_{23}a_{24}a_{25} \dots \\ f(3) &= 0, a_{30}a_{31}a_{32}a_{33}a_{34}a_{35} \dots \\ f(4) &= 0, a_{40}a_{41}a_{42}a_{43}a_{44}a_{45} \dots \\ f(5) &= 0, a_{50}a_{51}a_{52}a_{53}a_{54}a_{55} \dots \\ &\dots \end{aligned}$$

Qui i simboli a_{ij} rappresentano le cifre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dello sviluppo decimale, e utilizziamo la convenzione per cui i nostri numeri sono scritti evitando di usare "code" infinite di 9.

La nostra strategia consiste ora nel costruire un numero "cattivo" $b \in [0, \frac{1}{2})$ che di sicuro non sta nella lista delle immagini della f , e dunque non appartiene a $f(\mathbb{N})$. In tal modo troviamo un assurdo, perché avevamo supposto che f fosse surgettiva.

Il numero b viene costruito tenendo presenti le cifre $a_{00}, a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{44}, a_{55} \dots$ che si trovano, nella figura qui sopra, sulla diagonale che parte da a_{00} e va verso destra e in basso (questo viene chiamato "il secondo procedimento diagonale di Cantor").

Precisamente, se indichiamo con

$$b = 0, b_0b_1b_2b_3b_4b_5 \dots$$

la scrittura decimale di b , noi scegliamo di porre, per ogni $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$:

$$\begin{aligned} b_i &= 0 \quad \text{se } a_{ii} \neq 0 \\ b_i &= 1 \quad \text{se } a_{ii} = 0 \end{aligned}$$

Possiamo subito osservare che il numero b non può essere uno dei numeri della lista delle immagini della f : preso infatti un qualunque numero della lista, diciamo $f(m)$ con $m \in \mathbb{N}$, b differisce da esso almeno per una cifra decimale, essendo per costruzione $b_m \neq a_{mm}$. \square

6. Alla ricerca di altri infiniti..

Per mostrare che esistono anche cardinalità maggiori di quella del continuo, ossia di quella di \mathbb{R} , abbiamo enunciato a lezione il seguente teorema di cui in queste note diamo la dimostrazione (facoltativa, molto consigliata!).

TEOREMA 6.1. *Per ogni insieme, finito o infinito, X , vale che*

$$|X| < |\mathcal{P}(X)|$$

OSSERVAZIONE 6.2. Ricordiamo che $\mathcal{P}(X)$ indica l'insieme delle parti di X . In particolare per \mathbb{R} vale $|\mathbb{R}| < |\mathcal{P}(\mathbb{R})|$.

DIMOSTRAZIONE. Il caso dell'insieme vuoto è banale: $|\emptyset| = 0 < |\mathcal{P}(\emptyset)| = |\{\emptyset\}| = 1$.

Sia dunque X non vuoto. Bisogna innanzitutto costruire una funzione iniettiva da X a $\mathcal{P}(X)$, in modo da poter dire che $|X| \leq |\mathcal{P}(X)|$. Poi concluderemo dimostrando che non può esistere una funzione surgettiva - dunque in particolare bigettiva - da X a $\mathcal{P}(X)$.

Una funzione iniettiva da X a $\mathcal{P}(X)$ è per esempio quella che manda ogni $x \in X$ in $\{x\} \in \mathcal{P}(X)$ ossia ogni elemento x nel suo "singoletto".

Supponiamo ora di avere una funzione $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$. Qualunque sia f , esibiremo un elemento di $\mathcal{P}(X)$, ossia un sottoinsieme di X , che non è nell'immagine di f . Dunque f non è surgettiva e, vista la arbitrarietà nella scelta di f , questo vuol dire che non possono esistere funzioni surgettive da X a $\mathcal{P}(X)$, in particolare neppure funzioni bigettive.

Ecco il sottoinsieme "cattivo":

$$A = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}$$

Leggiamo bene chi è A ; A è il sottoinsieme di X i cui elementi sono tutti quegli $x \in X$ che hanno la seguente proprietà: $x \notin f(x)$ (ricordiamo che $f(x)$ è un elemento di $\mathcal{P}(X)$ e dunque è a sua volta un sottoinsieme di X , per cui ha senso chiedersi se $x \in f(x)$ o $x \notin f(x)$).

Supponiamo che $A \in \text{Imm } f$, ossia che esista $a \in X$ tale che $f(a) = A$ e mostriamo che questo conduce ad un assurdo. Basta considerare a (ricordiamo che appartiene a X) e A (ricordiamo che è un sottoinsieme di X), chiedersi se $a \in A$ o $a \notin A$ e scoprire che nessuno dei due casi può accadere.

Infatti se $a \in A$ allora, vista la definizione di A , a è uno di quegli elementi x tali che $x \notin f(x)$. Ossia per a accade che $a \notin f(a)$. Ma $f(a) = A$ e dunque accade che $a \notin A$. Assurdo!

Se invece $a \notin A$ allora, vista la definizione di A , a non è uno di quegli elementi x tali che $x \notin f(x)$. Ossia per a accade che $a \in f(a)$ cioè $a \in A$. Assurdo! \square

Possiamo dunque costruire una lista di insiemi infiniti con cardinalità strettamente crescenti:

$$|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}| < |\mathcal{P}(\mathbb{R})| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))| < \dots$$

A questo punto sorgono alcune domande: cosa si può dire di $|\mathcal{P}(\mathbb{N})|$: lo possiamo aggiungere come un nuovo elemento della lista? Questi nella lista sono tutti gli infiniti possibili?

La risposta alla prima domanda è che $|\mathcal{P}(\mathbb{N})|$ appare già nella lista: vale infatti $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$ (per una dimostrazione, vedere gli Esercizi 7.2, 7.3 e 7.4 alla fine del capitolo).

Osserviamo che, siccome per il teorema precedente $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$, avremmo anche potuto seguire questa strada "più generale" per dimostrare che la cardinalità del continuo è strettamente maggiore del numerabile.

Torniamo ora alla nostra lista di insiemi infiniti, che sono tutti costruiti a partire da \mathbb{N} ripetendo l'operazione di prendere l'insieme delle parti:

$$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}| < |\mathcal{P}(\mathbb{R})| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))| < \dots$$

Resta la nostra seconda domanda: questi sono tutti i possibili insiemi infiniti? Formuliamo anche una domanda che si pone un obiettivo più modesto: ci sono insiemi infiniti di cardinalità strettamente compresa fra $|\mathbb{N}|$ e $|\mathbb{R}|$?

Queste due domande sono in realtà molto famose e sono note come:

Ipotesi del continuo: ogni X sottoinsieme di \mathbb{R} che sia infinito non numerabile ha la stessa cardinalità di \mathbb{R} .

Ipotesi generalizzata del continuo: se X è un insieme infinito, la sua cardinalità è una di quelle che appaiono nella lista.

La questione diventa sottile, ed è stata analizzata nei lavori di P. Cohen (1963). Per informazioni potete consultare [] e [].

Terminiamo soffermandoci ancora sull'esempio dei numeri reali. Sappiamo che

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$$

e che

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}| < |\mathbb{R}|$$

Introduciamo ora un nuovo sottoinsieme di \mathbb{R} che contiene \mathbb{Q} .

DEFINIZIONE 6.3. Un numero reale si dice algebrico se è radice di un polinomio

$$x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

dove i coefficienti a_i sono numeri razionali. Se un numero reale non è algebrico allora si dice trascendente.

In altre parole, preso un numero reale a , se si trova un polinomio a coefficienti razionali di cui a è radice, allora a è algebrico. Se un tale polinomio non esiste allora a è trascendente. Notiamo che il fatto che il polinomio della definizione sia monico, ossia inizi con x^n , non è importante. Quello che è importante è che sia a coefficienti razionali (perché non è così importante che sia monico?).

Vale che tutti i numeri razionali sono algebrici, ossia $\mathbb{Q} \subseteq \mathcal{A}$ dove \mathcal{A} è l'insieme dei numeri reali algebrici. Se infatti ho un numero razionale $\frac{m}{n}$ ($n \neq 0$), tale numero è radice del polinomio a coefficienti razionali $x - \frac{m}{n}$ (o di $nx - m$... a riguardo della domanda fatta poche righe fa...).

Ma è algebrico anche il numero $\sqrt{2}$ che noi sappiamo non essere razionale. Infatti $\sqrt{2}$ soddisfa il polinomio a coefficienti razionali (addirittura interi) $x^2 - 2$. Dunque $\mathbb{Q} \subsetneq \mathcal{A}$.

Ma non sarà mica che $\mathcal{A} = \mathbb{R}$, ossia che tutti i numeri reali sono algebrici? La risposta è no. Nel XIX secolo furono trovati da vari matematici (Liouville, Hermite, Lindemann...) dei numeri che non sono algebrici: tali numeri si chiamano trascendenti.

Per esempio Hermite dimostrò nel 1873 che e , la base dei logaritmi naturali, è trascendente, e Lindemann nel 1882 dimostrò che π è trascendente.

Il problema di trovare numeri trascendenti è molto complicato.

Questa complicazione ci può sorprendere: possiamo infatti dimostrare che i numeri trascendenti sono "di più" dei numeri algebrici (e dunque dei numeri razionali). Come fare?

Tutto comincia con la seguente osservazione:

ESERCIZIO 6.4. Dimostrare che \mathcal{A} è infinito numerabile.

SOLUZIONE: [Traccia] I polinomi a coefficienti razionali si possono individuare in base al loro grado, che è un numero naturale, e in base ai loro coefficienti, che sono numeri razionali (insomma appartengono ad un insieme numerabile). Dunque i polinomi a coefficienti razionali sono numerabili. D'altra parte, le radici di un polinomio sono finite. \square

Ora scriviamo $\mathbb{R} = \mathcal{A} \cup \mathcal{T}$, dove \mathcal{T} è l'insieme dei numeri trascendenti: a questo punto, anche se non conosciamo nemmeno un numero trascendente, potremmo comunque affermare che \mathcal{T} non è vuoto, visto che altrimenti avremmo $\mathbb{R} = \mathcal{A}$ e \mathbb{R} sarebbe numerabile. Inoltre \mathcal{T} non può essere né finito né infinito numerabile (altrimenti \mathbb{R} sarebbe unione di due insiemi dei quali uno è infinito numerabile e l'altro è o finito o infinito numerabile e noi sappiamo che questo implicherebbe che \mathbb{R} è numerabile!).

Dunque \mathcal{T} è infinito e non numerabile; insomma $|\mathbb{N}| < |\mathcal{T}|$, che si può scrivere anche $|\mathcal{A}| < |\mathcal{T}|$. In questo senso i numeri trascendenti sono "di più" dei numeri algebrici!

Utilizzando infine il risultato dell'esercizio 7.2 possiamo precisare ulteriormente questa osservazione e dimostrare che \mathcal{T} è equipotente a \mathbb{R} .

7. Esercizi

Il seguente esercizio mostra che il concetto di "dimensione" e quello di cardinalità sono di natura diversa: infatti, per esempio, la retta \mathbb{R} , il piano \mathbb{R}^2 e lo spazio a tre dimensioni \mathbb{R}^3 sono tutti equipotenti...

ESERCIZIO 7.1. Dimostrare che \mathbb{R} è equipotente a \mathbb{R}^2 . Dimostrare che, per ogni n intero positivo, \mathbb{R} è equipotente a \mathbb{R}^n .

ESERCIZIO 7.2. Dimostrare che se un insieme infinito X è equipotente ad un insieme Y , e se Z è un insieme finito o numerabile, allora anche $X \cup Z$ è equipotente a Y .

SOLUZIONE: [Traccia per la risoluzione] Se X è infinito numerabile lo sappiamo già. Cerchiamo di scrivere una dimostrazione che funzioni per X infinito anche non numerabile. Sia $f : X \rightarrow Y$ la corrispondenza biunivoca fra X e Y . Estraiamo da X un insieme infinito numerabile N : allora $f(N)$ è un sottoinsieme infinito numerabile di Y e $X - N$ è equipotente a $Y - f(N)$. Per dimostrare dunque che $X \cup Z$ è equipotente a Y resta da verificare che l'insieme $N \cup (Z - X)$, ossia l'insieme degli elementi che bisogna aggiungere a $X - N$ per ottenere $X \cup Z$, è equipotente a $f(N)$. Ma $N \cup (Z - X)$ è unione di un insieme infinito numerabile (l'insieme N) con un insieme finito o infinito numerabile (l'insieme $Z - X$ infatti è sottoinsieme di Z che è finito o infinito numerabile), dunque è infinito numerabile. Anche $f(N)$ è infinito numerabile.. \square

ESERCIZIO 7.3. Dimostrare che la cardinalità di un insieme infinito non cambia se lo uniamo a un insieme finito o numerabile. Dimostrare che la cardinalità di un insieme infinito non cambia se gli sottraiamo un insieme finito. Cosa può accadere quando sottraiamo un insieme numerabile da un insieme numerabile?

ESERCIZIO 7.4. Dimostrare che l'insieme delle parti di \mathbb{N} ha la cardinalità del continuo:

$$|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$$

SOLUZIONE: [Traccia per la risoluzione] Per prima cosa si osserva che $|\mathbb{R}| = |(0, 1)|$: una funzione bigettiva fra questi due insiemi è, per esempio, $g : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, con $g(x) = \tan[\pi(x - \frac{1}{2})]$, la cui inversa $g^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ è data da $g^{-1}(x) = (\frac{1}{\pi} \arctan x) + \frac{1}{2}$.

Dobbiamo dunque dimostrare che $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |(0, 1)|$. Per l'esercizio precedente sappiamo che $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathcal{P}(\mathbb{N}) - \{\mathbb{N}\}|$ (la cardinalità non cambia se togliamo un elemento), dunque possiamo ridurci a dimostrare che $|\mathcal{P}(\mathbb{N}) - \{\mathbb{N}\}| = |(0, 1)|$.

Scriviamo i numeri reali in $(0, 1)$ in base binaria. Avremo dunque delle espressioni di questo tipo:

$$0,0011010111001110000010\dots$$

Per essere sicuri di rappresentare in modo unico ogni elemento di $(0, 1)$ ci mettiamo d'accordo di non accettare code infinite di 1.

Ora costruiamo una mappa $h : \mathcal{P}(\mathbb{N}) - \{\mathbb{N}\} \rightarrow (0, 1)$ che risulterà essere bigettiva. L'idea di base sarebbe questa: dato un sottoinsieme $A \subsetneq \mathbb{N}$, vorremmo porre

$$h(A) = 0, a_0 a_1 a_2 \dots$$

dove $a_i = 0$ se $i \notin A$ e $a_i = 1$ se $i \in A$. Siamo vicini ad una buona definizione, ma bisogna aggiustare qualcosa. Infatti se A contenesse tutti i numeri da un certo numero fissato M in poi, ossia se $\mathbb{N} - A$ fosse finito, allora $h(A)$ risulterebbe un numero scritto con una coda infinita di 1. Dovremmo riscriverlo nella forma da noi accettata, ossia trasformando tutti gli 1 della coda in 0 e facendo diventare 1 l'ultimo 0 che appariva nella vecchia scrittura di $h(A)$. Esisterebbe allora un insieme finito $B \subseteq \mathbb{N}$ tale che $h(A) = h(B)$, insomma h non sarebbe iniettiva. Come si può rimediare? Bisogna trattare separatamente gli insiemi $A \subsetneq \mathbb{N}$ che sono finiti, quelli che sono infiniti ma hanno complementare finito e quelli che sono infiniti e hanno complementare infinito..... \square

Altre strategie per contare

1. Il principio di Inclusione-Esclusione

Dati due insiemi finiti A e B , come possiamo contare quanti elementi ha la loro unione $A \cup B$?

Questa semplice domanda è il primo passo per avvicinarci ad una interessante strategia del contare, il principio di inclusione-esclusione.

Non è difficile trovare una risposta; per trovare la cardinalità di $A \cup B$ contiamo quanti sono gli elementi di A , di B e di $A \cap B$ e poi osserviamo che:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Per verificare questa formula, mettiamoci “nei panni” di un elemento $x \in A \cup B$; tale elemento viene contato quando calcoliamo $|A \cup B|$ e dà il suo contributo di $+1$. Controlliamo se dà contributi agli addendi $|A|$, $|B|$, $|A \cap B|$, e qual è il suo contributo complessivo all’espressione che compare a destra.

Se x appartiene ad uno solo dei due insiemi A , B , (diciamo, per fissare le idee, che appartenga ad A ma non a B), x viene contato una volta nell’addendo $|A|$, poi non dà contributo né all’addendo $|B|$ né all’addendo $|A \cap B|$, dunque nel membro di destra viene contato, come volevamo, una volta sola.

Se invece x appartiene ad entrambi gli insiemi A e B , allora x viene contato una volta nell’addendo $|A|$, poi un’altra volta nell’addendo $|B|$ e infine, però con il segno meno, nell’addendo $-|A \cap B|$; in conclusione, come volevamo, il contributo di x al membro di sinistra è uguale a $2 - 1 = 1$.

ESERCIZIO 1.1. Quanti sono gli interi tra 1 e 1000 divisibili per 7 o per 11?

SOLUZIONE: Ce ne sono $\lfloor 1000/7 \rfloor = 142$ divisibili per 7, $\lfloor 1000/11 \rfloor = 90$ divisibili per 11, e $\lfloor 1000/7 \cdot 11 \rfloor = 12$ divisibili sia per 7 che per 11. Quindi in totale: $142 + 90 - 12 = 220$. \square

ESERCIZIO 1.2. Quante sono le stringhe binarie di lunghezza 8 che iniziano per 0 o finiscono per 11?

SOLUZIONE: Quelle che cominciano per 0 sono 2^7 , quelle che finiscono per 11 sono 2^6 , quelle che soddisfano entrambe queste richieste sono 2^5 . Dunque la risposta è: $2^7 + 2^6 - 2^5 = 128 + 64 - 32 = 160$. \square

Risolto il primo problema che ci eravamo posti, il nostro prossimo passo consiste nel “rilanciare” e passare al caso di tre insiemi, ossia nel chiedersi, dati tre insiemi finiti A , B , C , come possiamo calcolare $|A \cup B \cup C|$ (vedi Figura 1).

Anche in questo caso possiamo seguire la strategia di calcolare $|A|$, $|B|$, $|C|$, $|A \cap B|$, $|A \cap C|$, $|B \cap C|$, $|A \cap B \cap C|$, e poi individuare la formula:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$




FIGURA 1. Il principio di Inclusione-Esclusione nel caso di tre insiemi. I simboli + e - suggeriscono con quale segno vanno contati gli elementi

La dimostrazione della correttezza di questa formula può essere fatta con la stessa tecnica adottata nel caso dell'unione di due insiemi; consideriamo un elemento $x \in A \cup B \cup C$, e distinguiamo i casi: appartiene ad uno solo dei tre insiemi, a due soli di essi o a tutti e tre? In corrispondenza di ciascuno di tali casi, controlliamo se x viene contato, nel membro di destra, nel modo giusto, ossia se complessivamente dà contributo +1.

Per esempio, supponiamo che x appartenga solo a due insiemi, diciamo A e B . Allora x viene contato in $|A|$ (col contributo +1), in $|B|$ (col contributo +1), e in $-|A \cap B|$ (col contributo -1). Visto che un tale x non contribuisce a nessun altro addendo, complessivamente dà contributo +1, come volevamo.

E se x appartiene a tutti e tre gli insiemi? Allora viene contato in $|A|$, in $|B|$, in $|C|$ (per ora siamo al contributo $1 + 1 + 1$), poi viene contato in $-|A \cap B|$, $-|A \cap C|$, $-|B \cap C|$ (con contributo $-1 - 1 - 1$) e infine in $|A \cap B \cap C|$ (contributo +1). Complessivamente il contributo è $3 - 3 + 1 = 1$, anche stavolta in accordo con le nostre attese.

Se completiamo questo ragionamento con la verifica di cosa succede se x appartiene ad uno solo dei tre insiemi (immediata, e lasciata a voi), abbiamo dunque dimostrato la formula:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Ci rendiamo conto, a questo punto, di essere pronti a intuire una formula più generale, valida per contare la cardinalità dell'unione di n insiemi A_1, A_2, \dots, A_n .

La strategia sarà quella di sommare le cardinalità degli insiemi stessi, di sottrarre le cardinalità di tutte le possibili intersezioni a due a due di tali insiemi, di sommare di nuovo le cardinalità di tutte le possibili intersezioni triple, di sottrarre le cardinalità di tutte le possibili intersezioni quaduple...e così via.

Questa è l'idea del principio di Inclusione-Esclusione...ma come scriverla in maniera soddisfacente?

Avvertiamo il bisogno di introdurre una notazione nuova, che ci permetta di indicare, in maniera compatta, tutte le possibili intersezioni multiple di n insiemi. Eccola, insieme all'enunciato generale del principio di inclusione-esclusione:

TEOREMA 1.3 (Principio di Inclusione-Esclusione). *Consideriamo un intero $n \geq 1$ e siano A_1, A_2, \dots, A_n insiemi finiti. Dato un sottoinsieme $I = \{i_1, i_2, \dots, i_r\}$ di \mathbb{N}_n poniamo*

$$A_I = \bigcap_{i \in I} A_i = A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_r}$$

Allora

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \mathbb{N}_n} (-1)^{|I|-1} |A_I|$$

(si noti che l'indice I nella formula varia fra tutti i sottoinsiemi di \mathbb{N}_n escluso l'insieme vuoto)

DIMOSTRAZIONE. La nostra strategia sarà quella di dimostrare che il membro di sinistra e quello di destra forniscono lo stesso numero, ossia la cardinalità di $\bigcup_{i=1}^n A_i$.

Mostreremo cioè che ogni elemento $x \in \bigcup_{i=1}^n A_i$ è contato esattamente una volta nel membro di sinistra e in quello di destra della formula. Visto che questo è ovvio per il membro di sinistra, studiamo il membro di destra.

Preso dunque un $x \in \bigcup_{i=1}^n A_i$, questo apparterrà ad alcuni degli A_i , diciamo che appartenga esattamente a r di essi: $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_r}$.

Allora x nel membro di destra viene contato esattamente con questo coefficiente:

$$r - \binom{r}{2} + \binom{r}{3} - \binom{r}{4} + \dots + (-1)^{r-1} \binom{r}{r}$$

Infatti nel membro di destra vengono conteggiati col segno “+” gli elementi di tutti gli r insiemi $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_r}$, col segno “-” gli elementi di tutte le loro $\binom{r}{2}$ intersezioni a due

a due, col segno più gli elementi di tutte le loro $\binom{r}{3}$ intersezioni a 3 a 3 e così via...

Ma per il Teorema del binomio di Newton noi sappiamo che

$$0 = (1 - 1)^r = \binom{r}{0} - \binom{r}{1} + \binom{r}{2} - \binom{r}{3} + \dots + (-1)^r \binom{r}{r}$$

da cui, visto che $\binom{r}{0} = 1$ e $\binom{r}{1} = r$,

$$1 = r - \binom{r}{2} + \binom{r}{3} - \binom{r}{4} + \dots + (-1)^{r-1} \binom{r}{r}$$

Questo permette di concludere che (indipendentemente da quale sia r) il coefficiente con cui viene contato x nel membro di destra è 1, come volevamo. \square

2. Applicazioni del principio di Inclusione-Esclusione

Come prima applicazione del principio di Inclusione-Esclusione occupiamoci di funzioni surgettive. Dati due insiemi finiti non vuoti X e Y , chiamiamo $Surj(X \rightarrow Y)$ l'insieme di

tutte le funzioni surgettive che hanno X come dominio e Y come codominio:

$$Surj(X \rightarrow Y) = \{f \mid f : X \rightarrow Y \text{ è una funzione surgettiva}\}$$

Il principio di Inclusione-Esclusione ci permetterà di rispondere alla domanda (in generale non semplice): qual è la cardinalità di $Surj(X \rightarrow Y)$?

La complessità di questo problema cresce enormemente al crescere della cardinalità di Y . Mentre nei casi $|Y| = 1$ e $|Y| = 2$ possiamo facilmente rispondere, nei casi con $|Y| \geq 3$ l'uso del principio di Inclusione-Esclusione sarà fondamentale per permetterci di "organizzare" il conto.

Cominciamo ad occuparci del caso $|Y| = 1$. Qui c'è una sola funzione da X a Y , quella che manda ogni elemento di X nell'unico elemento di Y , e tale funzione è surgettiva, dunque la cardinalità che cerchiamo è uguale a 1.

Passiamo allora al caso in cui $|Y| = 2$ e poniamo $Y = \{y_1, y_2\}$. Innanzitutto osserviamo che, perché esistano funzioni surgettive da X a Y bisogna che $|X| \geq 2$. Poi notiamo che una funzione surgettiva è individuata univocamente una volta che sappiamo quali sono gli elementi di X che hanno come immagine y_1 (infatti deduciamo subito da questo che gli altri elementi di X avranno come immagine y_2).

Dunque una funzione surgettiva è univocamente individuata da un sottoinsieme di X (quello, appunto, dato dalle controimmagini di y_1), che non deve essere vuoto (deve effettivamente esistere qualche elemento che ha come immagine y_1) e neppure tutto X (altrimenti nessun elemento avrebbe come immagine y_2).

Quanti sono tali sottoinsiemi? Sappiamo rispondere: sono $2^n - 2$. Anche in questo caso abbiamo saputo contare le funzioni surgettive. Ritroviamo questi nostri primi calcoli come casi particolari del seguente enunciato generale:

TEOREMA 2.1. *Siano X e Y finiti non vuoti con $|X| = n \geq 1$ e $|Y| = m \geq 1$. Vale:*

$$|Surj(X \rightarrow Y)| = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} (-1)^j (m-j)^n$$

OSSERVAZIONE 2.2. Come potete verificare, quando $|Y| = 1$ o $|Y| = 2$, la formula precedente conferma i risultati 1 e $2^n - 2$ che abbiamo ottenuto sopra.

OSSERVAZIONE 2.3. In particolare se $n < m$ come sappiamo $|Surj(X \rightarrow Y)| = 0$ dunque la formula sopra ci dice:

$$0 = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} (-1)^j (m-j)^n$$

Un modo ben complicato per scrivere 0..... (!!)

DIMOSTRAZIONE. Sia $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. Per ogni $i = 1, 2, \dots, m$ chiamiamo A_i l'insieme delle funzioni da X a Y la cui immagine non contiene y_i :

$$A_i = \{g \mid g : X \rightarrow Y \wedge y_i \notin \text{Im } g\}$$

Allora l'insieme delle funzioni non surgettive coincide con $\bigcup_{i=1}^m A_i$; se riusciamo a calcolare la cardinalità di questo insieme possiamo facilmente ricavare quella di $Surj(X \rightarrow Y)$

“per complementare”, visto che conosciamo anche la cardinalità (uguale a m^n) dell'insieme $F(X \rightarrow Y)$ di tutte le funzioni da X a Y . Infatti

$$Surj(X \rightarrow Y) = F(X \rightarrow Y) - \bigcup_{i=1}^m A_i$$

e dunque

$$|Surj(X \rightarrow Y)| = m^n - \left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right|$$

Ora, per calcolare $\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right|$ possiamo usare il principio di Inclusione-Esclusione. Per prima cosa osserviamo che, se $I = \{i_1, i_2, \dots, i_j\} \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ allora

$$|A_I| = |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}| = (m - j)^n$$

Infatti $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}$ è l'insieme delle funzioni da X a Y che non contengono nella loro immagine né y_{i_1} né y_{i_2} ... né y_{i_j} e tale insieme è in corrispondenza biunivoca con l'insieme $F(X \rightarrow (Y - \{y_{i_1}, \dots, y_{i_j}\}))$. Per il principio di Inclusione-Esclusione:

$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \mathbb{N}_m} (-1)^{|I|-1} |A_I| = \sum_{j=1}^m \sum_{\substack{I \subseteq \mathbb{N}_m \\ |I|=j}} (-1)^{j-1} (m - j)^n$$

dove l'ultima espressione è stata ottenuta spezzando la sommatoria: abbiamo raggruppato tutti gli $I \subseteq \mathbb{N}_m$ che hanno la stessa cardinalità j e poi sommato su $j = 1, 2, \dots, m$. Ora, gli $I \subseteq \mathbb{N}_m$ che hanno cardinalità j sono $\binom{m}{j}$, dunque possiamo scrivere:

$$= \sum_{j=1}^m \binom{m}{j} (-1)^{j-1} (m - j)^n$$

In conclusione

$$|Surj(X \rightarrow Y)| = m^n - \sum_{j=1}^m \binom{m}{j} (-1)^{j-1} (m - j)^n$$

Questa formula può essere espressa in maniera più compatta. Infatti:

$$m^n - \sum_{j=1}^m \binom{m}{j} (-1)^{j-1} (m - j)^n = m^n + \sum_{j=1}^m \binom{m}{j} (-1)^j (m - j)^n$$

e, visto che $\binom{m}{0} = 1$, possiamo modificare la sommatoria in modo che includa anche il primo addendo m^n :

$$|Surj(X \rightarrow Y)| = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} (-1)^j (m - j)^n$$

□

3. Una prima presentazione del gruppo simmetrico S_n

Consideriamo un insieme X di cardinalità $n \geq 1$. In questo paragrafo studieremo l'insieme $Bij(X \rightarrow X)$ delle funzioni bigettive da X in sé stesso. Come abbiamo osservato nel Paragrafo 3 di questo capitolo, vale che

$$|Bij(X \rightarrow X)| = n!$$

Ora osserviamo che se abbiamo due funzioni $f, g \in Bij(X \rightarrow X)$ allora le funzioni composte $f \circ g$ e $g \circ f$ sono ancora bigettive, dunque appartengono ancora a $Bij(X \rightarrow X)$ (in generale, come già sappiamo e come vedremo di nuovo fra poco in un esempio, non è affatto detto che $f \circ g = g \circ f$).

Questo ci permette di vedere $Bij(X \rightarrow X)$ non solo come un insieme, ma come un insieme munito di una OPERAZIONE, appunto la composizione fra funzioni. Questa operazione ha le seguenti caratteristiche:

- per ogni $f, g, h \in Bij(X \rightarrow X)$ vale $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ (proprietà associativa);
- esiste un elemento neutro per \circ , ossia una funzione $e : X \rightarrow X$ tale che, per ogni $f \in Bij(X \rightarrow X)$ vale $f \circ e = e \circ f = f$ (più precisamente l'elemento neutro e è la funzione Id_X che manda ogni elemento di X in sé stesso).
- per ogni $f \in Bij(X \rightarrow X)$ esiste l'inversa rispetto a \circ , ossia una funzione $g \in Bij(X \rightarrow X)$ tale che $f \circ g = g \circ f = Id_X$.

In generale, un insieme munito di una operazione che soddisfa queste proprietà si chiama **gruppo** (rimandiamo al Capitolo 16 per ulteriori approfondimenti sul concetto di gruppo). Dunque $Bij(X \rightarrow X)$ è un gruppo. Si nota subito che tutto quello che abbiamo detto fin qui non dipende dal particolare insieme X di cardinalità n che abbiamo scelto; decidiamo allora, per fissare le idee e le notazioni, di scegliere $X = \mathbb{N}_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$.

Definizione. L'insieme $Bij(\mathbb{N}_n \rightarrow \mathbb{N}_n)$, con l'operazione di composizione fra funzioni, si chiama **gruppo simmetrico su n elementi** e si indica con S_n . Si dice anche che S_n è il gruppo di tutte le **permutazioni** dei numeri $1, 2, \dots, n$.

Come si può rappresentare un elemento di S_n , ossia una funzione in $Bij(\mathbb{N}_n \rightarrow \mathbb{N}_n)$? Un modo potrebbe essere questo; poniamo per esempio $n = 10$, allora col simbolo

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 4 & 6 & 7 & 8 & 2 & 1 & 10 & 9 & 5 \end{pmatrix}$$

intendiamo indicare l'elemento $f \in S_n$ che manda ogni numero in quello che sta sotto di lui: per esempio 1 in 3, 2 in 4, 3 in 6, 4 in 7, 5 in 8, 6 in 2..e così via. Un altro modo di rappresentare la stessa funzione è quello "in cicli":

$$f = (1, 3, 6, 2, 4, 7)(5, 8, 10)(9)$$

Questa scrittura va letta così: il primo ciclo ci dice che la f manda 1 in 3 e 3 in 6 e 6 in 2 e 2 in 4 e 4 in 7 e 7 in 1, ossia ogni elemento viene mandato in quello che lo segue tranne l'ultimo, che viene rimandato nel primo (ecco perché si chiamano "cicli"). Il secondo ciclo dice che 5 viene mandato in 8, 8 in 10 e 10 in 5. L'ultimo ciclo dice che 9 viene mandato in sé stesso, ossia viene lasciato fisso dalla f .

Di solito quando un elemento viene lasciato fisso non lo indichiamo, dunque la stessa f di prima la possiamo anche scrivere (quando è chiaro a quale gruppo S_n si riferisce, in questo caso si tratta di S_{10}):

$$f = (1, 3, 6, 2, 4, 7)(5, 8, 10)$$

E per moltiplicare due elementi di S_n espressi in cicli come facciamo? Per esempio, se $g \in S_n$ è l'elemento:

$$g = (1, 3)(2, 9)$$

quale è la decomposizione in cicli del prodotto $g \circ f$? Scriviamo

$$g \circ f = (1, 3)(2, 9)(1, 3, 6, 2, 4, 7)(5, 8, 10)$$

mettendo accanto le due espressioni. Fare la composizione fra le funzioni significa seguire il "cammino" di un numero, applicandogli i cicli da destra a sinistra. Per esempio il ciclo più a destra manda il 5 in 8, il secondo ciclo lascia l'8 fisso, il terzo e il quarto anche. Dunque $g \circ f$ manda il 5 in 8. Seguiamo adesso l'8. Il ciclo più a destra lo manda in 10, il secondo ciclo lascia fisso il 10, e così anche il terzo e il quarto. Dunque per ora abbiamo trovato:

$$g \circ f = (5, 8, 10, \dots$$

Continuiamo: il 10 viene mandato in 5 dal ciclo più a destra, e il 5 viene poi lasciato fisso. Dunque abbiamo chiuso il primo ciclo:

$$g \circ f = (5, 8, 10), \dots$$

Studiamo adesso l'immagine di un altro numero, per esempio il 2 (possiamo partire da un qualunque diverso da 5,8,10). Otteniamo

$$g \circ f = (5, 8, 10)(2, 4, \dots$$

Poi seguiamo il 4

$$g \circ f = (5, 8, 10)(2, 4, 7, \dots$$

Poi il 7, che viene lasciato fisso dal ciclo più a destra, e viene mandato in 1 dal secondo ciclo. Il terzo ciclo lascia fisso l'1 e il quarto manda 1 in 3. Dunque

$$g \circ f = (5, 8, 10)(2, 4, 7, 3, \dots$$

Continuando così arriviamo a

$$g \circ f = (5, 8, 10)(2, 4, 7, 3, 6, 9)(1) = (5, 8, 10)(2, 4, 7, 3, 6, 9)$$

che è la decomposizione in cicli disgiunti (ossia cicli tali che un numero compare al più in un solo ciclo) che cercavamo.

Facendo i prodotti in questo modo è facile vedere che, per ogni $n \geq 3$, S_n non è un gruppo commutativo; basta prendere $f = (1, 2)$ $g = (1, 3)$ e calcolare

$$g \circ f = (1, 3)(1, 2) = (1, 2, 3)$$

$$f \circ g = (1, 2)(1, 3) = (1, 3, 2)$$

e osservare che $(1, 2, 3)$ è diversa da $(1, 3, 2)$. Notiamo invece che se avessimo due cicli che coinvolgono numeri diversi (insomma se un numero compare in uno dei due cicli non compare nell'altro) tali cicli commuterebbero fra di loro.

Proviamo a contare la cardinalità di alcuni sottoinsiemi del gruppo simmetrico.

ESEMPIO 3.1. In S_{20} quanti sono gli elementi la cui decomposizione in cicli è costituita da 3 cicli di lunghezza 4 e da un ciclo di lunghezza 5? Insomma gli elementi la cui decomposizione ha questa struttura: $(, , ,)(, , ,)(, , , ,)$?

Innanzitutto scegliamo i 4 numeri che vanno nel “primo” ciclo di lunghezza 4: abbiamo $\binom{20}{4}$ scelte. Una volta scelti, come si possono disporre questi 4 numeri? Si possono disporre in $4!$ modi diversi, però notiamo che il ciclo (a, b, c, d) rappresenta lo stesso elemento del ciclo (b, c, d, a) e dei cicli (c, d, a, b) , (d, a, b, c) . Insomma possiamo far “muovere” i numeri circolarmente in un ciclo senza cambiare l’elemento del gruppo che viene rappresentato. Dunque i 4 numeri si possono disporre dentro il ciclo di lunghezza 4 in modo da creare $\frac{4!}{4} = 6$ elementi diversi di S_{20} . Poi con $\binom{16}{4}$ scelte scegliamo i numeri che vanno nel secondo ciclo di lunghezza 4, e con $\binom{12}{4}$ scegliamo quelli che vanno nel terzo ciclo. In $\binom{8}{5}$ scelte possiamo decidere quali numeri vanno nel ciclo di lunghezza 5.

Tenendo conto di quanto detto fin qui, potremmo proporre il numero:

$$\binom{20}{4} \frac{4!}{4} \binom{16}{4} \frac{4!}{4} \binom{12}{4} \frac{4!}{4} \binom{8}{5} \frac{5!}{5}$$

Però questo numero è troppo grande. Abbiamo commesso un errore: quando abbiamo preparato i tre cicli di lunghezza 4, li consideravamo “ordinati” (il “primo”, il “secondo”, il “terzo”). In realtà tali cicli commutano fra loro, perché coinvolgono numeri distinti. Per esempio noi abbiamo contato

$$(1, 2, 3, 4)(5, 6, 7, 8)(9, 10, 11, 12)(13, 14, 15, 16, 17)$$

e

$$(5, 6, 7, 8)(1, 2, 3, 4)(9, 10, 11, 12)(13, 14, 15, 16, 17)$$

come elementi diversi mentre rappresentano lo stesso elemento di S_{20} .

Siccome ci sono $3!$ modi di disporre in ordine i tre cicli di lunghezza quattro, la soluzione giusta del nostro esercizio è:

$$\frac{1}{3!} \binom{20}{4} \frac{4!}{4} \binom{16}{4} \frac{4!}{4} \binom{12}{4} \frac{4!}{4} \binom{8}{5} \frac{5!}{5}$$

4. Permutazioni senza punti fissi

I seguenti esempi ci mostrano ancora il principio di Inclusion-Exclusion “in azione”, applicato al problema della ricerca di permutazioni senza punti fissi:

ESEMPIO 4.1. Dato un numero intero positivo n trovare una formula per contare quante sono le permutazioni in S_n che non hanno punti fissi.

Chiamiamo $NoFix(S_n)$ l’insieme delle permutazioni in S_n che non lasciano fisso nessun numero $1, 2, \dots, n$:

$$NoFix(S_n) = \{\sigma \in S_n \mid s(i) \neq i \quad \forall i = 1, 2, \dots, n\}$$

Dunque l’esercizio ci chiede di calcolare $|NoFix(S_n)|$. Anche stavolta conteremo per prima cosa la cardinalità del complementare $S_n - NoFix(S_n)$, ossia la cardinalità del sottoinsieme di S_n costituito dagli elementi che lasciano fisso almeno un numero in \mathbb{N}_n .

Per ogni $i = 1, 2, \dots, n$ chiamiamo A_i l’insieme degli elementi di S_n che fissano il numero $i \in \mathbb{N}_n$:

$$A_i = \{g \in S_n \mid g(i) = i\}$$

Allora l'insieme degli elementi di S_n che lasciano fisso almeno un numero in \mathbb{N}_n coincide con $\bigcup_{i=1}^n A_i$. Per calcolare $|\bigcup_{i=1}^n A_i|$ possiamo usare il principio di inclusione esclusione.

Cominciamo osservando che se $I = \{i_1, i_2, \dots, i_j\} \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ allora

$$|A_I| = |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}| = (n - j)!$$

Infatti $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}$ è l'insieme degli elementi di S_n tali che fra i loro punti fissi ci sono sicuramente i_1, i_2, \dots, i_j , e un tale elemento di S_n è caratterizzato da come agisce sugli altri $n - j$ numeri: dunque $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}$ è in corrispondenza biunivoca con S_{n-j} . Fra l'altro osserviamo che questo, nel caso in cui $j = n$, è in accordo con la convenzione per cui $0! = 1$; infatti in tal caso $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ consiste di un solo elemento, la permutazione identica Id che lascia fissi tutti i numeri di \mathbb{N}_n . Per il principio di inclusione esclusione:

$$|\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \mathbb{N}_n} (-1)^{|I|-1} |A_I| = \sum_{j=1}^n \sum_{\substack{I \subseteq \mathbb{N}_n \\ |I|=j}} (-1)^{j-1} (n - j)!$$

dove come di consueto abbiamo spezzato la sommatoria in base alla cardinalità degli insiemi I . Ora, gli $I \subseteq \mathbb{N}_n$ che hanno cardinalità j sono $\binom{n}{j}$, dunque abbiamo:

$$= \sum_{j=1}^n \binom{n}{j} (-1)^{j-1} (n - j)!$$

In conclusione

$$|NoFix(S_n)| = |S_n| - |\bigcup_{i=1}^n A_i|$$

diventa

$$|NoFix(S_n)| = n! - \sum_{j=1}^n \binom{n}{j} (-1)^{j-1} (n - j)!$$

che si può esprimere in maniera più compatta come:

$$|NoFix(S_n)| = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (-1)^j (n - j)!$$

Questa è la formula che cercavamo; è interessante provare a riscriverla, tenendo conto che $\binom{n}{j} (n - j)! = \frac{n!}{j!}$:

$$|NoFix(S_n)| = \sum_{j=0}^n (-1)^j \frac{n!}{j!} = n! \left(\sum_{j=0}^n (-1)^j \frac{1}{j!} \right)$$

che possiamo anche esprimere senza il simbolo di sommatoria come

$$|NoFix(S_n)| = n! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

ESEMPIO 4.2. Quante sono in S_{15} le permutazioni che fissano esattamente 8 numeri?

Costruiamo una permutazione $\sigma \in S_{15}$ che fissa esattamente 8 numeri. Abbiamo $\binom{15}{8}$ modi di scegliere in \mathbb{N}_{15} gli 8 numeri che verranno fissati. Dopodiché vogliamo che la permutazione agisca sui 7 numeri restanti senza lasciarne nessuno fisso. Dunque la risposta è

$$\binom{15}{8} |NoFix(S_7)| = \frac{15!}{8! 7!} 7! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right)$$

5. Esercizi

ESERCIZIO 5.1. Generalizzare il risultato dell'esempio 3.1, ossia calcolare quanti sono in S_n gli elementi che hanno la seguente decomposizione ciclica: c_1 cicli di lunghezza l_1 , c_2 cicli di lunghezza l_2, \dots, c_k cicli di lunghezza l_k (dove $c_1 l_1 + c_2 l_2 + \dots + c_k l_k = n$).

ESERCIZIO 5.2. Piero mischia un mazzo di 52 carte e dice: "Scommetto che nessuna carta è rimasta nella posizione in cui era all'inizio (ossia la prima carta non è più la prima, la seconda non è più in seconda posizione, la terza etc.)". Giovanni risponde: "E io invece scommetto che hai torto!". Chi dei due, secondo voi, ha più speranza di vincere? La risposta cambia se il mazzo è da 40 carte?

ESERCIZIO 5.3. Una permutazione che mantiene fissi tutti i numeri salvo due, che vengono scambiati tra loro, si chiama *trasposizione*. Una trasposizione si rappresenta dunque con un 2-ciclo (per esempio, $(1, 3)$).

Verificare che, in S_9 , vale:

$$(1, 3, 4, 7, 9) = (1, 9) \circ (1, 7) \circ (1, 4) \circ (1, 3)$$

Dimostrare che, in generale, ogni elemento di S_n può essere scritto come composizione di trasposizioni.

ESERCIZIO 5.4. Dimostrare che la scrittura di un elemento di S_n come prodotto di trasposizioni non è unica:

- fare un esempio di un elemento che si può scrivere in due modi diversi e le trasposizioni coinvolte nelle due scritture non sono le stesse;
- fare un esempio di un elemento che si può scrivere in due modi diversi e il numero delle trasposizioni coinvolte nelle due scritture non è lo stesso.

Aritmetica: la divisione euclidea e il massimo comun divisore

1. Divisione euclidea

Come possiamo distribuire 150 penne fra 70 studenti? Daremo ad ognuno $\frac{150}{70} = 2,142857$ penne? Oppure il problema lo dobbiamo affrontare dicendo che possiamo dare 2 penne ad ogni studente e poi avanza un resto di 10 penne? Questo secondo modo è il più adatto: visto che le penne non si possono “spezzare”, il problema era relativo ai numeri interi e deve avere risposta in termini di numeri interi. La divisione che abbiamo fatto, con un quoziente intero (70) e un resto intero (10), è un esempio di “divisione euclidea”.

TEOREMA 1.1. (*Teorema della divisione euclidea*). *Dati a, b interi con $b > 0$ esistono (e sono unici) due interi q (quoziente) ed $r = \text{Resto}(a, b)$, con*

$$a = bq + r \tag{1}$$

$$0 \leq r < b \tag{2}$$

OSSERVAZIONE 1.2. Rimarchiamo subito che uno dei punti qualificanti della definizione della divisione euclidea è la richiesta sul resto, ossia che valga $0 \leq r < b$. Per esempio, volendo distribuire 22 penne fra sette studenti, potrei darne 2 per uno e lasciarne avanzare 8:

$$22 = 7 \cdot 2 + 8$$

Oppure potrei darne tre per uno e avere una sola penna come resto:

$$22 = 7 \cdot 3 + 1$$

Solo quest’ultima è la divisione euclidea di 22 per 7. Infatti 1 soddisfa la condizione $0 \leq 1 < 7$ mentre 8 non soddisfa $0 \leq 8 < 7$. Il teorema che abbiamo enunciato, e che stiamo per dimostrare, dice appunto, a riguardo di questo esempio, che fra le scritte

$$22 = 7a + c$$

con a e c numeri interi, ne esiste una e una sola che è la divisione euclidea di 22 per 7.

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA. Notiamo che incrementando il numero q anche bq aumenta (essendo b positivo). Esisterà quindi un valore di q (ed uno solo) tale che $bq \leq a < b(q + 1)$ (basta prendere il minimo q tale che $a < b(q + 1)$). Dividendo per b otteniamo: $q \leq a/b < q + 1$. Quindi:

$$q = \lfloor a/b \rfloor.$$

Una volta trovato q il resto $r = \text{Resto}(a, b)$ è dato da:

$$r = a - bq.$$

Si verifica subito infatti che questo r soddisfa la richiesta $0 \leq r < b$.

Il procedimento che abbiamo seguito dimostra in realtà anche l'unicità. Per una qualunque altra scelta di q , infatti, si osserva facilmente che il resto ottenuto non soddisferebbe la richiesta $0 \leq r < b$. \square

ESEMPIO 1.3. $a = 1781293$, $b = 1481$, $a/b \approx 1202.7637$, $q = 1202 = \lfloor a/b \rfloor$, $r = 1781293 - 1481 \times 1202 = 1131$.

ESEMPIO 1.4. $a = -7856123$, $b = 9812$, $a/b \approx -800.66840$, $q = -801 = \lfloor a/b \rfloor$, $r = -7856123 - 9812 \cdot (-901) = 3289$.

ESEMPIO 1.5. Oggi è lunedì. Che giorno della settimana sarà tra 30 giorni? Soluzione: $30 = 7 \cdot 4 + 2$. Quindi: mercoledì.

ESEMPIO 1.6. Che ore erano 101 ore fa? Soluzione:

$$\begin{aligned} -101 &= 24 \cdot (-4) + (-5) \\ &= 24 \cdot (-4) - 24 + 24 - 5 \\ &= 24 \cdot (-5) + 19 \end{aligned}$$

Quindi la risposta la ottengo dal mio orologio se sposto la lancetta delle ore indietro di 5 ore, o equivalentemente in avanti di 19 ore.

2. Congruenze

Fissiamo un numero m intero positivo, per esempio $m = 12$.

Fare l'aritmetica modulo 12 vuol dire considerare tutti gli altri numeri interi da un punto di vista particolare: di ogni numero n ci interesserà solo il suo resto quando facciamo la divisione euclidea di n per 12. Per esempio, 38 sarà identificato al numero 2, visto che:

$$38 = 12 \cdot 3 + 2$$

Ma anche 62 sarà identificato al 2:

$$62 = 12 \cdot 5 + 2$$

Altri esempi, dove la freccia indica il resto della divisione per 12:

$$\begin{array}{cccc} 43 \rightarrow 7 & 12 \rightarrow 0 & -6 \rightarrow 6 & -11 \rightarrow 1 \\ 15 \rightarrow 3 & 27 \rightarrow 3 & -8 \rightarrow 4 & -12 \rightarrow 0 \end{array}$$

Si dirà per esempio che 38, 62 e 2 sono "congrui fra loro" modulo 12, e si scriverà:

$$38 \equiv 62 \equiv 2 \pmod{12}$$

Pensandoci bene, questa è una aritmetica molto naturale per le lancette del nostro orologio: se si parte dalla mezzanotte di un certo giorno e si lasciano trascorrere due ore, le lancette indicheranno le 2. Ma anche se facciamo trascorrere 38 ore o 62 ore, le lancette indicheranno sempre le 2. Per le lancette del nostro orologio, i numeri 2, 68 e 38 sono in effetti "identificati"!

Dall'esempio passiamo ad una definizione più generale:

DEFINIZIONE 2.1. Fissato un numero intero positivo m , diremo che due numeri interi a e b sono "congrui fra loro modulo m " se quando facciamo la divisione euclidea di a per m otteniamo lo stesso resto di quando facciamo la divisione euclidea di b per m . Scriveremo:

$$a \equiv b \pmod{m}$$

oppure

$$a \equiv b \pmod{m}$$

Se due numeri a e b sono congrui fra loro modulo m , possiamo scrivere le loro divisioni euclidee per m , che, come sappiamo, hanno lo stesso resto:

$$a = mq + r \quad b = ms + r$$

Notiamo allora che

$$a - b = mq + r - (ms + r) = mq - ms = m(q - s)$$

Questo significa che m divide $a - b$. Viceversa, se prendiamo due numeri a e b che non sono congrui fra loro modulo m , possiamo facilmente osservare che $a - b$ non è un multiplo di m . Infatti, chiamiamo r_1 ed r_2 i resti della divisione di a e b per m (dunque r_1 e r_2 sono diversi fra loro); si nota che la divisione euclidea di $a - b$ per m ha resto $r_1 - r_2$ che è diverso da 0. In conclusione, abbiamo dimostrato:

PROPOSIZIONE 2.2. *Dato un numero intero positivo m , due numeri interi a e b sono congrui fra loro modulo m se e solo se m divide $a - b$ (questo equivale anche a dire che m divide $b - a$).*

OSSERVAZIONE 2.3. Dunque, la condizione “ m divide $a - b$ ” poteva essere presa come definizione di congruenza fra i numeri interi a e b .

TEOREMA 2.4. *Le congruenze “rispettano” somme e prodotti, nel senso che se $a \equiv a' \pmod{m}$ e $b \equiv b' \pmod{m}$, allora $a + b \equiv a' + b' \pmod{m}$ e $aa' \equiv bb' \pmod{m}$.*

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo che $a' = a + km$ e $b' = b + k'm$.

Allora $a' + b' = a + b + (k + k')m$, e quindi $a + b \equiv a' + b' \pmod{m}$.

Inoltre $a'b' = (a + km)(b + k'm) = ab + kmb + k'ma + kk'm^2$, e siccome $kmb + k'ma + kk'm^2$ è un multiplo di m possiamo concludere $a'b' \equiv ab \pmod{m}$. \square

ESEMPIO 2.5. Trovare il resto della divisione euclidea di $1253423 \cdot 134432$ per 5. Visto che $1253423 \equiv 3 \pmod{5}$ e che $134432 \equiv 2 \pmod{5}$, possiamo sostituire e scrivere: $1253423 \cdot 134432 \equiv 3 \cdot 2 \equiv 6 \equiv 1 \pmod{5}$. Quindi il resto è 1.

ESEMPIO 2.6. Trovare il resto della divisione euclidea di 2^{99} per 7. Soluzione: $2^{99} = 2^{3 \cdot 33} = 8^{33}$. Ora, 8 è congruo a 1 modulo 7 dunque possiamo continuare sostituendo: $8^{33} \equiv 1^{33} \equiv 1 \pmod{7}$. Quindi il resto è 1.

ESEMPIO 2.7. Trovare il resto della divisione di 3^{11} per 5. Soluzione: Modulo 5 abbiamo le seguenti congruenze: $3^{11} \equiv 3^2 3^2 3^2 3^2 3^2 3 \equiv 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 \equiv (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot 3 \equiv -3 \equiv 2 \pmod{5}$. Quindi il resto è 2.

3. Calcolo veloce dei resti e basi numeriche

Ricordiamo che quando scriviamo un numero, ad esempio 1234567, implicitamente sottintendiamo che esso è scritto in base 10, ovvero:

$$1234567 = 1 \cdot 10^6 + 2 \cdot 10^5 + 3 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10 + 7$$

Utilizzando il linguaggio delle congruenze possiamo trovare dei modi rapidi di calcolare il resto della divisione euclidea. I prossimi esempi illustrano il caso in cui il divisore è 3, 9, 11, 4, 7 (e in particolare ci fanno riottenere i famosi criteri di divisibilità per 3, 4, 7, 11).

ESEMPIO 3.1. Trovare il resto della divisione di 1234564 per 3. Soluzione: Siccome $10 \equiv 1 \pmod{3}$, nel fare le congruenze modulo 3 possiamo sostituire 10 con 1 nell'espansione decimale ottenendo: $1234564 \equiv 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 4 \equiv 1 \pmod{3}$. Quindi il resto è 1. Se avessimo cercato il resto della divisione di 1234564 per 9, avremmo anche in questo caso sostituito il 10 con 1 ottenendo $1234564 \equiv 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 4 \equiv 7 \pmod{9}$.

ESEMPIO 3.2. Trovare il resto della divisione di 1234567 per 11. Soluzione: Siccome $10 \equiv -1 \pmod{11}$, nel fare le congruenze modulo 11 possiamo sostituire 10 con -1 nell'espansione decimale ottenendo: $1234567 \equiv 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 \equiv 4$. Quindi il resto è 4.

ESEMPIO 3.3. Trovare il resto della divisione di 1234567 per 4. Soluzione: osserviamo che $100 = 25 \cdot 4 \equiv 0 \pmod{4}$. Quindi $1234567 = 12345 \cdot 100 + 67 \equiv 67 \equiv 3 \pmod{4}$.

ESEMPIO 3.4. Trovare il resto della divisione di 1234567 per 7. Soluzione: osserviamo che $1000 = 7 \cdot 143 - 1 \equiv -1 \pmod{7}$. Quindi $1234567 = 1 \cdot 1000^2 + 234 \cdot 1000 + 567 \equiv 1 - 234 + 567 \equiv 334 \equiv 5 \pmod{7}$.

ESEMPIO 3.5. Si dimostri che $\sqrt{1234567}$ non è un intero. Soluzione: per assurdo supponiamo che vi sia un intero x tale che $x^2 = 1234567$. Per l'esercizio precedente $x^2 \equiv 1234567 \equiv 3 \pmod{4}$. Quindi basta mostrare che x^2 non può essere congruente a 3 modulo 4. Siccome x è congruo a 0, 1, 2 o 3 modulo 4, ci sono solo quattro verifiche da fare:

$$\begin{aligned} 0^2 &\equiv 0 \pmod{4} \\ 1^2 &\equiv 1 \pmod{4} \\ 2^2 &\equiv 0 \pmod{4} \\ 3^2 &\equiv 1 \pmod{4} \end{aligned}$$

ESEMPIO 3.6. Cambiamento di base: verifichiamo che la scrittura (12345) in base 10 e la scrittura 30071 in base 8 indicano lo stesso numero. In simboli della scrittura $(12345)_{\text{base } 10} = (30071)_{\text{base } 8}$. Infatti

$$\begin{aligned} 12345 &= 8 \cdot 1543 + 1 \\ 1543 &= 8 \cdot 192 + 7 \\ 192 &= 8 \cdot 24 + 0 \\ 24 &= 8 \cdot 3 + 0 \\ 3 &= 8 \cdot 0 + 3 \end{aligned}$$

I resti danno la scrittura in base 8 richiesta: infatti da quanto abbiamo scritto segue che $12345 = 1543 \cdot 8 + 1 = 192 \cdot 8^2 + 7 \cdot 8 + 1 = 24 \cdot 8^3 + 7 \cdot 8 + 1 = 3 \cdot 8^4 + 7 \cdot 8 + 1$.

4. Il massimo comun divisore e l'algoritmo di Euclide

Notazione. Ricordiamo che, dati due numeri interi c e d , diciamo che c divide d se esiste un numero intero k tale che $ck = d$. In tal caso scriviamo $c \mid d$.

DEFINIZIONE 4.1. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, con almeno uno dei due diverso da 0 (notare che questo si può scrivere così: $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} - \{(0, 0)\}$). Allora il "massimo comun(e) divisore" di a e b è l'unico intero positivo d tale che:

- $d \mid a$ e $d \mid b$;
- d è più grande di ogni altro divisore comune di a e b : se $c \mid a$ e $c \mid b$, allora deve essere $c \leq d$.

Indicheremo il massimo comun divisore di a e b come $MCD(a, b)$ (talvolta, quando è chiaro che stiamo considerando il massimo comun divisore, ometteremo MCD e scriveremo soltanto (a, b)). Se vale che $MCD(a, b) = 1$ diremo che a e b sono “primi tra loro” o “coprimi”.

OSSERVAZIONE 4.2. La definizione è ben posta. Infatti almeno un divisore comune positivo di a e b esiste sempre (il numero 1) e dunque l'insieme di tutti i divisori comuni positivi è un sottoinsieme di \mathbb{N} non vuoto e finito (si noti a questo proposito che i suoi elementi sono tutti minori o uguali al minimo fra $|a|$ e $|b|$). Allora esiste unico il massimo di tale insieme, che è appunto il $MCD(a, b)$.

Osserviamo subito che:

$$MCD(a, b) = MCD(b, a) = MCD(|a|, |b|)$$

$$MCD(a, a) = MCD(a, 0) = |a|$$

Calcoliamo per esercizio qualche massimo comun divisore:

$$\begin{array}{lll} MCD(9, 0) = 9 & MCD(-5, 0) = 5 & MCD(-8, -12) = 4 \\ MCD(9, 54) = 9 & MCD(-9, 54) = 9 & MCD(45, 34) = 1 \\ MCD(3, 100) = 1 & MCD(10, 2^8) = 2 & MCD(-1, 1) = 1 \\ MCD(1, 100) = 1 & MCD(1, 0) = 1 & MCD(12, -12) = 12 \end{array}$$

Da questi esempi risulta che 45 e 34 sono coprimi, come -1 e 1 , 3 e 100 , 1 e 100 , e anche 1 e 0 .

Se conosciamo la fattorizzazione in primi di due numeri interi $a \geq 2$ e $b \geq 2$ possiamo calcolare immediatamente $MCD(a, b)$. Infatti $MCD(a, b)$ è uguale a 1 se non ci sono primi che compaiono in entrambe le fattorizzazioni; se invece ci sono primi che compaiono in entrambe le fattorizzazioni, $MCD(a, b)$ è uguale al prodotto di tali primi, e ciascuno di essi è preso con l'esponente minimo con cui compare.

Per esempio, se

$$a = 2^5 \cdot 3^4 \quad \text{e} \quad b = 5 \cdot 7 \cdot 17^3$$

allora

$$MCD(a, b) = 1$$

e se invece

$$a = 2^5 \cdot 3^4 \cdot 7^2 \cdot 11^3 \quad \text{e} \quad b = 2^4 \cdot 3^8 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 17^3$$

allora

$$MCD(a, b) = 2^4 \cdot 3^4 \cdot 7$$

Ciò segue dal fatto che la decomposizione in prodotto di primi di un numero è essenzialmente *unica*. Questa è una proprietà ben nota, su cui comunque torneremo più avanti in un breve capitolo dedicato ai numeri primi (vedi Teorema 0.15).

Talvolta però calcolare un massimo comune divisore in questo modo è complicato e può richiedere molto tempo. Infatti conoscere la fattorizzazione di un numero in prodotto di primi può rivelarsi un problema molto complesso.

Viene allora in nostro aiuto un metodo, l'*algoritmo di Euclide*, che fa entrare in gioco numeri più piccoli, basandosi sull'osservazione che se $c \equiv c' \pmod{m}$, allora $MCD(c, m) = MCD(c', m)$.

Descriviamolo: supponiamo di voler trovare il MCD di due numeri $a, b \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli. Se uno dei due numeri (per esempio a) è 0, allora sappiamo subito dire che $MCD(0, b)$ è uguale al valore assoluto $|b|$ di b .

Occupiamoci dunque del caso in cui entrambi i numeri sono diversi da zero. Se vale per esempio che $|a| \geq |b| > 0$ applichiamo l'algoritmo direttamente al calcolo di $MCD(|a|, |b|)$. Cominciamo con la divisione euclidea di $|a|$ per $|b|$:

$$|a| = |b|q + r \quad \text{con} \quad 0 \leq r < |b|$$

Se $r = 0$ abbiamo finito, perché possiamo concludere subito che $|b| = MCD(|a|, |b|) = MCD(a, b)$. Altrimenti proseguiamo con delle divisioni euclidee successive finché non si trova un resto uguale a 0:

$$|a| = |b|q + r \quad \text{con} \quad 0 < r < |b|$$

$$|b| = r \cdot q_1 + r_1 \quad \text{con} \quad 0 < r_1 < r$$

$$r = r_1 q_2 + r_2 \quad \text{con} \quad 0 < r_2 < r_1$$

.....

$$r_{n-2} = r_{n-1} q_n + r_n \quad \text{con} \quad 0 < r_n < r_{n-1}$$

$$r_{n-1} = r_n q_{n+1} + 0$$

A questo punto concludiamo che $r_n = MCD(|a|, |b|) = MCD(a, b)$.

Perché l'algoritmo si è fermato? Perché ad ogni passo otteniamo un resto r_j che è un numero naturale ed è strettamente minore del resto precedente. Se potessimo continuare all'infinito, l'insieme dei resti contraddirebbe il principio del buon ordinamento (sarebbe un sottoinsieme di \mathbb{N} senza minimo..).

Perché r_n è proprio il MCD che cercavamo? Il punto cruciale, come avevamo annunciato, è il seguente:

TEOREMA 4.3. *Se $c \equiv c' \pmod{m}$, allora $MCD(c, m) = MCD(c', m)$. In particolare $MCD(c, m) = MCD(\text{Resto}(c, m), m)$.*

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo un divisore d di m . Allora, visto che per la definizione di congruenza deve valere $c = c' + mk$ per un certo intero k , possiamo concludere che $d|c$ se e solo se $d|c'$. Quindi i divisori comuni di m e c coincidono con i divisori comuni di m ed c' . Anche i massimi devono allora coincidere. \square

Applicando questo lemma ai vari passaggi del nostro algoritmo di Euclide otteniamo:

$$MCD(|a|, |b|) = MCD(|b|, r) = MCD(r, r_1) = MCD(r_1, r_2) = \dots$$

e così via (questo "così via" nasconde una facile induzione!) fino a

$$\dots = MCD(r_{n-2}, r_{n-1}) = MCD(r_{n-1}, r_n)$$

Ma $MCD(r_{n-1}, r_n)$ è proprio r_n , visto che $r_n|r_{n-1}$. Ripercorrendo tutta la catena di uguaglianze scopriamo di aver dimostrato che

$$MCD(|a|, |b|) = r_n$$

e dunque ora sappiamo perché l'algoritmo di Euclide funziona!

Per una stima del numero di passi necessario per portare a termine l'algoritmo cimentatevi con l'Esercizio 7.4.

5. L'Identità di Bezout

Vogliamo ora mettere in luce una proprietà del massimo comune divisore che giocherà un ruolo fondamentale in tutta la nostra introduzione all'aritmetica: il massimo comun divisore di due numeri a e b è il più piccolo intero positivo che può essere ottenuto quando consideriamo le espressioni del tipo $ax + by$ al variare di x e y fra i numeri interi.

TEOREMA 5.1 (Identità di Bezout). *Dati due numeri interi a e b con $(a, b) \neq (0, 0)$, esistono due numeri interi m e n tali che*

$$MCD(a, b) = am + bn$$

Si dice che $MCD(a, b)$ può essere espresso come combinazione lineare a coefficienti interi di a e di b .

OSSERVAZIONE 5.2. Il teorema dice che esistono m ed n tali che $MCD(a, b) = am + bn$, ma non dice che sono unici. Infatti, come risulterà dalla teoria delle equazioni diofantee lineari, ci sono infinite scelte possibili di una coppia (m, n) tale che $MCD(a, b) = am + bn$.

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo l'insieme $CL(a, b)$ di tutte le possibili combinazioni lineari **positive** a coefficienti interi di a e b , ossia

$$CL(a, b) = \{ar + bs \mid r \in \mathbb{Z}, s \in \mathbb{Z}, ar + bs > 0\}$$

Tale insieme è non vuoto. Infatti supponiamo che $a \neq 0$ (altrimenti si fa lo stesso ragionamento con b). Allora si trovano degli elementi dell'insieme $CL(a, b)$ per esempio scegliendo $s = 0$ e r tale che $ra > 0$. Già così abbiamo esibito infiniti elementi nell'insieme $CL(a, b)$.

Inoltre $CL(a, b) \subseteq \mathbb{N}$. Dunque, per il principio del buon ordinamento, $CL(a, b)$ ammette minimo.

Sia d tale minimo: in particolare, dato che $d \in CL(a, b)$, esistono un $m \in \mathbb{Z}$ ed un $n \in \mathbb{Z}$ tali che

$$d = am + bn$$

La dimostrazione del teorema si conclude ora mostrando che $d = MCD(a, b)$. Infatti d soddisfa le proprietà del massimo comune divisore, ossia:

- $d|a$ e $d|b$
- se $c|a$ e $c|b$ allora $c \leq d$

Per il primo punto, facciamo la divisione euclidea fra a e d . Sarà $a = qd + r$ con $0 \leq r < d$. Allora

$$a = q(am + bn) + r$$

da cui

$$r = (-qm + 1)a + (-qn)b$$

Ma allora r si esprime come combinazione lineare a coefficienti interi di a e di b . Se fosse $r > 0$ avremmo che $r \in CL(a, b)$ per definizione di $CL(a, b)$. Questo non può succedere perché $0 \leq r < d$ e d era stato scelto come **minimo** elemento di $CL(a, b)$.

Dunque deve essere $r = 0$. Questo vuol dire che $a = qd + 0$, ossia che $d|a$. Allo stesso modo si dimostra che $d|b$.

Il secondo punto è immediato. Infatti se $c|a$ e $c|b$ allora $c|am + bn$ cioè $c|d$, in particolare $c \leq d$.

□

COROLLARIO 5.3. *Dati due numeri interi a e b con $(a, b) \neq (0, 0)$, se $c|a$ e $c|b$, allora non solo $c \leq MCD(a, b)$ ma più precisamente vale che $c|MCD(a, b)$.*

Riguardando la dimostrazione del teorema, ci accorgiamo che abbiamo dimostrato il risultato annunciato all'inizio del paragrafo (che è un po' più forte di quello che chiedeva l'enunciato del teorema):

TEOREMA 5.4. *Dati due numeri interi a e b con $(a, b) \neq (0, 0)$, $MCD(a, b)$ è il più piccolo numero intero positivo ottenibile come combinazione lineare intera di a e di b .*

Sottolineiamo che se dividiamo due numeri per il loro massimo comun divisore, i due quozienti ottenuti sono primi fra loro:

COROLLARIO 5.5. *Presi due numeri interi a e b non entrambi nulli, se li dividiamo per il loro massimo comun divisore $MCD(a, b)$ otteniamo due numeri*

$$a' = \frac{a}{MCD(a, b)} \quad b' = \frac{b}{MCD(a, b)}$$

che sono primi fra loro.

DIMOSTRAZIONE. Se ci fosse un divisore comune $d > 1$ di a' e b' , allora $d \cdot MCD(a, b)$ dividerebbe sia a sia b e sarebbe più grande di $MCD(a, b)$, assurdo. □

Concludiamo con una osservazione aritmetica importante, nella cui dimostrazione l'Identità di Bezout gioca un ruolo fondamentale:

TEOREMA 5.6. *Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Se $a|bc$ e $MCD(a, b) = 1$ allora $a|c$.*

DIMOSTRAZIONE. Visto che $MCD(a, b) = 1$ allora per l'Identità di Bezout posso trovare $m, n \in \mathbb{Z}$ tali che

$$1 = an + bm$$

Moltiplicando entrambi i membri per c otteniamo:

$$c = acn + bcm$$

Questo ci permette di concludere che $a|c$. Infatti $a|acn$ (ovviamente) e $a|bcm$ (visto che $a|bc$ per ipotesi), dunque a divide la somma $acn + bcm$ che è uguale a c . □

OSSERVAZIONE 5.7. La dimostrazione precedente è breve e semplice ma non è banale. Ve ne vengono in mente altre alternative a questa?

6. Un metodo costruttivo per ottenere l'Identità di Bezout

Dati due numeri interi non entrambi nulli a e b , l'Identità di Bezout, come abbiamo visto nel Paragrafo 5, ci dice che è possibile trovare due numeri interi m e n tali che

$$MCD(a, b) = am + bn$$

Ma la dimostrazione che abbiamo proposto in quel paragrafo non ci dà un metodo concreto per trovare un m e un n che soddisfino l'uguaglianza scritta sopra. In questo paragrafo colmeremo questa lacuna, descrivendo un metodo che si basa sull'algorithmo di Euclide, utilizzato due volte, nel modo usuale e "a rovescio".

Prendiamo per esempio $a = 1020$ e $b = 351$ e calcoliamo $MCD(a, b)$ tramite l'algoritmo di Euclide:

$$\begin{aligned} 1020 &= 351 \cdot 2 + 318 \\ 351 &= 318 \cdot 1 + 33 \\ 318 &= 33 \cdot 9 + 21 \\ 33 &= 21 \cdot 1 + 12 \\ 21 &= 12 \cdot 1 + 9 \\ 12 &= 9 \cdot 1 + 3 \\ 9 &= 3 \cdot 3 + 0 \end{aligned}$$

Dunque abbiamo trovato che $MCD(1020, 351) = 3$. Scriviamo adesso di nuovo tutte le equazioni dell'algoritmo (tranne l'ultima) ponendo a sinistra i resti:

$$\begin{aligned} 318 &= 1020 - 351 \cdot 2 \\ 33 &= 351 - 318 \cdot 1 \\ 21 &= 318 - 33 \cdot 9 \\ 12 &= 33 - 21 \cdot 1 \\ 9 &= 21 - 12 \cdot 1 \\ 3 &= 12 - 9 \cdot 1 \end{aligned}$$

Ora ripercorriamo l'algoritmo "a rovescio": cominciamo da $3 = 12 - 9 \cdot 1$. Ricordiamo che come obiettivo finale vogliamo trasformare questa equazione in una del tipo

$$3 = 1020m + 351n$$

Cominciamo utilizzando l'equazione $9 = 21 - 12 \cdot 1$. Possiamo usarla per sostituire il 9 ed ottenere 3 espresso come combinazione lineare di 12 e di 21:

$$3 = 12 - 9 \cdot 1 = 12 - (21 - 12 \cdot 1) \cdot 1 = 12 \cdot 2 - 21$$

A questo punto facciamo entrare in gioco l'equazione $12 = 33 - 21 \cdot 1$. La utilizziamo per sostituire il 12 ed ottenere 3 come combinazione lineare di 33 e di 21:

$$3 = 12 \cdot 2 - 21 = (33 - 21 \cdot 1) \cdot 2 - 21 = 33 \cdot 2 - 21 \cdot 3$$

Continuando,

$$\begin{aligned} 3 &= 33 \cdot 2 - 21 \cdot 3 = 33 \cdot 2 - (318 - 33 \cdot 9) \cdot 3 = 33 \cdot 29 - 318 \cdot 3 = \\ &= 33 \cdot 29 - 318 \cdot 3 = (351 - 318 \cdot 1) \cdot 29 - 318 \cdot 3 = 351 \cdot 29 - 318 \cdot 32 \end{aligned}$$

Infine, chiamando in causa $318 = 1020 - 351 \cdot 2$:

$$3 = 351 \cdot 29 - 318 \cdot 32 = 351 \cdot 29 - (1020 - 351 \cdot 2) \cdot 32 = 1020(-32) + 351 \cdot 93$$

Abbiamo dunque trovato $m = -32$ e $n = 93$:

$$3 = 1020(-32) + 351 \cdot 93$$

OSSERVAZIONE 6.1. Come abbiamo già preannunciato, quando parleremo di equazioni diofantee mostreremo che questa è solo una delle infinite possibili coppie (m, n) che soddisfano l'identità di Bezout

$$3 = 1020m + 351n$$

Anche se si tratta solo di un esempio, non è difficile intuire che il metodo funziona sempre, per ogni a e b di cui è possibile calcolare il massimo comun divisore. Questa è dunque un'altra possibile via di dimostrazione dell'identità di Bezout (radicalmente diversa dall'altra, che era "esistenziale": questa la potremmo chiamare "costruttiva", visto che fornisce un algoritmo concreto per trovare i numeri m e n).

Lasciamo per esercizio facoltativo i dettagli di questa dimostrazione (che può essere svolta per induzione sul numero di passaggi che occorrono per concludere l'algoritmo di Euclide).

Un metodo "compatto" per organizzare il calcolo viene illustrato nell'esempio seguente:

ESEMPIO 6.2. Calcolare $MCD(252, 198)$ e trovare x, y interi tali che $MCD(252, 198) = 252x + 198y$.

Per prima cosa calcoliamo $MCD(252, 198)$.

$$\begin{aligned} 252 &= 198 \cdot 1 + 54 \\ 198 &= 54 \cdot 3 + 36 \\ 54 &= 36 \cdot 1 + 18 \\ 36 &= 18 \cdot 2 + 0 \end{aligned}$$

Dunque $MCD(252, 198) = 18$. Scriviamo ora:

$$\begin{array}{rclcl} 252 & = & 252 \cdot \boxed{1} & + & 198 \cdot \boxed{0} \\ 198 & = & 252 \cdot \boxed{0} & + & 198 \cdot \boxed{1} \\ 252 - 198 & = & 54 & = & 252 \cdot \boxed{1} + 198 \cdot \boxed{(-1)} \\ 198 - 54 \cdot 3 & = & 36 & = & 252 \cdot \boxed{(-3)} + 198 \cdot \boxed{4} \\ 54 - 36 & = & 18 & = & 252 \cdot \boxed{4} + 198 \cdot \boxed{(-5)} \end{array}$$

Nella colonna centrale abbiamo scritto (dall'alto) 252, 198 e poi i resti ottenuti con l'algoritmo di Euclide. Di ognuno di questi numeri, nella colonna di destra è indicato come si può ottenere come combinazione di 252 e 198¹. Dunque il risultato finale si legge dall'ultima riga ed è $x = 4, y = -5$.

7. Esercizi

ESERCIZIO 7.1. Calcolare i seguenti massimi comuni divisori:

$$MCD(1094, 189) \quad MCD(2562, 696)$$

Trovare dei numeri interi m, n, s, t tali che:

$$MCD(1094, 189) = 1094m + 189n \quad MCD(2562, 696) = 2562s + 696t$$

ESERCIZIO 7.2. Trovare due interi a e b tali che l'algoritmo di Euclide per determinare $MCD(a, b)$ consista di esattamente 7 passaggi.

¹Per passare dalla combinazione della terza riga a quella della quarta, per esempio, visto che $36 = 198 - 54 \cdot 3$, abbiamo sommato la combinazione della seconda riga a quella della terza moltiplicata per -3 . Questo si traduce in modo rapido facendo la corrispondente operazione sui numeri incorniciati

- ESERCIZIO 7.3. Consideriamo la successione dei numeri di Fibonacci F_n ($n \in \mathbb{N} - \{0\}$):
- Dimostrare che 2 non divide mai due numeri di Fibonacci consecutivi.
 - Dimostrare che il massimo comun divisore di due numeri di Fibonacci consecutivi è sempre 1.

ESERCIZIO 7.4. Dati due numeri interi positivi a e b , con $a > b$, dimostrare che il numero dei passi necessari per portare a termine l'algoritmo di Euclide è sempre $\leq 2 \log_2(b) + 1$.

ESERCIZIO 7.5. Consideriamo l'insieme:

$$A = \{3k \mid k = 1, 2, \dots, 100\} \cup \{2, 4, 5\}$$

- Quante sono le funzioni $f : A \rightarrow A$?
- Esistono funzioni $f : A \rightarrow A$ tali che, $\forall x \in A, MCD(x, f(x)) = 1$?
- Quante sono le funzioni $f : A \rightarrow A$ tali che, $\forall x \in A, MCD(x, f(x)) > 1$?
- Fra le funzioni del punto c), ne esiste almeno una bigettiva diversa dall'identità ?

ESERCIZIO 7.6. Consideriamo i numeri interi x tali che $10000000 \leq x < 20000000$. Quanti di questi numeri sono congrui a 1 modulo 3?

ESERCIZIO 7.7. Stabilire se è vero o falso che

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 12 \cdot 13 \equiv 7 \quad (17)$$

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 12 \cdot 13 \equiv 0 \quad (1024)$$

In generale è vero o falso che il prodotto di 13 numeri interi consecutivi è sempre divisibile per 1024 ?

ESERCIZIO 7.8. Consideriamo la successione definita per ricorrenza

$$x_0 = 2, \quad x_{n+1} = (x_n^2 + 1)$$

Sia r_n il resto della divisione euclidea di x_n per 5.

- Calcolare i primi 7 valori di r_n .
- Si dia una regola generale per calcolare r_n e la si dimostri per induzione.
- Si calcoli r_{10000} .

ESERCIZIO 7.9 (Tornei all'italiana). Supponiamo di avere n squadre di calcio, con n numero pari, e di voler organizzare un torneo all'italiana². Basta pensare al girone d'andata, quello di ritorno poi è automatico, dunque bisogna organizzare $n - 1$ turni. Le congruenze possono aiutarci. Possiamo infatti utilizzare la seguente regola:

- al turno i la squadra x , con $1 \leq x \leq n - 1$, incontrerà la squadra y dove y soddisfa $1 \leq y \leq n - 1$ e

$$x + y \equiv i \pmod{n - 1}$$

a meno che questa equazione non dia come soluzione $x = y$. In tal caso la squadra x incontra la squadra n .

Dimostrare che il torneo così preparato è ben organizzato (vedi Tabella 1).

	Turno 1	Turno 2	Turno 3	Turno 4	Turno 5
squadra 1	vs 5	vs 6	vs 2	vs 3	vs 4
squadra 2	vs 4	vs 5	vs 1	vs 6	vs 3
squadra 3	vs 6	vs 4	vs 5	vs 1	vs 2
squadra 4	vs 2	vs 3	vs 6	vs 5	vs 1
squadra 5	vs 1	vs 2	vs 3	vs 4	vs 6
squadra 6	vs 3	vs 1	vs 4	vs 2	vs 5

TABELLA 1. Esempio: il tabellone del torneo nel caso di 6 squadre.

²Se avessimo un numero dispari di squadre ci potremmo comunque ricondurre a questo caso aggiungendo una squadra fittizia, con la regola che se una squadra deve incontrarla le tocca invece un turno di riposo.

I numeri primi

Nei capitoli precedenti abbiamo più volte chiamato in gioco i numeri primi. Dedichiamo loro un breve capitolo in cui si accosta alla definizione tradizionale una definizione alternativa, si ripensa al teorema della fattorizzazione unica e al suo legame con la ricerca del massimo comun divisore fra due numeri e si conclude dimostrando che i numeri primi sono infiniti.

Cominciamo ricordando la più nota definizione di numero primo:

DEFINIZIONE 0.10. Un numero intero $p \geq 2$ si dice primo se gli unici suoi divisori interi positivi sono 1 e p stesso.

Ecco i numeri primi più piccoli: 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31.

TEOREMA 0.11. *Sia p un numero primo. Supponiamo che, dati due numeri interi b, c , valga $p \mid bc$: allora possiamo concludere che o $p \mid b$ o $p \mid c$.*

DIMOSTRAZIONE. Se $p \mid b$ abbiamo finito. Consideriamo allora il caso in cui p non divide b ; allora vale che $MCD(p, b) = 1$ ¹.

Possiamo dunque applicare il Teorema 5.6: visto che $p \mid bc$ e che $MCD(p, b) = 1$ tale teorema ci dice che $p \mid c$.

Dunque è vero che o $p \mid b$ o $p \mid c$, proprio come volevamo dimostrare. □

Vale anche il viceversa di questo teorema:

TEOREMA 0.12. *Sia a un numero intero ≥ 2 con la seguente proprietà: per ogni $b, c \in \mathbb{Z}$, se $a \mid bc$ allora o $a \mid b$ o $a \mid c$. Allora a è un numero primo.*

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo la contronominale, ossia che se a non è primo, allora a non soddisfa la proprietà. Infatti se a non è primo allora deve avere un divisore positivo k diverso da 1 e da a , dunque deve valere

$$a = ks \quad \text{con} \quad 1 < k < a \quad \text{e} \quad 1 < s < a$$

Ponendo $k = b$ e $s = c$ abbiamo allora trovato due numeri interi tali che $a \mid bc$ ma a non divide né b né c , ossia abbiamo mostrato che a non soddisfa la proprietà. □

Gli enunciati dei due teoremi precedenti ci danno la seguente caratterizzazione dei numeri primi:

TEOREMA 0.13. *Un numero intero $p \geq 2$ è primo se e solo se soddisfa la seguente proprietà: per ogni $b, c \in \mathbb{Z}$, se $p \mid bc$ allora o $p \mid b$ o $p \mid c$.*

¹Infatti $MCD(p, b)$ deve essere in particolare un divisore positivo di p , dunque ci sono solo due possibilità: $MCD(p, b) = 1$ o $MCD(p, b) = p$. La seconda però nel nostro caso è esclusa perché allora varrebbe $p \mid b$.

OSSERVAZIONE 0.14. L'enunciato di questo teorema costituisce una definizione alternativa di numero primo.

Abbiamo già dimostrato (vedi Esempio 4.1) che ogni numero intero ≥ 2 o è primo o si fattorizza come prodotto di numeri primi. Ricordiamo che tale fattorizzazione è "unica":

TEOREMA 0.15 (Unicità della fattorizzazione in primi). *Siano*

$$a = p_1 p_2 p_3 \cdots p_r$$

$$a = q_1 q_2 \cdots q_s$$

due fattorizzazioni del numero intero $a \geq 2$, dove i numeri p_i ($i = 1, 2, \dots, r$) e q_j ($j = 1, 2, \dots, s$) sono primi. Supponiamo di avere scritto le fattorizzazioni in modo che $p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_r$ e $q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_s$. Allora vale che $r = s$ e, per ogni $i = 1, 2, \dots, s$, $p_i = q_i$.

TRACCIA. Cominciamo considerando p_1 . Visto che divide $q_1 q_2 \cdots q_s = q_1 (q_2 \cdots q_s)$, per il Teorema 0.11 o $p_1 | q_1$ oppure $p_1 | q_2 \cdots q_s$. Nel primo caso deve valere $p_1 = q_1$, nel secondo caso si continua e dopo un numero finito di passi troviamo un i tale che $p_i = q_i$. In entrambi i casi, comunque, possiamo dividere l'uguaglianza $p_1 p_2 p_3 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s$ per p_1 e semplificare. Ripetiamo il ragionamento a partire da p_2 ... \square

ESERCIZIO 0.16. Continuare la traccia e finire i dettagli della dimostrazione di questo teorema.

ESERCIZIO 0.17. Alla luce del teorema di unicità riprendiamo in considerazione il metodo, descritto nel Capitolo 12, Paragrafo 4 per la ricerca del massimo comune divisore fra due numeri a e b che si basa sulla scomposizione di a e b in fattori primi. Come mai questo metodo dà effettivamente il $MCD(a, b)$?

Concludiamo con il famoso teorema che ci garantisce che i numeri primi sono infiniti.

TEOREMA 0.18. *L'insieme \mathcal{P} dei numeri primi è infinito.*

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo per assurdo che \mathcal{P} sia finito e siano dunque

$$p_1, p_2, \dots, p_N$$

tutti i numeri primi. Consideriamo allora il numero

$$a = (p_1 \cdot p_2 \cdots p_N) + 1$$

Come accade per tutti i numeri maggiori o uguali a 2, c'è un numero primo che divide a (Esempio 4.1). Nel nostro caso vuol dire che uno dei p_i deve dividere a . Ma nessuno dei numeri p_i divide a , visto che, per ogni $i = 1, 2, \dots, N$, vale $a \equiv 1 \pmod{p_i}$. \square

OSSERVAZIONE 0.19. Visto che \mathcal{P} è incluso in \mathbb{N} , il Teorema 2.2 del Capitolo 10 ci garantisce che \mathcal{P} è infinito numerabile.

1. Esercizi

ESERCIZIO 1.1. Sia $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ la successione definita per ricorrenza da

$$\begin{aligned} a_0 &= 2 \\ a_1 &= 1 \\ a_{n+1} &= 2a_n + 3a_{n-1} \quad \forall n \geq 1. \end{aligned}$$

Dimostrare che:

- (1) $\text{MCD}(a_n, 3) = 1$ per ogni $n \geq 0$.
- (2) $\text{MCD}(a_{n+1}, a_n) = 1$ per ogni $n \geq 0$.

SOLUZIONE: Dimostriamo il punto 1 per induzione su n . Sia $P(n)$ la proposizione $\text{MCD}(a_n, 3) = 1$.

Caso base: $P(0)$ e $P(1)$ sono vere (verifica immediata).

Passo induttivo: supponiamo che, per $n \geq 1$, $P(n)$ sia vera e dimostriamo che è vera la $P(n+1)$. In altre parole, supponiamo che $\text{MCD}(a_n, 3) = 1$ e cerchiamo di dimostrare che $\text{MCD}(a_{n+1}, 3) = 1$.

Per prima cosa osserviamo che, siccome 3 è un numero primo, il fatto che un numero intero a sia primo con 3 è equivalente a dire che 3 non divide a . Dunque dobbiamo dimostrare che 3 non divide a_{n+1} . Sappiamo che

$$a_{n+1} = 2a_n + 3a_{n-1}$$

e notiamo che 3 divide il secondo addendo del membro di destra. Se dunque (dimostrazione per assurdo) 3 dividesse a_{n+1} , scrivendo

$$a_{n+1} - 3a_{n-1} = 2a_n$$

avremmo che, per il teorema di fattorizzazione unica, 3 dovrebbe dividere $2a_n$. Poiché 3 non divide 2, dovrebbe necessariamente valere $3 \mid a_n$ ma questo è assurdo perché contraddice l'ipotesi induttiva secondo la quale $\text{MCD}(a_n, 3) = 1$.

Abbiamo dunque finito di dimostrare il punto 1. Anche per il punto 2 procediamo per induzione su n ; dimostriamo la proposizione $Q(n)$: $\text{MCD}(a_{n+1}, a_n) = 1$.

Caso base: $Q(0)$ e $Q(1)$ sono vere (verifica immediata, infatti $\text{MCD}(1, 2) = 1$ e $\text{MCD}(8, 1) = 1$).

Passo induttivo: supponiamo che, per $n \geq 1$, $\text{MCD}(a_{n+1}, a_n) = 1$ e cerchiamo di dimostrare che $\text{MCD}(a_{n+2}, a_{n+1}) = 1$. Utilizzeremo questa strategia: dimostreremo che nessun primo p può dividere contemporaneamente a_{n+2} e a_{n+1} . Questo implica che $\text{MCD}(a_{n+2}, a_{n+1}) = 1$. Sappiamo che

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n$$

Consideriamo intanto un primo p diverso da 3 e dimostriamo che tale primo non può dividere contemporaneamente a_{n+2} e a_{n+1} . Se infatti (dimostrazione per assurdo) li dividesse, scrivendo

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 3a_n$$

avremmo che, per il teorema di fattorizzazione unica, p dovrebbe dividere $3a_n$. Visto che $p \neq 3$ questo vorrebbe dire che $p \mid a_n$. Ma allora varrebbe $p \mid a_n$ e $p \mid a_{n+1}$, che è assurdo perché contraddice l'ipotesi induttiva $\text{MCD}(a_{n+1}, a_n) = 1$.

Resta da escludere che il numero primo 3 divida contemporaneamente a_{n+2} e a_{n+1} . Ma nel punto 1 abbiamo addirittura visto che 3 non divide nessuno dei termini della successione, sicché non abbiamo problemi. \square

ESERCIZIO 1.2. Dimostrare che l'insieme dei numeri primi congrui a 3 modulo 4 è infinito².

ESERCIZIO 1.3. Dato un numero naturale m , dimostrare che se $2^m + 1$ è primo allora m è una potenza di 2.

ESERCIZIO 1.4 (I numeri di Fermat). Dato $n \in \mathbb{N}$ definiamo:

$$\mathcal{F}_n = 2^{2^n} + 1$$

I numeri \mathcal{F}_n si chiamano *numeri di Fermat*. Fermat aveva congetturato che tali numeri fossero tutti primi..ma, come fu mostrato da Eulero, la congettura è falsa. Provate anche voi a confutarla:

- Dimostrare che F_0, F_1, F_2, F_3, F_4 sono primi.
- Dimostrare che F_5 è divisibile per 641. [Traccia: può essere utile osservare che $641 = 2^4 + 5^4 = 1 + 5 \cdot 2^7$]

Possiamo comunque utilizzare i numeri di Fermat per dimostrare, in maniera diversa da quella del Teorema 0.18, che i numeri primi sono infiniti:

- Dimostrare che se $n \neq m$ allora F_n e F_m sono coprimi.
- Dedurre dal punto precedente che i numeri primi sono infiniti.

²Anche l'insieme dei numeri primi congrui a 1 modulo 4 è infinito, per la dimostrazione vedere più avanti l'Esercizio 4.5 del Capitolo 16.

Equazioni diofantee e congruenze lineari

1. Le equazioni diofantee

Una equazione del tipo

$$ax + by = c$$

dove a, b, c sono numeri interi e x, y sono le variabili, si chiama equazione diofantea.

Risolverla vuol dire trovare una coppia di numeri interi $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tali che

$$a\bar{x} + b\bar{y} = c$$

In questo paragrafo studieremo un criterio per decidere se una equazione diofantea ammette soluzioni e, nel caso in cui la ammetta, descriveremo un metodo per trovare tutte le sue soluzioni.

Per prima cosa studiamo a parte il caso in cui $a = 0, b = 0$. L'equazione

$$0x + 0y = c$$

ha soluzione se e solo se anche $c = 0$ e in tal caso le sue soluzioni sono infinite, precisamente tutte le possibili coppie $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Rimane da studiare il caso in cui a e b siano non siano entrambi nulli.

TEOREMA 1.1. *L'equazione diofantea*

$$(1.1) \quad ax + by = c$$

(con a e b non entrambi nulli) ha soluzione se e solo se $MCD(a, b)$ divide c .

DIMOSTRAZIONE. Viene in nostro aiuto l'Identità di Bezout. Il Teorema 5.1 ci dice infatti che certamente l'equazione diofantea

$$(1.2) \quad ax + by = MCD(a, b)$$

ammette soluzione.

Ma l'equazione che dobbiamo risolvere differisce da questa perché nel membro di destra c'è c invece di $MCD(a, b)$.

Allora tutta la nostra strategia si gioca su questa domanda: $MCD(a, b)$ divide o non divide il numero c ?

Se la risposta è sì, ossia $c = MCD(a, b)k$ per un certo numero intero k , allora l'equazione (1.1) ammette soluzione. Infatti si parte da una coppia di numeri interi (m, n) che risolve l'equazione (1.2):

$$am + bn = MCD(a, b)$$

e si moltiplicano entrambi i membri per k . Troviamo allora:

$$a(mk) + b(nk) = MCD(a, b) \cdot k = c$$

dunque, (mk, nk) è una soluzione dell'equazione (1.1).

Viceversa, se la risposta è no, ossia $MCD(a, b)$ non divide c , allora l'equazione (1.1) non può avere soluzione e lo possiamo dimostrare per assurdo. Se infatti ammettesse una soluzione (chiamiamola (\bar{x}, \bar{y})) considerando l'uguaglianza

$$a\bar{x} + b\bar{y} = c$$

ricaveremmo che, visto che $MCD(a, b)$ divide il membro di sinistra (essendo un divisore sia di a che di b), allora $MCD(a, b)$ deve dividere il membro di destra, ossia c . Questo è assurdo perché eravamo proprio nel caso in cui $MCD(a, b)$ non divide c . \square

Studiamo meglio il caso in cui l'equazione diofantea (1.1) ha soluzione. In questo caso la soluzione sarà una sola o possiamo trovarne più di una?

Per rispondere, prendiamo in considerazione un'altra equazione, "più semplice" della (1.1):

$$ax + by = 0$$

Come vedete, abbiamo sostituito c con 0. Questa si chiama "l'equazione omogenea associata" alla (1.1).

La sua importanza è legata a questa osservazione: se (\bar{x}, \bar{y}) è una soluzione di (1.1) e (γ, δ) è una soluzione della equazione omogenea associata, allora $(\bar{x} + \gamma, \bar{y} + \delta)$ è ancora una soluzione di (1.1). Lo potete subito verificare sommando membro a membro le due uguaglianze:

$$a\bar{x} + b\bar{y} = c$$

$$a\gamma + b\delta = 0$$

Abbiamo trovato un modo per generare altre soluzioni di (1.1), a partire da una soluzione (\bar{x}, \bar{y}) data. Ma quante sono le soluzioni della equazione omogenea associata? Troviamole: riscriviamo

$$ax + by = 0$$

come

$$ax = -by$$

Possiamo dividere entrambi i membri per $MCD(a, b)$:

$$\frac{a}{MCD(a, b)} x = -\frac{b}{MCD(a, b)} y$$

Questa equazione è equivalente a quella iniziale. Supponiamo di avere una soluzione (γ, δ) :

$$\frac{a}{MCD(a, b)} \gamma = -\frac{b}{MCD(a, b)} \delta$$

A questo punto, visto che i due numeri $\frac{a}{MCD(a, b)}$ e $\frac{b}{MCD(a, b)}$ sono primi fra loro (vedi il Corollario 5.5), il Teorema 5.6 ci dice che $\frac{a}{MCD(a, b)}$ deve dividere δ . Allora δ è della

forma $\frac{a}{MCD(a, b)} t$ e γ risulta uguale a $-\frac{b}{MCD(a, b)} t$.

Viceversa si nota subito che una qualunque coppia della forma

$$\left(-\frac{b}{MCD(a, b)} t, \frac{a}{MCD(a, b)} t\right)$$

con $t \in \mathbb{Z}$ è una soluzione della equazione omogenea associata. Abbiamo dunque trovato TUTTE le soluzioni della equazione omogenea associata, e notiamo che sono infinite!

Saranno dunque infinite anche le soluzioni della equazione diofantea iniziale (1.1). Il seguente teorema afferma che, con le argomentazioni appena esposte, abbiamo in realtà trovato tutte le soluzioni di (1.1):

TEOREMA 1.2. *Se l'equazione diofantea (1.1) ammette soluzione, allora ammette infinite soluzioni. Presa una soluzione particolare (\bar{x}, \bar{y}) , l'insieme \mathcal{S} di tutte le soluzioni può essere descritto così:*

$$\mathcal{S} = \{(\bar{x} + \gamma, \bar{y} + \delta) \mid (\gamma, \delta) \text{ è soluzione dell'equazione omogenea associata}\}$$

DIMOSTRAZIONE. Le argomentazioni esposte poco sopra dimostrano che

$$\{(\bar{x} + \gamma, \bar{y} + \delta) \mid (\gamma, \delta) \text{ è soluzione dell'equazione omogenea associata}\} \subseteq \mathcal{S}$$

Resta da dimostrare l'inclusione opposta, ossia che ogni soluzione di (1.1) è della forma “ $(\bar{x}, \bar{y}) +$ una soluzione dell'equazione omogenea associata”.

Questo segue osservando che, se (α, β) è una soluzione di (1.1), allora $(\alpha - \bar{x}, \beta - \bar{y})$ è una soluzione della equazione omogenea associata. □

2. Esempio di risoluzione di una equazione diofantea

Troviamo tutte le soluzioni dell'equazione diofantea

$$435x + 102y = 15$$

Ricordiamo che una soluzione è una coppia $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ che soddisfa l'equazione data:

$$435\bar{x} + 102\bar{y} = 15$$

- Per prima cosa verifichiamo se l'equazione proposta ammette soluzioni¹: sappiamo che questo accade se e solo se $MCD(435, 102) \mid 15$. Usiamo dunque l'algoritmo di Euclide per calcolare $MCD(435, 102)$.

$$435 = 102 \cdot 4 + 27$$

$$102 = 27 \cdot 3 + 21$$

$$27 = 21 \cdot 1 + 6$$

$$21 = 6 \cdot 3 + 3$$

$$6 = 3 \cdot 2 + 0$$

Dunque $MCD(435, 102) = 3 \mid 15$ e la nostra equazione ammette soluzioni.

¹Un passo ancora precedente, che ora per scelta espositiva non facciamo, ma che può essere conveniente, consiste nel dividere tutta l'equazione per 3, il massimo numero che divide 435, 102, 15. Otterremmo così l'equazione equivalente:

$$145x + 34y = 5$$

- Adesso troviamo una soluzione particolare dell'equazione. Come primo passo troviamo una combinazione lineare di Bezout, ossia un $m \in \mathbb{Z}$ e un $n \in \mathbb{Z}$ tali che

$$3 = MCD(435, 102) = 435m + 102n$$

Scriviamo i resti dell'algoritmo di Euclide appena svolto:

$$27 = 435 - 102 \cdot 4$$

$$21 = 102 - 27 \cdot 3$$

$$6 = 27 - 21 \cdot 1$$

$$3 = 21 - 6 \cdot 3$$

e sostituiamoli uno dopo l'altro nelle combinazioni lineari qui sotto:

$$\begin{aligned} 3 &= 21 - 6 \cdot 3 = 21 - (27 - 21)3 = 21 \cdot 4 - 27 \cdot 3 = \\ &= (102 - 27 \cdot 3)4 - 27 \cdot 3 = 102 \cdot 4 - 27 \cdot 15 = 102 \cdot 4 - (435 - 102 \cdot 4) \cdot 15 = \\ &= 102 \cdot 64 - 435 \cdot 15 \end{aligned}$$

In conclusione abbiamo trovato

$$3 = 102 \cdot 64 - 435 \cdot 15$$

(insomma $m = -15$ e $n = 64$).

Se moltiplichiamo questa uguaglianza per $\frac{15}{MCD(435, 102)} = 5$ otteniamo

$$15 = 102 \cdot 320 - 435 \cdot 75$$

Abbiamo dunque che $(-75, 320)$ è una soluzione particolare di

$$435x + 102y = 15$$

- Troviamo adesso tutte le infinite soluzioni della equazione diofantea data. Consideriamo la omogenea associata

$$435x + 102y = 0$$

e calcoliamone tutte le soluzioni. Dividendo entrambi i membri per $3 = MCD(435, 102)$ (IMPORTANTE: ricordarsi sempre di dividere per il MCD a questo punto dello svolgimento!) ci riduciamo a

$$145x + 34y = 0$$

ossia

$$145x = -34y$$

Adesso 145 e 34 sono coprimi (controllate bene di aver capito perché.. -abbiamo diviso per il MCD... vedi il Corollario 5.5) e dunque se (x, y) è una soluzione deve valere $y = 145q$, con $q \in \mathbb{Z}$. Sostituendo

$$145x = -34 \cdot 145q$$

da cui ricaviamo $x = -34q$. Dunque tutte le soluzioni di

$$145x + 34y = 0$$

devono essere della forma $(-34q, 145q)$ con $q \in \mathbb{Z}$. Il Teorema 1.2 ci permette a questo punto di concludere l'esercizio: le soluzioni di

$$145x + 34y = 0$$

sono tutte e sole le coppie $(-34q, 145q)$ al variare di $q \in \mathbb{Z}$ e l'insieme di tutte le soluzioni di

$$435x + 102y = 15$$

è

$$\{(-75 - 34q, 320 + 145q) \mid q \in \mathbb{Z}\}$$

3. Inverso di un numero modulo un intero positivo

Gli unici numeri interi che ammettono un inverso in \mathbb{Z} sono $+1$ e -1 . Quando si considera l'aritmetica modulo un intero positivo m , invece sarà naturale trovare vari numeri che ammettono un inverso. Naturalmente, in questo caso per dire che un numero è inverso di un altro non pretendiamo che il prodotto dei due numeri faccia 1, ma ci basta che faccia un qualunque numero *congruo* a 1:

DEFINIZIONE 3.1. Sia m un intero positivo. Un inverso di un intero a modulo m è un intero x tale che $ax \equiv 1 \pmod{m}$.

ESEMPIO 3.2. 2 è un inverso di 3 modulo 5 in quanto $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$.

ESEMPIO 3.3. Non ci sono inversi di 2 modulo 4.

DIMOSTRAZIONE. Dato un intero qualunque x , esso è congruo modulo 4 ad uno dei numeri 0, 1, 2 o 3. Visto che nessuno di questi è un inverso di 2 modulo 4 (verificalo!), neanche x lo è. \square

TEOREMA 3.4. *Un numero a ha un inverso modulo m se e solo se $MCD(a, m) = 1$.*

DIMOSTRAZIONE. Se $(a, m) = 1$ per il teorema di Bezout possiamo trovare u, v interi tali che $au + mv = 1$ con u, v interi. Abbiamo $au + mv \equiv au + 0 \equiv au \pmod{m}$. Quindi u è un inverso di a modulo m .

Viceversa supponendo che a abbia un inverso u modulo m , ovvero $au \equiv 1 \pmod{m}$, allora per definizione di congruenza esiste k tale che $au + mk = 1$. Questo implica (per il teorema 5.4) $MCD(a, m) = 1$. \square

Non sempre possiamo dividere in una congruenza. Ad esempio $2 \cdot 7 \equiv 2 \cdot 4 \pmod{6}$, ma $7 \not\equiv 4 \pmod{6}$. Tuttavia:

TEOREMA 3.5. *Se $ac \equiv bc \pmod{m}$ e $MCD(c, m) = 1$, allora $a \equiv b \pmod{m}$.*

DIMOSTRAZIONE. Dall'ipotesi $MCD(c, m) = 1$ segue che esiste un inverso u di c modulo m . Moltiplicando entrambi i termini della congruenza $ac \equiv bc \pmod{m}$ per u otteniamo $acu \equiv bcu \pmod{m}$. Siccome $cu \equiv 1 \pmod{m}$, possiamo cancellare cu dai due termini della congruenza ottenendo $a \equiv b \pmod{m}$. \square

Un caso particolare del teorema precedente si ha quando $m = p$ è un numero primo: in tal caso data $ac \equiv bc \pmod{p}$ possiamo sempre dividere per c a meno che c non sia un multiplo di p .

In generale, la divisione in una congruenza segue la seguente regola (per la dimostrazione vedere l'Esercizio 7.1):

$$a b_1 \equiv a b_2 \pmod{m} \iff b_1 \equiv b_2 \pmod{\frac{m}{\text{MCD}(a, m)}}$$

4. Metodo per risolvere le congruenze lineari in una incognita

PROBLEMA 4.1. Dati $a, b, m \in \mathbb{Z}$ con $m > 0$ vogliamo trovare $x \in \mathbb{Z}$ che risolve la congruenza lineare ad una incognita

$$ax \equiv b \pmod{m} \quad (1)$$

Possiamo innanzitutto fare le seguenti osservazioni:

OSSERVAZIONE 4.2. Se esiste un intero d che divide a e m ma non divide b , allora la congruenza (1) non ha soluzioni. In particolare se il massimo comun divisore $\text{MCD}(a, m)$ di a e m non divide b la congruenza non ha soluzioni.²

DIMOSTRAZIONE. Se (1) ha soluzioni esiste un intero \bar{x} e un intero k tali che $a\bar{x} = b + km$, ma supponendo che d divida a e c si vede subito che deve dividere anche b . \square

ESEMPIO 4.3. $6x \equiv 3 \pmod{4}$ non ha soluzioni perché 2 divide 6 e 4 ma non divide 3.

OSSERVAZIONE 4.4. Se esiste un intero e che è un inverso di a modulo m allora la congruenza (1) ha soluzioni e inoltre, conoscendo e , è facile trovarle tutte.

DIMOSTRAZIONE. Se e è un inverso di a modulo m allora per definizione abbiamo $ae \equiv 1 \pmod{m}$. Moltiplicando entrambi in membri della (1) per e , otteniamo la congruenza equivalente: $aex \equiv be \pmod{m}$ e visto che $ae \equiv 1 \pmod{m}$ possiamo semplificare ottenendo la congruenza equivalente

$$x \equiv be \pmod{m} \quad (2)$$

che ha come soluzioni tutti e soli gli interi x della forma $be + km$ al variare di k in \mathbb{Z} . \square

ESEMPIO 4.5. Ad esempio, visto che 2 è un inverso di 3 modulo 5, la congruenza $3x \equiv 4 \pmod{5}$ si semplifica in $x \equiv 2 \cdot 4 \pmod{5}$ e ha come soluzioni tutti e soli i valori di x della forma $8 + 5k$ al variare di k in \mathbb{Z} .

Potrebbe accadere che nessuna delle due precedenti osservazioni sia applicabile. Ad esempio consideriamo la congruenza $4x \equiv 8 \pmod{10}$. Tuttavia dopo opportune semplificazioni ci possiamo sempre ricondurre ad uno dei due casi visti sopra.

OSSERVAZIONE 4.6. Nel risolvere la (1) possiamo ricondurci al caso in cui $0 \leq a < m$ e $0 \leq b < m$ sostituendo a e b con il loro resti modulo m .

OSSERVAZIONE 4.7. Se esiste un intero $d > 1$ che divide tutti e tre i numeri a, b, m allora possiamo rimpiazzare a, b, m con $a' = a/d, b' = b/d, m' = m/d$ ottenendo la congruenza equivalente (dimostratelo)

$$a'x \equiv b' \pmod{m'} \quad (*)$$

che coinvolge numeri più piccoli.

²Vedremo in seguito che se invece $\text{MCD}(a, m)$ divide b allora la congruenza ha soluzioni.

Ora supponendo di aver diviso per il valore di d più grande possibile, ci riconduciamo al caso in cui nella (*) non vi siano altre semplificazioni possibili, ovvero non vi siano altri fattori positivi che dividono tutti e tre i numeri a', b', m' .

Possiamo ora dimostrare il seguente teorema, la cui dimostrazione fornisce anche un algoritmo per trovare tutte le soluzioni quando esistono.

TEOREMA 4.8. *La congruenza*

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

ha soluzione se e solo se il massimo comun divisore tra a e b divide m . In questo caso l'equazione ha infinite soluzioni, precisamente $MCD(a, m)$ soluzioni modulo m .

OSSERVAZIONE 4.9. Quando diciamo "l'equazione ha $MCD(a, m)$ soluzioni modulo m " intendiamo dire l'insieme delle soluzioni dell'equazione è composto da esattamente $MCD(a, m)$ soluzioni \bar{x} che soddisfano $0 \leq \bar{x} < m$ e tutte le altre soluzioni sono i numeri che si ottengono da queste sommando loro un multiplo di m .

DIMOSTRAZIONE. Se $MCD(a, m)$ non divide b sappiamo già che la congruenza non ha soluzioni. Quindi consideriamo il caso in cui $MCD(a, m)$ divide b . In questo caso $MCD(a, m)$ è dunque anche il massimo fattore positivo comune a tutti e tre i numeri a, b, m ; dividendo per $MCD(a, m)$ otteniamo la congruenza equivalente (*). A questo punto osserviamo che, per costruzione, a' e m' sono coprimi e sappiamo che in questo caso a' ha un inverso e' modulo m' (si può applicare l'algoritmo di Bezout per ottenere due interi x', y' che risolvono l'equazione $1 = a'x' + m'y'$ e poi si prende $e' = x'$). Una volta trovato e' sappiamo che le soluzioni della (*), sono tutti e soli gli interi della forma $e'b' + km'$ al variare di k in \mathbb{Z} . Visto che $m' = \frac{m}{MCD(a, m)}$ ci sono esattamente $MCD(a, m)$ interi di questa forma in ogni sequenza di m numeri consecutivi. \square

ESERCIZIO 4.10. Data la congruenza

$$195x \equiv 6 \pmod{42}$$

trovare

- tutte le sue soluzioni,
- le sue soluzioni modulo 42, ossia quelle comprese fra 0 e 41.

SOLUZIONE: Osserviamo che $MCD(195, 42) = 3 \mid 6$ dunque la congruenza ha soluzione. Per prima cosa possiamo sostituire 195 con il suo resto modulo 42, ossia 27.

$$27x \equiv 6 \pmod{42}$$

Poi possiamo dividere membro di destra, membro di sinistra e modulo per $MCD(195, 42) = 3$, ottenendo l'equazione equivalente.

$$9x \equiv 2 \pmod{\left(\frac{42}{MCD(3, 42)} = 14\right)}$$

Un modo possibile di procedere adesso è il seguente: si nota a occhio che $3 \cdot 9 = 27$ è congruo a -1 modulo 14. Dunque ci conviene moltiplicare il membro di sinistra e quello di destra per 3. Visto che 3 è primo con 14, la regola per la divisione ci dice che l'equazione che otteniamo è equivalente (si vede subito infatti che si potrebbe tornare indietro dividendo per 3...).

$$27x \equiv 6 \pmod{14}$$

che si può riscrivere, moltiplicando per -1 (anch'esso primo con 14):

$$-x \equiv 6 \pmod{14}$$

$$x \equiv -6 \pmod{14}$$

Abbiamo dunque trovato tutte le soluzioni dell'equazione

$$195x \equiv 6 \pmod{42}$$

L'insieme delle soluzioni si può scrivere anche

$$\{x = -6 + 14q \mid q \in \mathbb{Z}\}$$

Per rispondere alla domanda b), dobbiamo indicare le soluzioni x con $0 \leq x \leq 41$. Sono tre: $-6 + 14$, $-6 + 2 \cdot 14$, $-6 + 3 \cdot 14$, cioè 8, 22 e 36. \square

5. Esempi di risoluzione di una equazione diofantea (usando le congruenze)

Facciamo qualche esempio che illustra la relazione fra le soluzioni di una equazione diofantea e quelle di una congruenza lineare associata. Consideriamo l'equazione

$$224x + 108y = 700$$

OSSERVAZIONE 5.1. Se esiste una soluzione (X, Y) , il numero intero X deve anche soddisfare

$$224X \equiv 700 \pmod{108}$$

(infatti $108Y = 700 - 224X$ dunque $108 \mid 224X - 700$). Viceversa, se un certo numero intero X soddisfa la congruenza, questo vuol dire che soddisfa $108 \mid 224X - 700$; allora deve esistere un Y tale che $108Y = 700 - 224X$ e dunque

$$224X + 108Y = 700$$

cioè la coppia (X, Y) risolve la diofantea.

In conclusione abbiamo osservato che l'insieme delle soluzioni della congruenza

$$224x \equiv 700 \pmod{108}$$

coincide con l'insieme dato dalle prime componenti ("le X ") delle coppie che risolvono la diofantea.

Risolviamo allora la congruenza

$$224x \equiv 700 \pmod{108}$$

Per prima cosa osserviamo che $MCD(224, 108) = 4 \mid 700$ dunque la congruenza ha soluzione (questa del resto è la stessa condizione che ci dice che la diofantea ha soluzione). Ora possiamo dividere per 4, per semplificare:

$$56x \equiv 175 \pmod{27} \quad \left(\frac{108}{MCD(108, 4)} = 27 \right)$$

Notiamo anche che $7 \mid 56$ e che $7 \mid 175$, dunque possiamo semplificare ulteriormente dividendo per 7:

$$8x \equiv 25 \pmod{27} \quad \left(\frac{27}{MCD(27, 7)} = 27 \right)$$

Questa si può risolvere "a occhio": infatti osserviamo che $8 \cdot 10 = 80$ è congruo a -1 modulo 27. Ora, 10 è primo con 27 dunque possiamo moltiplicare per 10 il membro di destra e

quello di sinistra senza cambiare l'insieme delle soluzioni. Otteniamo allora l'equazione equivalente:

$$80x \equiv 250 \quad (27)$$

che si riscrive come

$$-x \equiv 7 \quad (27)$$

$$x \equiv -7 \quad (27)$$

Dunque l'insieme delle soluzioni di

$$224x \equiv 700 \quad (108)$$

è

$$\{x = -7 + 27q \mid q \in \mathbb{Z}\}$$

Possiamo sostituire queste soluzioni al posto della x nella equazione diofantea

$$224x + 108y = 700$$

(che comunque per semplificare possiamo dividere per 4, ottenendo $56x + 27y = 175$):

$$56(-7 + 27q) + 27y = 175$$

Svolgiamo i conti:

$$27y = 392 + 175 - 56 \cdot 27q$$

$$27y = 567 - 56 \cdot 27q$$

$$y = 21 - 56q$$

Abbiamo dunque trovato che l'insieme delle soluzioni di

$$224x + 108y = 700$$

è:

$$\{(-7 + 27q, 21 - 56q) \mid q \in \mathbb{Z}\}$$

ESEMPIO 5.2. Trovare tutte le soluzioni intere x, y di

$$54 = 252x + 198y.$$

SOLUZIONE: Dividendo tutto per $18 = (252, 198)$ otteniamo il sistema equivalente:

$$3 = 14x + 11y$$

Risolviamo la congruenza

$$14x \equiv 3 \pmod{11}$$

Moltiplicando per 4 e semplificando otteniamo $12 \equiv x \pmod{11}$, quindi x è della forma $x = 12 + 11k$. Sostituendo nella $14x + 11y = 3$ e facendo i conti si trova $y = -15 - 14k$. \square

Osserviamo che nei due esempi di questo paragrafo abbiamo trovato in un colpo solo tutte le soluzioni della diofantea, senza dividere il problema nella ricerca di una soluzione particolare e poi di tutte le soluzioni della omogenea associata. Di volta in volta potrete scegliere il metodo di risoluzione che vi sembra più conveniente.

6. Sistemi di congruenze. Il teorema cinese del resto

Proviamo a risolvere un sistema di due congruenze lineari:

$$\begin{aligned} x &\equiv a & (m_1) \\ x &\equiv b & (m_2) \end{aligned}$$

Per prima cosa osserviamo che le soluzioni della prima equazione sono tutti e soli i numeri della forma

$$x = a + km_1 \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

Ci chiediamo quando un tale numero risolve anche la seconda equazione. Per saperlo sostituiamo $a + km_1$ alla x nella seconda equazione:

$$a + km_1 \equiv b \quad (m_2)$$

Qui la variabile è k e otteniamo

$$m_1k \equiv b - a \quad (m_2)$$

Questa equazione, come sappiamo, ha soluzione se e solo se $MCD(m_1, m_2) \mid (b - a)$. Dunque siamo già arrivati ad una prima conclusione: il sistema di partenza ha soluzione se e solo se $MCD(m_1, m_2) \mid (b - a)$.

Nel caso in cui ci siano soluzioni, come fare a trovarle tutte? Prendiamo una soluzione particolare k_0 della equazione

$$m_1k \equiv b - a \quad (m_2)$$

Allora $x_0 = a + k_0m_1$ è una soluzione del sistema di partenza ossia

$$\begin{aligned} x_0 &\equiv a & (m_1) \\ x_0 &\equiv b & (m_2) \end{aligned}$$

Come differisce da un'altra soluzione del sistema di partenza? Se anche x_1 soddisfa

$$\begin{aligned} x_1 &\equiv a & (m_1) \\ x_1 &\equiv b & (m_2) \end{aligned}$$

sottraendo opportunamente otteniamo

$$\begin{aligned} x_0 - x_1 &\equiv 0 & (m_1) \\ x_0 - x_1 &\equiv 0 & (m_2) \end{aligned}$$

Dunque $x_0 - x_1$ è un numero che deve essere multiplo di m_1 e anche di m_2 . Il più piccolo numero intero positivo che soddisfa tale condizione come sapete si chiama minimo comune multiplo di m_1 e di m_2 e si indica come $mcm(m_1, m_2)$.

Ricordiamo anche che tutti e soli i numeri che sono divisi da m_1 e da m_2 sono i multipli di $mcm(m_1, m_2)$. Infatti se t è diviso da m_1 e anche da m_2 , consideriamo la divisione euclidea di t per $mcm(m_1, m_2)$:

$$t = q \cdot mcm(m_1, m_2) + r$$

dove $0 \leq r < mcm(m_1, m_2)$. Ora, siccome m_1 e m_2 dividono t e $q \cdot mcm(m_1, m_2)$, entrambi devono anche dividere r . Allora r deve essere 0, altrimenti sarebbe un numero intero positivo diviso da m_1 e da m_2 ma più piccolo di $mcm(m_1, m_2)$ (assurdo).

In conclusione, tornando al nostro sistema, abbiamo dimostrato che due soluzioni x_0 e x_1 del sistema differiscono per un multiplo di $mcm(m_1, m_2)$. Viceversa si verifica subito che, data x_0 che soddisfa il sistema e dato un multiplo $s \cdot mcm(m_1, m_2)$ di $mcm(m_1, m_2)$, anche

$$x_0 + s \cdot mcm(m_1, m_2)$$

soddisfa il sistema.

Possiamo riassumere tutto quel che abbiamo detto fin qui nel seguente:

TEOREMA 6.1 (Teorema cinese del resto per due equazioni con moduli qualunque). *Dato il sistema di congruenze*

$$\begin{aligned} x &\equiv a && (m_1) \\ x &\equiv b && (m_2) \end{aligned}$$

tale sistema ammette soluzione se e solo se $MCD(m_1, m_2) \mid (b - a)$. In tal caso, presa una soluzione x_0 , tutte le altre soluzioni del sistema sono i numeri della forma

$$x_0 + s \cdot mcm(m_1, m_2) \quad \text{con } s \in \mathbb{Z}$$

OSSERVAZIONE 6.2. Ciò si può esprimere anche dicendo che tutte le soluzioni del sistema sono i numeri x che soddisfano

$$x \equiv x_0 \quad (mcm(m_1, m_2))$$

In particolare osserviamo che esiste un'unica soluzione x con $0 \leq x < mcm(m_1, m_2)$.

ESEMPIO 6.3. Si consideri il sistema:

$$\begin{aligned} 14x &\equiv 4570 && (30) \\ 45x &\equiv 231 && (8) \end{aligned}$$

Innanzitutto studiamo e risolviamo una per una le due equazioni: la prima ha soluzione perché $MCD(14, 30) = 2 \mid 4570$ e la possiamo riscrivere sostituendo a 4570 il suo resto modulo 30:

$$14x \equiv 10 \quad (30)$$

Dividendo per 2 otteniamo:

$$7x \equiv 5 \quad (15)$$

Se moltiplichiamo entrambi i membri per 2 non cambiamo le soluzioni perché 2 è primo con il modulo 15 e così arriviamo a

$$14x \equiv 10 \quad (15)$$

$$-x \equiv 10 \quad (15)$$

$$x \equiv -10 \quad (15)$$

$$x \equiv 5 \quad (15)$$

Per quel che riguarda la seconda equazione, notiamo subito che ha soluzione perché 45 e 8 sono primi fra loro. Sostituiamo ai numeri che compaiono i loro resti modulo 8:

$$5x \equiv 7 \quad (8)$$

Moltiplicando entrambi i membri per 3 otteniamo l'equazione equivalente

$$15x \equiv 21 \quad (8)$$

che risolviamo facilmente

$$-x \equiv 5 \quad (8)$$

$$x \equiv -5 \quad (8)$$

$$x \equiv 3 \quad (8)$$

Dunque il sistema dato si può riscrivere come

$$\begin{aligned} x &\equiv 5 & (15) \\ x &\equiv 3 & (8) \end{aligned}$$

Ora possiamo applicare il teorema: il sistema ammette soluzione perché $MCD(15, 8) = 1$ e dunque divide $5 - 3$.

A questo punto dobbiamo trovare una soluzione particolare. Ne esisterà una (e una sola) compresa fra 0 e 119 (infatti $120 = 15 \cdot 8$ è il $mcm(15, 8)$). A occhio vediamo subito che 35 fa al caso nostro. Dunque tutte le soluzioni del sistema sono i numeri della forma

$$35 + 120s \quad \text{con } s \in \mathbb{Z}$$

OSSERVAZIONE 6.4. Se non avessimo “visto” subito il 35 avremmo comunque potuto seguire il metodo standard: la prima equazione ci dice che x deve essere del tipo $x = 5 + 15k$. Sostituendo nella seconda abbiamo

$$5 + 15k \equiv 3 \quad (8)$$

ossia

$$15k \equiv -2 \quad (8)$$

$$-k \equiv -2 \quad (8)$$

$$k \equiv 2 \quad (8)$$

Allora $x = 5 + 15 \cdot 2 = 35$ è una soluzione particolare..e abbiamo “ritrovato” il 35.

Riscriviamo ora il teorema nel caso particolare in cui i moduli delle due equazioni siano primi fra loro, come premessa per poi enunciare il teorema cinese del resto nella sua forma classica.

TEOREMA 6.5 (Teorema cinese del resto per due equazioni con moduli primi fra loro). *Dato il sistema di congruenze*

$$\begin{aligned} x &\equiv a & (m_1) \\ x &\equiv b & (m_2) \end{aligned}$$

con $MCD(m_1, m_2) = 1$, tale sistema ammette sempre soluzione ed esiste un'unica soluzione x_0 tale che $0 \leq x_0 < m_1 \cdot m_2$. Tutte le altre soluzioni del sistema sono i numeri della forma

$$x_0 + q \cdot m_1 \cdot m_2 \quad \text{con } q \in \mathbb{Z}$$

La dimostrazione che abbiamo dato si generalizza facilmente al caso di sistemi di n congruenze in cui i moduli siano a due a due coprimi:

TEOREMA 6.6 (Teorema cinese del resto, forma classica). *Dato il sistema di congruenze*

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 & (m_1) \\ x &\equiv a_2 & (m_2) \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{n-1} &\equiv a_{n-1} & (m_{n-1}) \\ x_n &\equiv a_n & (m_n) \end{aligned}$$

in cui i moduli sono a due a due coprimi (questo vuol dire che per ogni $i \neq j$ vale $MCD(m_i, m_j) = 1$), tale sistema ammette sempre soluzione ed esiste un'unica soluzione x_0 tale che $0 \leq x_0 < m_1 \cdot m_2 \cdots m_{n-1} \cdot m_n$. Tutte le altre soluzioni del sistema sono i numeri della forma

$$x_0 + q \cdot m_1 \cdot m_2 \cdots m_{n-1} \cdot m_n \quad \text{con } q \in \mathbb{Z}$$

ESERCIZIO 6.7. Dimostrare la forma classica del teorema cinese del resto. (Suggerimento: per induzione su n , il caso di sistemi con due congruenze lo abbiamo già studiato...).

7. Esercizi

ESERCIZIO 7.1. Dimostrare che, dato $m \in \mathbb{Z}^+$, per ogni $a \in \mathbb{Z} - \{0\}$, $b_1, b_2 \in \mathbb{Z}$ vale:

$$a b_1 \equiv a b_2 \pmod{m} \iff b_1 \equiv b_2 \pmod{\left(\frac{m}{MCD(a, m)}\right)}$$

OSSERVAZIONE 7.2. Quindi, se c'è un numero a che divide entrambi i membri di una congruenza per uno stesso numero a , si può "semplificare", a patto però di dividere anche il modulo m per $MCD(a, m)$. Ad esempio:

$$66 \equiv 42 \pmod{8} \iff 11 \equiv 7 \pmod{4}$$

dove abbiamo diviso il membro di sinistra e quello di destra per 6 e il modulo per $MCD(6, 8) = 2$. Se non avessimo diviso il modulo per 2 avremmo ottenuto

$$11 \equiv 7 \pmod{8}$$

che è falsa.

SOLUZIONE: Ricordiamo che stiamo considerando $a \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Supponiamo che

$$a b_1 \equiv a b_2 \pmod{m}$$

Allora per la definizione di congruenza vale che

$$m \mid ab_1 - ab_2$$

ossia esiste un $q \in \mathbb{Z}$ tale che

$$ab_1 - ab_2 = mq$$

Possiamo dividere per $MCD(a, m)$ e otteniamo

$$\frac{a}{MCD(a, m)}(b_1 - b_2) = \frac{m}{MCD(a, m)}q$$

Da questo, visto che $\frac{a}{MCD(a, m)}$ e $\frac{m}{MCD(a, m)}$ sono coprimi (ricordate il Corollario 5.5), segue, per il Teorema 5.6, che

$$\frac{m}{MCD(a, m)} \mid b_1 - b_2$$

ovvero che

$$b_1 \equiv b_2 \pmod{\left(\frac{m}{MCD(a, m)}\right)}$$

Supponiamo ora, viceversa, che sia vero

$$b_1 \equiv b_2 \pmod{\left(\frac{m}{MCD(a, m)}\right)}$$

Allora $\frac{m}{MCD(a, m)} \mid (b_1 - b_2)$, ossia esiste un $t \in \mathbb{Z}$ tale che

$$t \frac{m}{MCD(a, m)} = b_1 - b_2$$

da cui, moltiplicando per $MCD(a, m)$ otteniamo

$$tm = (b_1 - b_2)MCD(a, m)$$

Osserviamo dunque che

$$m \mid (b_1 - b_2)MCD(a, m)$$

da cui a maggior ragione ricaviamo

$$m \mid (b_1 - b_2)a$$

(abbiamo usato il fatto che $MCD(a, m) \mid a$) che si riscrive come

$$a b_1 \equiv a b_2 \pmod{m}$$

□

ESERCIZIO 7.3. Trovare tutte le soluzioni intere dell'equazione

$$341x \equiv 15 \pmod{912}$$

SOLUZIONE: Calcoliamo $MCD(341, 912)$:

$$912 = 341 \cdot 2 + 230$$

$$341 = 230 + 111$$

$$230 = 111 \cdot 2 + 8$$

$$111 = 8 \cdot 13 + 7$$

$$8 = 7 + 1$$

$$7 = 1 \cdot 7 + 0$$

Dunque $MCD(341, 912) = 1 \mid 15$ e la congruenza ha soluzione.

Se troviamo una coppia (X, Y) che risolve l'equazione diofantea

$$341X + 912Y = 15$$

allora la X sarà una soluzione particolare della nostra congruenza. Per il teorema sulla soluzione delle congruenze lineari sappiamo che tutte le soluzioni della congruenza si ottengono sommando a X i multipli di 912.

Cerchiamo dunque una soluzione particolare della diofantea. Scriviamo i resti dell'algoritmo di Euclide:

$$230 = 912 - 341 \cdot 2$$

$$111 = 341 - 230$$

$$8 = 230 - 111 \cdot 2$$

$$7 = 111 - 8 \cdot 13$$

$$1 = 8 - 7$$

Ora, sostituendo i resti uno dopo l'altro, possiamo trovare una combinazione di Bezout:

$$1 = 341m + 912n$$

poi $15m = X$ sarà la soluzione particolare che stiamo cercando. Dunque in realtà di questa combinazione di Bezout a noi interessa solo la m che dovrà poi (moltiplicata per 15) comparire in una congruenza modulo 912. Per questo possiamo semplificare i conti riducendo i nostri passaggi modulo 912, ottenendo alla fine

$$1 \equiv 341m \pmod{912}$$

Ecco qui:

$$\begin{aligned} 1 &= 8 - 7 = 8 - (111 - 8 \cdot 13) = -111 + 14 \cdot 8 = -111 + (230 - 111 \cdot 2)14 = \\ &= -29 \cdot 111 + 14 \cdot 230 = -29(341 - 230) + 14 \cdot 230 = 43 \cdot 230 - 29 \cdot 341 = \\ &= 43(912 - 341 \cdot 2) - 29 \cdot 341 \equiv \end{aligned}$$

(da questo punto in poi semplifichiamo passando alle congruenze modulo 912)

$$\equiv -86 \cdot 341 - 29 \cdot 341 \equiv -115 \cdot 341 \pmod{912}$$

Dunque

$$1 \equiv -115 \cdot 341 \pmod{912}$$

da cui, moltiplicando per 15 otteniamo

$$15 \equiv -115 \cdot 15 \cdot 341 \pmod{912}$$

e deduciamo che $-115 \cdot 15$ è una soluzione particolare di

$$341x \equiv 15 \pmod{912}$$

L'insieme di tutte le soluzioni è allora dato da

$$x \equiv -115 \cdot 15 \equiv -1725 \equiv 99 \pmod{912}$$

che si può scrivere anche come

$$\{99 + 912q \mid q \in \mathbb{Z}\}$$

□

ESERCIZIO 7.4. Risolvere l'equazione diofantea

$$40x + 252y = 44$$

Esistono soluzioni (x, y) con $x \equiv 0 \pmod{7}$? E con $x \equiv 0 \pmod{13}$?

SOLUZIONE: Innanzitutto notiamo che tutti i numeri che compaiono nella equazione sono divisibili per 4. Ci conviene dunque dividere per 4 e studiare l'equazione equivalente:

$$10x + 63y = 11$$

Questa ammette soluzione, visto che 10 e 63 sono primi fra loro e dunque $MCD(10, 63) \mid 11$.

A questo punto, per trovare le soluzioni, sono possibili varie strade. Ne mostriamo una, risolvendo l'equazione lineare con le congruenze:

$$63y \equiv 11 \pmod{10}$$

Questa, visto che stiamo lavorando modulo 10, si può riscrivere come:

$$3y \equiv 1 \pmod{10}$$

Si nota subito che ha la soluzione $y = -3$. Sappiamo poi, per il Teorema 4.8 che tutte le soluzioni sono gli interi della forma $y = -3 + 10k$ al variare di $k \in \mathbb{Z}$.

A fini puramente didattici, presentiamo in un altro modo l'ultimo passaggio, a partire da

$$3y \equiv 1 \quad (10)$$

Moltiplichiamo per 7 entrambi i membri della equazione (questo produce una equazione equivalente visto che 7 è primo con 10) e otteniamo:

$$21y \equiv 7 \quad (10)$$

ossia

$$y \equiv 7 \quad (10)$$

Da qui "leggiamo" di nuovo lo stesso insieme di soluzioni, presentato nella forma $y = 7 + 10k$ al variare di $k \in \mathbb{Z}$.

Sostituendo $y = -3 + 10k$ nella equazione diofantea

$$10x + 63y = 11$$

troveremo il corrispondente valore della x e, al variare di $k \in \mathbb{Z}$, tutte le coppie (x, y) che risolvono il problema posto nel testo:

$$10x + 63(-3 + 10k) = 11$$

$$10x = 200 - 630k$$

$$x = 20 - 63k$$

Dunque l'insieme di tutte le soluzioni della equazione diofantea data è:

$$\{(20 - 63k, -3 + 10k) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Rispondiamo ora alle ultime due domande.

Possono esistere soluzioni (x, y) con $x \equiv 0 \pmod{7}$? In altre parole, ci chiediamo se per certi valori di $k \in \mathbb{Z}$ può essere vera la congruenza

$$20 - 63k \equiv 0 \pmod{7} \quad (7)$$

Ma, visto che stiamo lavorando modulo 7, e $-63k \equiv 0 \pmod{7}$ questo equivale a chiedersi se è vera

$$20 \equiv 0 \pmod{7} \quad (7)$$

e la risposta è NO.

Possono esistere soluzioni (x, y) con $x \equiv 0 \pmod{13}$? Stavolta consideriamo

$$20 - 63k \equiv 0 \pmod{13} \quad (13)$$

che si riscrive:

$$-63k \equiv -20 \pmod{13} \quad (13)$$

$$63k \equiv 20 \pmod{13} \quad (13)$$

$$11k \equiv 7 \pmod{13} \quad (13)$$

Questa la si può considerare come una equazione con le congruenze con k come variabile; visto che $MCD(11, 13) = 1$ divide 7 sappiamo che tale equazione ha soluzione. Dunque possiamo rispondere che SÌ, possono esistere soluzioni (x, y) con $x \equiv 0 \pmod{13}$.

Notiamo che l'esercizio non chiedeva di trovare le soluzioni, ma solo di dire se potevano esistere, motivando la risposta. Notiamo inoltre che a queste ultime due domande si poteva rispondere anche prima di calcolare le soluzioni della equazione diofantea. La prima domanda, per esempio, equivale infatti alla seguente: ponendo $x = 7m$, l'equazione diofantea

$$40 \cdot 7 m + 252y = 44$$

ha soluzione? Per rispondere basta controllare se il massimo comune divisore fra $40 \cdot 7 = 280$ e 252 divide o no 44 ... \square

ESERCIZIO 7.5. Trovare tutte le soluzioni $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ della equazione diofantea

$$4060x + 1953y = 49$$

È vero che per ogni soluzione $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ vale che $x - y$ è un multiplo di 3?

ESERCIZIO 7.6. Calcolare il MCD $(1573, 1144)$ e trovare tutti gli interi m, n che soddisfano

$$1573m + 1144n = 858$$

ESERCIZIO 7.7. Si determini l'insieme $A = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid 102x + 153y = 459\}$ Si determini la cardinalità dell'insieme $B = \{(x, y) \in A \mid |x| + |y| < 100\}$.

ESERCIZIO 7.8. Trovare tutte le soluzioni della congruenza

$$18x \equiv 1 \pmod{25}$$

Quante sono le soluzioni x con $-10 \leq x \leq 300$?

ESERCIZIO 7.9. a) Trovare tutti i numeri interi che risolvono l'equazione

$$70x \equiv 222 \pmod{24}$$

b) Trovare tutti i numeri interi che risolvono l'equazione

$$(x + 1)(x + 2) \equiv 0 \pmod{24}$$

ESERCIZIO 7.10. Trovare tutte le soluzioni della congruenza

$$12x \equiv 33 \pmod{57}$$

Quante sono le soluzioni x con $-10 \leq x \leq 10$?

ESERCIZIO 7.11. Trovare tutte le soluzioni della congruenza

$$1008x \equiv 12 \pmod{11}$$

ESERCIZIO 7.12. a) Trovare tutte le soluzioni della congruenza

$$546x \equiv 442 \pmod{260}$$

b) Trovare tutte le soluzioni della congruenza

$$7x \equiv -46 \pmod{58}$$

c) Trovare le soluzioni comuni alle due equazioni.

ESERCIZIO 7.13. Trovare tutte le soluzioni della congruenza

$$44x \equiv 10 \pmod{105}$$

ESERCIZIO 7.14. Trovare per quali $b \in \mathbb{Z}$ e $m \in \mathbb{Z}^+$ si può risolvere la congruenza

$$2x \equiv b \pmod{m}$$

ESERCIZIO 7.15. Trovare tutte le soluzioni della congruenza

$$420x \equiv 91 \pmod{119}$$

Quante sono le soluzioni x con $-10 \leq x \leq 300$?

ESERCIZIO 7.16. Trovare tutte le soluzioni della congruenza $42x \equiv 6 \pmod{110}$ e stabilire il numero delle soluzioni nell'intervallo $[-1000, 2000]$.

ESERCIZIO 7.17. Trovare tutte le soluzioni della congruenza $9x \equiv 3^{15} \pmod{17}$.

ESERCIZIO 7.18. Determinare per quali valori del parametro k la congruenza

$$-6x \equiv 20 \pmod{7k}$$

ha soluzione e risolverla per $k = 8$.

ESERCIZIO 7.19. a) Calcolare $\gcd(3192, 117)$.

b) Trovare tutti gli $m \in \mathbb{Z}$ che soddisfano

$$3192m \equiv 288 \pmod{117}$$

e tali che $0 \leq m \leq 234$.

ESERCIZIO 7.20. Dire se le seguenti proposizioni sono vere o false e motivare la risposta:

- per tutti i numeri naturali positivi n , $7^n \equiv n^3 + 3n^2 + 2n + 1 \pmod{5}$.
- Per tutti i numeri naturali positivi n , $7^n \equiv n^3 + 3n^2 + 2n + 1 \pmod{3}$.
- Per tutti i numeri naturali positivi n , $7^n \geq n^3 + 3n^2 + 2n + 1$.

ESERCIZIO 7.21. a) Trovare tutti gli interi x che soddisfano la congruenza:

$$1386x \equiv 1890 \pmod{294}$$

b) Trovare tutti gli interi y che soddisfano la congruenza:

$$1386y^2 \equiv 1890 \pmod{294}$$

c) Facoltativo/sfida: Indicare tutti gli n (se esistono) tali che l'equazione

$$1386y^n \equiv 1890 \pmod{294}$$

non ammette soluzione.

ESERCIZIO 7.22. a) Risolvere la congruenza

$$396x \equiv 234 \pmod{1050}$$

b) Per quali valori dell'intero k la congruenza

$$396x \equiv 234 \pmod{105 \cdot k}$$

ha soluzione?

ESERCIZIO 7.23. a) Risolvere la congruenza

$$5920x \equiv 160 \pmod{504}$$

b) Per quali valori del numero intero positivo m la congruenza

$$5920x \equiv 160 \pmod{56m}$$

ammette soluzione ?

ESERCIZIO 7.24. a) Trovare l'insieme $S_1 \subseteq \mathbb{Z}$ delle soluzioni della congruenza lineare:

$$3315x \equiv 816 \pmod{952}$$

b) Trovare l'insieme $S_2 \subseteq \mathbb{Z}$ delle soluzioni della congruenza lineare:

$$126x \equiv 42 \pmod{77}$$

c) Descrivere $S_1 \cap S_2$

ESERCIZIO 7.25. Trovare tutte le soluzioni di

$$x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{65}$$

ESERCIZIO 7.26. Dimostrare che, per ogni numero primo p esiste un numero naturale n tale che

$$6n^2 + 5n + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

Classi di resto e anelli quoziente

1. Le classi di resto modulo un intero positivo. Struttura additiva e moltiplicativa.

Cominciamo con un esempio. Consideriamo i possibili resti della divisione euclidea di un numero intero per 10. Abbiamo 10 possibilità: resto uguale a $0, 1, 2, 3, \dots, 9$. Quali sono i numeri che danno resto 1? È facile elencarli: $1, 11, 21, 31, \dots, -9, -19, -29, -39, -49, \dots$. Chiamiamo $[1]_{10}$ l'insieme costituito da questi numeri:

$$[1]_{10} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 1 \pmod{10}\}$$

Analogamente, chiamiamo $[2]_{10}$ l'insieme dei numeri interi la cui divisione per 10 dà resto 2, e in generale, per $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$, chiamiamo $[i]_{10}$ l'insieme dei numeri interi la cui divisione per 10 dà resto i .

Esercizio rapido di verifica. Chi è $[0]_{10}$? È l'insieme i cui elementi sono tutti i numeri interi divisibili per 10.

Gli insiemi $[0]_{10}, [1]_{10}, [2]_{10}, \dots, [9]_{10}$ si chiamano “classi di resto modulo 10”; la loro unione è uguale a tutto \mathbb{Z} giacché ogni numero intero appartiene ad una (e ad una sola) delle classi. Chiamiamo ora \mathbb{Z}_{10} l'insieme i cui elementi sono tutte le classi di resto modulo 10:

$$\mathbb{Z}_{10} = \{[0]_{10}, [1]_{10}, \dots, [9]_{10}\}$$

Possiamo “arricchire” questo insieme definendo due operazioni, una somma e una moltiplicazione.

Prima estendiamo la nostra notazione: fin qui per esempio non abbiamo definito il simbolo $[11]_{10}$. Infatti abbiamo preso in considerazione solo simboli in cui fra le parentesi quadre c'è un resto $0, 1, \dots, 9$ di una divisione euclidea per 10. Decidiamo di accettare anche $[11]_{10}$ intendendo che $[11]_{10} = [1]_{10}$. E anche, per esempio, $[127]_{10} = [7]_{10}$. Insomma ci mettiamo d'accordo di poter indicare una classe di resto $[i]_{10}$ anche col simbolo $[s]_{10}$ dove s è un qualunque numero intero tale che

$$s \equiv i \pmod{10}$$

Ora siamo pronti a definire la somma e la moltiplicazione di elementi di \mathbb{Z}_{10} . Poniamo:

$$[a]_{10} \cdot [b]_{10} = [ab]_{10}$$

$$[a]_{10} + [b]_{10} = [a + b]_{10}$$

Per esempio:

$$[7]_{10} \cdot [5]_{10} = [35]_{10} = [5]_{10}$$

$$[6]_{10} + [8]_{10} = [14]_{10} = [4]_{10}$$

Insomma in \mathbb{Z}_{10} “sette” per “cinque” fa “cinque” e “sei” più “otto” fa “quattro”.

In realtà, per essere sicuri di aver definito una buona somma e una buona moltiplicazione, bisogna verificare che, se

$$\begin{aligned} [a]_{10} &= [a']_{10} \\ [b]_{10} &= [b']_{10} \end{aligned}$$

allora

$$\begin{aligned} [a]_{10} \cdot [b]_{10} &= [a']_{10} \cdot [b']_{10} \\ [a]_{10} + [b]_{10} &= [a']_{10} + [b']_{10} \end{aligned}$$

insomma che queste operazioni non dipendono dai numeri a e b ma dalle loro classi di resto.

ESERCIZIO 1.1. Fate questa verifica. (Suggerimento: visto che $[a]_{10} = [a']_{10}$ allora sarà $a' = a + 10k$ e analogamente $b' = b + 10t$. Dunque per esempio, per quel che riguarda la moltiplicazione, vale $[a']_{10} \cdot [b']_{10} = [(a + 10k)(b + 10t)]_{10} = [ab + 10bk + 10at + 100kt]_{10} = [ab]_{10} = [a]_{10}[b]_{10}$.)

Con queste operazioni l'insieme \mathbb{Z}_{10} diventa un “anello commutativo con unità”. Daremo la definizione formale di anello più avanti, nel prossimo paragrafo. Per ora osserviamo che la somma e la moltiplicazione che abbiamo definito hanno molte delle buone proprietà a cui “siamo abituati” dalla moltiplicazione e dalla somma in \mathbb{Z} (proprietà commutativa e associativa di entrambe le operazioni, proprietà distributive, esistenza dell'elemento neutro per entrambe operazioni ($[0]_{10}$ per la somma e $[1]_{10}$ per la moltiplicazione), esistenza dell'opposto rispetto alla somma..).

C'è però una cosa nuova in \mathbb{Z}_{10} , rispetto a \mathbb{Z} . Vale infatti

$$[2]_{10} \cdot [5]_{10} = [10]_{10} = [0]_{10}$$

ossia il prodotto di due elementi diversi da $[0]_{10}$ ha come risultato $[0]_{10}$ (mentre in \mathbb{Z} il prodotto di due interi diversi da zero è sempre diverso da 0...). Si dice a questo proposito che $[2]_{10}$ e $[5]_{10}$ sono due “divisori dello zero” in \mathbb{Z}_{10} .

Passiamo al caso generale. Sia m un numero intero positivo. Per ogni $i = 0, 1, 2, \dots, m - 1$ chiamiamo $[i]_m$ la “classe di resto di i modulo m ”, ossia l'insieme dei numeri che danno resto i quando si considera la loro divisione euclidea per m :

$$[i]_m = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv i \pmod{m}\}$$

Come nell'esempio in cui $m = 10$, osserviamo che l'unione di tutte le classi di resto modulo m dà tutto \mathbb{Z} .

Chiamiamo \mathbb{Z}_m l'insieme di tutte le classi di resto modulo m :

$$\mathbb{Z}_m = \{[0]_m, [1]_m, \dots, [m - 1]_m\}$$

Si tratta dunque un insieme di cardinalità m .

Come sopra adottiamo la convenzione per cui possiamo indicare la classe $[i]_m$ anche col simbolo $[s]_m$ dove s è un qualunque numero intero tale che

$$s \equiv i \pmod{m}$$

Per esempio, con $m = 37$:

$$[5]_{37} = [42]_{37} = [412]_{37}$$

Possiamo allora definire la somma e la moltiplicazione di elementi di \mathbb{Z}_m :

$$[a]_m \cdot [b]_m = [ab]_m$$

$$[a]_m + [b]_m = [a + b]_m$$

Anche questa volta si verifica (fate di nuovo l'esercizio !) che queste operazioni sono ben definite e che non dipendono dai numeri a e b ma solo delle loro classi di resto, e \mathbb{Z}_m risulta (vedi il prossimo paragrafo) un "anello commutativo con unità".

2. Anelli

DEFINIZIONE 2.1. Un anello (non banale, con identità) R è un insieme che possiede due elementi speciali diversi fra loro (0 e 1) e dove sono definite due operazioni, che chiamiamo addizione (+) e moltiplicazione (\cdot), che soddisfano le seguenti proprietà:

- $\forall a, b, c \in R$ vale $(a + b) + c = a + (b + c)$ (proprietà associativa dell'addizione).
- $\forall a, b \in R$ vale $a + b = b + a$ (proprietà commutativa dell'addizione).
- $\forall a \in R$ vale $a + 0 = a$ (0 è l'elemento identico per l'addizione).
- $\forall a \in R$ esiste un elemento " $-a$ " in R tale che $a + (-a) = 0$ (esistenza dell'opposto per l'addizione).
- $\forall a, b, c \in R$ vale $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (proprietà associativa della moltiplicazione).
- $\forall a \in R$ vale $a \cdot 1 = a$ (1 è l'elemento identico per la moltiplicazione).
- $\forall a, b, c \in R$ vale $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ e anche $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (proprietà distributive).

OSSERVAZIONE 2.2. Importante: la definizione data sopra, per "colpa" della richiesta $0 \neq 1$, non include l'anello "banale" $A = \{0\}$, in cui tutte le operazioni sono banali e dunque lo 0 funziona da elemento identico sia per la somma che per la moltiplicazione. Noi vogliamo considerare A come un anello con identità e dunque lo aggiungiamo a quelli (non banali) che risultano dalla definizione.

DEFINIZIONE 2.3. Un anello (con identità) R che soddisfa anche la seguente proprietà si dice "commutativo":

- $\forall a, b \in R$ vale $a \cdot b = b \cdot a$ (proprietà commutativa della moltiplicazione).

DEFINIZIONE 2.4. Un anello (con identità) R che soddisfa anche la seguente proprietà si dice "privo di divisori di 0":

- $\forall a, b \in R$ vale che $a \cdot b = 0$ implica $a = 0$ o $b = 0$.

DEFINIZIONE 2.5. Un elemento u di un anello con identità R si dice una "unità" o "invertibile" se esiste un $v \in R$ tale che $u \cdot v = v \cdot u = 1$ (cioè se esiste un inverso sinistro e destro di u rispetto alla moltiplicazione).

DEFINIZIONE 2.6. Un anello non banale, con identità, commutativo, che soddisfa anche la seguente proprietà è detto "campo":

- ogni $a \in R - \{0\}$ è invertibile (esistenza dell'inverso rispetto alla moltiplicazione per tutti gli elementi diversi da 0).

ESERCIZIO 2.7. Dimostrare che un campo è anche automaticamente “privo di divisori dello 0”.

ESEMPIO 2.8. Sono esempi di anelli commutativi con unità \mathbb{Z} , \mathbb{Q} , \mathbb{R} , \mathbb{Z}_m per ogni $m > 1$. Studiando l'algebra lineare vedrete esempi di anelli non commutativi.

Gli anelli \mathbb{Q} ed \mathbb{R} sono anche dei campi mentre \mathbb{Z} non è un campo (non esiste in \mathbb{Z} l'inverso rispetto alla moltiplicazione degli elementi diversi da 1 e -1, per esempio non esiste l'inverso di 8).

Per quel che riguarda gli anelli \mathbb{Z}_m abbiamo visto che \mathbb{Z}_{10} ha divisori dello zero. Analogamente, se il numero m non è primo, \mathbb{Z}_m ha dei divisori dello zero. Infatti in tal caso m si fattorizza come $m = k \cdot s$ con $1 < k < m$ e $1 < s < m$ e vale che

$$[k]_m[s]_m = [ks]_m = [m]_m = [0]_m$$

Dunque, se m non è primo, \mathbb{Z}_m non è un campo (potete dedurlo dall'esercizio precedente oppure direttamente -facile esercizio- mostrando che non può esistere l'inverso degli elementi $[k]_m$ e $[s]_m \dots$). Vale invece il seguente importante:

TEOREMA 2.9. *Se p è un numero primo, \mathbb{Z}_p è un campo.*

DIMOSTRAZIONE. Se prendiamo una classe $[a]_p \neq [0]_p$ in \mathbb{Z}_p , deve valere che $MCD(a, p) = 1$. Allora la congruenza $ax \equiv 1 \pmod{p}$ ha soluzione, dunque esiste $b \in \mathbb{Z}$ tale che $ab \equiv 1 \pmod{p}$. Come conseguenza in \mathbb{Z}_p vale $[a]_p[b]_p = [ab]_p = [1]_p$. Abbiamo allora dimostrato che $[a]_p$ è invertibile in \mathbb{Z}_p e che $[b]_p$ è il suo inverso. □

3. Il piccolo teorema di Fermat

Daremo in questa sezione due dimostrazioni, entrambe belle e istruttive, del piccolo teorema di Fermat.

TEOREMA 3.1 (Il piccolo teorema di Fermat). *Se p è un numero primo e a è un numero intero che non è un multiplo di p , allora vale*

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

OSSERVAZIONE 3.2. Sia $p = 7$. Il teorema ci garantisce che per ogni $a \in \mathbb{Z}$ che non sia multiplo di 7 vale:

$$a^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Avvertiamo subito che può accadere che 6 non sia il più piccolo numero t tale che

$$a^t \equiv 1 \pmod{7}.$$

Per esempio per $a = 2$ troviamo:

$$2^3 \equiv 1 \pmod{7}$$

Invece per $a = 3$ la più piccola potenza che dà un risultato congruo a 1 modulo 7 è effettivamente 6. Infatti le potenze di 3 modulo 7 sono le seguenti:

$$3, 3^2 \equiv 2, 3^3 \equiv 6, 3^4 \equiv 4, 3^5 \equiv 5, 3^6 \equiv 1$$

Vedi per questo anche l'Osservazione 3.4 nel prossimo capitolo.

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo l'anello \mathbb{Z}_p delle classi di resto modulo p :

$$\mathbb{Z}_p = \{[0], [1], \dots, [p-1]\}$$

Vista la scelta di a , sappiamo che $[a] \neq [0]$. Moltiplichiamo ora tutti gli elementi di \mathbb{Z}_p per $[a]$:

$$[a][0], [a][1], \dots, [a][p-1]$$

Questi p elementi sono tutti diversi fra loro? Se la risposta è sì, allora sappiamo che sono esattamente tutti gli elementi di \mathbb{Z}_p , che ha proprio cardinalità p .

Verifichiamo dunque che sono tutti diversi fra loro: supponiamo, per assurdo, che esistano i e j ($0 \leq i < j \leq p-1$) con $[i] \neq [j]$ ma tali che $[a][i] = [a][j]$.

Ora sappiamo (per il Teorema 2.9) che \mathbb{Z}_p è un campo, dato che p è primo. Sia dunque $[b]$ l'inverso di $[a]$. Moltiplicando per $[b]$ otteniamo:

$$[b][a][i] = [b][a][j]$$

Siccome $[b][a] = [1]$ (stiamo utilizzando anche la proprietà associativa) allora abbiamo

$$[i] = [j]$$

Poiché però avevamo supposto $[i] \neq [j]$ abbiamo trovato un assurdo.

Dunque la lista

$$[a][0], [a][1], \dots, [a][p-1]$$

comprende esattamente tutti gli elementi di \mathbb{Z}_p . Allora se facciamo il prodotto degli elementi di questa lista, eccetto $[a][0] = [0]$, deve valere:

$$[a][1] \cdots [a][p-1] = [1][2][3] \cdots [p-1]$$

visto che nel membro di sinistra e in quello di destra abbiamo gli stessi elementi (che compaiono magari in un ordine diverso). Innanzitutto, per la proprietà commutativa, possiamo riscrivere questa uguaglianza nella forma:

$$[a]^{p-1}[1] \cdots [p-2][p-1] = [1][2][3] \cdots [p-2][p-1]$$

Ci ricordiamo ora che $[p-1]$ è invertibile in \mathbb{Z}_p (sempre perché \mathbb{Z}_p è un campo e $[p-1] \neq [0]$), e moltiplichiamo entrambi i membri per il suo inverso. Otteniamo

$$[a]^{p-1}[1] \cdots [p-2] = [1][2][3] \cdots [p-2]$$

Poi moltiplichiamo entrambi i membri per l'inverso di $[p-2]$, poi per l'inverso di $[p-3]$ e così via..

Alla fine troviamo

$$[a]^{p-1} = [1]$$

che si riscrive, in termini di congruenze

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Si tratta proprio dell'enunciato del piccolo teorema di Fermat. \square

Diamo adesso una diversa dimostrazione del piccolo teorema di Fermat dovuta ad Eulero.

DIMOSTRAZIONE. Per prima cosa dimostriamo che p divide $\binom{p}{i}$ quando $0 < i < p$. Infatti sappiamo che

$$\binom{p}{i} i! (p-i)! = p!$$

e, per il teorema di decomposizione unica in prodotto di fattori primi, p , che divide il membro di destra, deve dividere il membro di sinistra. Poiché p non può dividere $i! (p-i)!$ (che sono prodotti di numeri positivi strettamente minori di p) possiamo dedurre, per la proprietà caratterizzante dei numeri primi (ossia quella che dice che se p è primo e divide un prodotto ab allora p deve dividere a o p deve dividere b), che p deve dividere $\binom{p}{i}$.

A questo punto possiamo osservare che, dati due numeri interi a e b , lo sviluppo del binomio $(a+b)^p$ ha, modulo p , una scrittura molto semplificata. Infatti vale

$$(a+b)^p = \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} a^i b^{p-i} \equiv a^p + b^p \quad (p)$$

dato che, appunto, p divide tutti i coefficienti $\binom{p}{i}$ ($1 < i < p$).

In particolare, nel caso $b = 1$, abbiamo

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \quad (p)$$

Ora proviamo che, per ogni $a \in \mathbb{Z}$ vale

$$a^p \equiv a \quad (p)$$

Questa relazione, nel caso in cui a non è multiplo di p , ci dà (dividendo per a) l'enunciato del teorema.

Ci basta dimostrare che, per ogni $a \in \mathbb{N}$,

$$a^p \equiv a \quad (p)$$

(il caso dei numeri negativi si ricava poi immediatamente).

Lo dimostriamo per induzione su a .

Il caso base, per $a = 0$,

$$0^p \equiv 0 \quad (p)$$

è banale.

Supponiamo ora che questa relazione sia vera fino ad $a = n$ e proviamo a dimostrare che

$$(n+1)^p \equiv n+1 \quad (p)$$

(se ci riusciamo la nostra dimostrazione è terminata).

Ora, per quanto visto sopra possiamo scrivere che

$$(n+1)^p \equiv n^p + 1 \quad (p)$$

Ma, per ipotesi induttiva, $n^p \equiv n \quad (p)$ per cui

$$(n+1)^p \equiv n+1 \quad (p)$$

□

Mostriamo come esempi alcune applicazioni del piccolo teorema di Fermat.

ESEMPIO 3.3. Se vogliamo calcolare

$$15^{1443} \equiv ? \quad (17)$$

possiamo utilizzare il piccolo teorema di Fermat che ci dice che

$$15^{16} \equiv 1 \quad (17)$$

Ora $1443 = 16 \cdot 90 + 3$ dunque

$$15^{1443} \equiv (15^{16})^{90} 15^3 \equiv 1^{90} 15^3 \quad (17)$$

Ma $15 \equiv -2 \quad (17)$ dunque

$$15^{1443} \equiv (-2)^3 \equiv -8 \equiv 9 \quad (17)$$

ESEMPIO 3.4. Se p non è primo, l'enunciato del piccolo teorema di Fermat non vale più: non è vero, per esempio, che $2^5 \equiv 1 \quad (6)$. Infatti

$$2^5 = 32 \equiv 2 \quad (6)$$

Osserviamo che, nel corso della seconda dimostrazione del teorema abbiamo dimostrato un enunciato leggermente modificato, ossia una formula che vale anche per la classe $[0]$. Visto che la ritroviamo frequentemente nelle applicazioni, riproponiamo di nuovo qui questa formula sotto forma di corollario.

COROLLARIO 3.5. *Se p è un numero primo, per ogni numero intero a vale*

$$a^p \equiv a \quad (p)$$

Questo ci dà un criterio per decidere se un numero non è primo:

COROLLARIO 3.6. *Se $n > 1$ è un numero intero tale che per qualche numero intero a vale*

$$a^n \neq a \quad (n)$$

allora n non è primo.

DIMOSTRAZIONE. È vero perché si tratta della contronominale del corollario precedente! \square

È interessante capire se con questi ragionamenti si può trovare un criterio per dire con certezza se un numero è primo (non solo per dire se un numero NON è primo). Saremmo infatti tentati di pensare che se prendiamo un numero intero $n > 1$ e scopriamo che per tutti i numeri interi a vale

$$a^n \equiv a \quad (n)$$

allora n è primo. Questo non è vero: ci sono infiniti numeri che soddisfano questa proprietà ma non sono primi. Si chiamano “numeri di Carmichael” o “falsi primi”.

ESERCIZIO 3.7. Provate a dimostrare che 561 è un numero di Carmichael.

ESERCIZIO 3.8. Provate a dimostrare che 1729 è un numero di Carmichael.

4. Esercizi

ESERCIZIO 4.1. a) Trovare il numero naturale m tale che $0 \leq m < 13$ e

$$[2^{(2^{10})}]_{13} = [m]_{13}$$

Suggerimento: usare il piccolo teorema di Fermat.

b) Trovare il numero naturale k tale che $0 \leq k < 3$ e

$$[(138139140141 \dots 999)^{1987} - 1]_3 = [k]_3$$

ESERCIZIO 4.2. Consideriamo la funzione $g : \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$ che è definita dalla seguente relazione:

$$\forall [a], [b] \in \mathbb{Z}_5, \quad g([a], [b]) = ([a - 3b], [a + 3b])$$

Dire se g è iniettiva, surgettiva, bigettiva.

ESERCIZIO 4.3. a) Trovare l'insieme delle soluzioni della congruenza lineare:

$$327x \equiv 416 \pmod{52}$$

b) Dire se la funzione $f : \mathbb{Z}_{52} \rightarrow \mathbb{Z}_{52}$ data da

$$f([x]) = [15x]$$

è iniettiva, surgettiva, bigettiva.

ESERCIZIO 4.4 (Teorema di Wilson). Dimostrare che, se p è primo, vale

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

Se invece m è un numero non primo, la congruenza

$$(m-1)! \equiv -1 \pmod{m}$$

è vera o falsa?

ESERCIZIO 4.5. Dimostrare che, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $17^{16^n} \equiv 4 \pmod{7}$.

ESERCIZIO 4.6. a) Quante sono tutte le possibili funzioni $f : \mathbb{Z}_{15} \rightarrow \mathbb{Z}_{20}$?

b) Quanti sono gli elementi invertibili di \mathbb{Z}_{15} ? E quelli invertibili di \mathbb{Z}_{20} ?

c) Quante sono le funzioni $g : \mathbb{Z}_{15} \rightarrow \mathbb{Z}_{20}$ che mandano elementi invertibili di \mathbb{Z}_{15} in elementi invertibili di \mathbb{Z}_{20} ?

d) Quante sono le funzioni iniettive $h : \mathbb{Z}_{15} \rightarrow \mathbb{Z}_{20}$ che mandano elementi invertibili di \mathbb{Z}_{15} in elementi invertibili di \mathbb{Z}_{20} ?

ESERCIZIO 4.7. Dimostrare che esiste un multiplo di 174 nella cui scrittura decimale appare solo la cifra 6.

[Traccia: $174 = 6 \cdot 29$. C'è un n tale che il numero $66666\dots66$ (il 6 compare n volte) sia divisibile per 174? Basta scoprire quando il numero $11111\dots11$ (l'1 compare n volte) è divisibile per 29. Ora, $11111\dots11 = 1 + 10 + 10^2 + \dots + 10^{n-1} = \frac{10^n - 1}{10 - 1} \dots$]

ESERCIZIO 4.8. Qual è l'ultima cifra del numero 3^{13452} scritto in base 10? E del numero 6^{245389} ?

ESERCIZIO 4.9. Dimostrare che, per ogni numero naturale n , $n(n^6 - 1)$ è divisibile per 42.

ESERCIZIO 4.10. Dimostrare che, per ogni intero positivo n , $2^{3n+3} - 7n - 8$ è divisibile per 49.

ESERCIZIO 4.11. Dimostrare che non esiste nessuna funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tale che, per ogni $n \in \mathbb{N}$

$$f(f(n)) = n + 2009$$

Esiste una simile funzione se nella formula precedente si sostituisce 2009 con 2008?

Gruppi e ordini

1. Il concetto di gruppo e di sottogruppo

Nal Paragrafo 3 del Capitolo 11 abbiamo incontrato il gruppo simmetrico. In quell'occasione abbiamo descritto le proprietà che un insieme dotato di una operazione deve possedere per essere un *gruppo*. Ripartiamo da qui, dando la definizione nel contesto più generale.

DEFINIZIONE 1.1. Un *gruppo* G è un insieme non vuoto dotato di una operazione \cdot che, ad ogni coppia di elementi $a, b \in G$ associa un elemento di G indicato con $a \cdot b$ e ha le seguenti proprietà:

- (1) dati $a, b, c \in G$ vale $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (proprietà associativa);
- (2) esiste un elemento $e \in G$ tale che $a \cdot e = e \cdot a = a$ per ogni $a \in G$ (esistenza dell'elemento neutro in G);
- (3) per ogni $a \in G$ esiste un elemento $a^{-1} \in G$ tale che $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ (esistenza degli inversi in G).

Un gruppo si dice commutativo se, per ogni $a, b \in G$ vale $a \cdot b = b \cdot a$. Un gruppo G si dice finito se G ha cardinalità finita.

ESEMPIO 1.2. Ricordiamo che la cardinalità di S_n è $n!$. Abbiamo anche osservato che, per $n \geq 3$, S_n non è commutativo. L'insieme Z considerato con l'operazione $+$ è un gruppo commutativo infinito, rispetto alla moltiplicazione, invece, non è un gruppo perché solo gli elementi 1 e -1 hanno un inverso. L'insieme \mathbb{N} non è un gruppo né quando con l'addizione né con la moltiplicazione. In generale, un anello A è un gruppo rispetto alla $+$; se è anche un campo (come \mathbb{Q} , \mathbb{R} , vedi Definizione 2.6) allora $A - \{0\}$ è un gruppo rispetto alla \cdot .

D'ora in avanti, quando parleremo di un gruppo, ometteremo, tutte le volte che sarà possibile farlo senza creare ambiguità, il simbolo \cdot per la moltiplicazione; scriveremo dunque ab invece di $a \cdot b$, $a^2 = aa$ invece di $a \cdot a$.

ESERCIZIO 1.3. Dimostrare che, se G è un gruppo, allora

- (1) C'è un solo elemento neutro.
- (2) Per ogni $a \in G$ c'è un unico inverso di a .
- (3) Per ogni $a \in G$ vale $(a^{-1})^{-1} = a$.
- (4) Per ogni $a, b \in G$ $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

Fra i sottoinsiemi di G rivestono un ruolo particolare quelli che, rispetto all'operazione \cdot , sono a loro volta dei gruppi:

DEFINIZIONE 1.4. Un *sottogruppo* H di un gruppo G è un sottoinsieme non vuoto di G che, rispetto all'operazione \cdot , è un gruppo.

ESERCIZIO 1.5. Dimostrare che un sottoinsieme non vuoto H di un gruppo G è un sottogruppo di G se e solo se valgono entrambe le seguenti proposizioni:

- (1) $a, b \in H \rightarrow ab \in H$
 (2) $a \in H \rightarrow a^{-1} \in H$

In realtà, se abbiamo un sottoinsieme non vuoto finito, per verificare se è un sottogruppo basta verificare che soddisfi la proposizione 1) dell'esercizio precedente.

PROPOSIZIONE 1.6. *Se H è un sottoinsieme finito non vuoto di un gruppo G e vale che $a, b \in H \rightarrow ab \in H$, allora H è un sottogruppo di G .*

DIMOSTRAZIONE. Sia $a \in H$, $a \neq e$. Bisogna dimostrare che a ha un inverso. Consideriamo gli elementi $a, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots$, che appartengono tutti ad H (per ipotesi il prodotto di due elementi di H appartiene ancora ad H). Visto che H è finito, questi elementi non potranno essere tutti distinti fra loro. Siano dunque i, j due numeri naturali positivi con $i > j$, tali che

$$a^i = a^j$$

Moltiplicando j volte per l'inverso di a entrambi i membri otteniamo

$$a^{i-j} = e$$

Notiamo che $i - j > 1$ altrimenti risulterebbe $a = e$. Possiamo dunque concludere che a^{i-j-1} è l'inverso di a .

□

ESEMPIO 1.7. Sia a un elemento di un gruppo G . Consideriamo il sottoinsieme di G

$$(a) = \{a^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$$

dove $a^0 = e$ e, se $i > 0$, $a^{-i} = (a^{-1})^i = (a^i)^{-1}$ (per esempio $a^{-2} = a^{-1}a^{-1} = (a^2)^{-1}$). Tale sottoinsieme è un sottogruppo di G e si chiama *sottogruppo ciclico generato da a* . I sottogruppi ciclici di \mathbb{Z} (con l'operazione $+$) sono, al variare di $m \in \mathbb{Z}$, i sottogruppi

$$(m) = \{km \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

DEFINIZIONE 1.8. Se, per qualche $a \in G$ vale $G = (a)$ allora G si dice *gruppo ciclico*.

2. Congruenza modulo un sottogruppo

DEFINIZIONE 2.1. Sia G un gruppo, H un sottogruppo di G . Dati $a, b \in G$ diciamo che a 'è congruo a b modulo H se $ab^{-1} \in H$. Scriveremo in tal caso

$$a \equiv b \pmod{H}$$

ESERCIZIO 2.2. Verificare che la relazione $a \equiv b \pmod{H}$ è una relazione di equivalenza.

OSSERVAZIONE 2.3. Consideriamo il sottogruppo (m) di \mathbb{Z} (con m intero positivo). Dati due numeri interi a e b vale che $a \equiv b \pmod{(m)}$ se e solo se $a - b \in (m)$ ¹. Questo si può tradurre dicendo che $a \equiv b \pmod{(m)}$ se e solo se $a - b$ è un multiplo di m . Abbiamo ritrovato così l'usuale nozione di congruenza modulo m .

Questa partizione di G in classi di equivalenza ha una importante conseguenza numerica nel caso in cui G sia finito:

¹Abbiamo scritto $a - b$ invece di ab^{-1} , visto che l'operazione di gruppo in questo caso è la somma $+$. Abbiamo dunque scelto di usare direttamente la *notazione additiva* invece di quella moltiplicativa.

TEOREMA 2.4 (Teorema di Lagrange). *Se G è un gruppo finito e H è un sottogruppo di G allora $|H|$ divide $|G|$.*

DIMOSTRAZIONE. Dimosteremo che le classi di equivalenza associate alla relazione $a \equiv b \pmod H$ hanno tutte la stessa cardinalità e che tale cardinalità è uguale a $|H|$. Se n_H è il numero di tali classi di equivalenza risulterà dunque:

$$n_H \cdot |H| = |G|$$

Osserviamo innanzitutto che, preso $x \in G$, nella sua classe di equivalenza ci sono tutti gli elementi dell'insieme Hx^2 :

$$Hx = \{hx \mid h \in H\}.$$

Infatti per ogni $h \in H$ vale $x \equiv hx \pmod H$ dato che $x(hx)^{-1} = xx^{-1}h^{-1} = h^{-1} \in H$. Ma possiamo dire di più: la classe di equivalenza di x coincide con Hx . Infatti, se $x \equiv y \pmod H$ questo significa che $xy^{-1} \in H$ ossia esiste un certo $h' \in H$ tale che $xy^{-1} = h'$. Da questa relazione ricaviamo che $y = (h')^{-1}x$ dunque $y \in Hx^3$.

Ma quanti elementi ci sono nell'insieme Hx ? Ce ne sono $|H|$, visto che gli elementi della forma hx ottenuti al variare di $h \in H$ sono tutti diversi fra loro (se vale $h_1x = h_2x$ allora moltiplicando a destra per x^{-1} otteniamo $h_1 = h_2$). \square

Segnaliamo subito un importante corollario.

DEFINIZIONE 2.5. L'*ordine* di un elemento x di un gruppo G è il più piccolo intero positivo n tale

$$x^n = e$$

Indicheremo questo numero col simbolo $o(x)$.

ESERCIZIO 2.6. Verificare che l'ordine dell'elemento $(1, 3, 4, 6)$ di S_7 è 4. Qual è l'ordine dell'elemento $(1, 3, 4, 6)(2, 5, 7)(8, 9) \in S_9$?

COROLLARIO 2.7. *In un gruppo finito G , per ogni elemento x , l'ordine $o(x)$ divide $|G|$.*

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo il sottogruppo ciclico $\langle x \rangle$ di G . I suoi elementi sono $x, x^2, \dots, x^{o(x)-1}, x^{o(x)} = e$ (se $x = e$ c'è solo un elemento). Tali elementi sono tutti distinti fra loro: se fosse $x^i = x^j$ con $1 \leq i < j \leq o(x)$ allora varrebbe $x^{j-i} = e$ ma questo non è possibile perché $j - i < o(x)$. Visto che la cardinalità di $\langle x \rangle$ è uguale a $o(x)$, per il Teorema di Lagrange vale dunque che $o(x)$ divide $|G|$. \square

OSSERVAZIONE 2.8. Se x è un elemento di un gruppo finito G vale

$$x^{|G|} = e.$$

Infatti per il corollario precedente possiamo scrivere $|G| = k \cdot o(x)$ per un certo intero k . Da questo segue che

$$x^{|G|} = x^{k \cdot o(x)} = (x^{o(x)})^k = e^k = e$$

²L'insieme Hx è una *classe laterale destra* di H in G .

³In particolare, la classe di equivalenze di e coincide con H .

3. L'ordine di un elemento. La funzione di Eulero.

Il Teorema di Lagrange e il Corollario 2.7 hanno una immediata applicazione aritmetica. Fissato un numero intero positivo m , consideriamo infatti l'anello \mathbb{Z}_m . È immediato verificare che gli elementi invertibili di \mathbb{Z}_m costituiscono un gruppo *rispetto alla moltiplicazione*. Tale gruppo viene indicato con la notazione \mathbb{Z}_m^* .

ESEMPIO 3.1. Se p è un numero primo, \mathbb{Z}_p^* ha $p - 1$ elementi, visto che è un campo e dunque tutte le classi (eccetto la $[0]$) sono invertibili.

Il gruppo \mathbb{Z}_{10}^* ha 4 elementi: $[1], [3], [7], [9]$.

Il gruppo \mathbb{Z}_{15}^* ha 8 elementi: $[1], [2], [4], [7], [8], [11], [13], [14]$.

DEFINIZIONE 3.2. La funzione ϕ di Eulero è la funzione $\phi : \mathbb{N}^{>0} \rightarrow \mathbb{N}^{>0}$ definita ponendo $\phi(1) = 1$ e, per $n > 1$,

$$\phi(n) = \text{numero degli interi positivi minori di } n \text{ e primi con } n$$

Dunque la cardinalità di \mathbb{Z}_m^* è uguale a $\phi(m)$. Questo ci permette già di enunciare un teorema che generalizza il piccolo Teorema di Fermat:

TEOREMA 3.3. Fissato un intero positivo m , se a è un intero primo con m vale:

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

DIMOSTRAZIONE. Visto che a ed m sono coprimi, sappiamo che $[a]$ appartiene a \mathbb{Z}_m^* . Per il Corollario 2.7 in \mathbb{Z}_m^* vale

$$[a]^{\phi(m)} = [1]$$

che equivale a

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

□

OSSERVAZIONE 3.4. Se $m = p$ è primo ritroviamo l'enunciato del piccolo Teorema di Fermat, visto che $\phi(p) = p - 1$. In questo caso vale anche che \mathbb{Z}_p^* è un gruppo ciclico, ossia esiste un elemento in \mathbb{Z}_p^* di ordine esattamente $p - 1$ (per la dimostrazione di questo importante risultato vedere [H] o [C]).

Alla luce di questo teorema, risulta importante saper calcolare in modo efficiente i valori della funzione ϕ che, al momento, è definita in maniera un po' implicita.

PROPOSIZIONE 3.5. Se b e c sono due numeri primi tra loro

$$\phi(bc) = \phi(b)\phi(c)$$

DIMOSTRAZIONE. Scriviamo i numeri da 1 a bc nel seguente modo:

1	2	3	4	...	b
$b + 1$	$b + 2$	$b + 3$	$b + 4$...	$2b$
$2b + 1$	$2b + 1$	$2b + 3$	$2b + 4$...	$3b$
$3b + 1$	$3b + 2$	$3b + 3$	$3b + 4$...	$4b$
$4b + 1$	$4b + 2$	$4b + 3$	$4b + 4$...	$5b$
...
$(c - 1)b + 1$	$(c - 1)b + 2$	cb

Fra questi cerchiamo i numeri primi con bc . Osserviamo subito che tali numeri devono stare su colonne che cominciano con un numero primo con b . Infatti i numeri che stanno su una stessa colonna appartengono tutti alla stessa classe di resto modulo b ; dunque, se il numero più in alto della colonna è primo con b lo saranno anche tutti gli altri, se non è primo con b , anche tutti gli altri non lo saranno e in particolare non saranno primi con bc .

Consideriamo allora una colonna che comincia col numero k primo con b . In tale colonna troviamo $k, k + b, k + 2b, \dots, k + (c - 1)b$. Questi c numeri coprono tutte le classi di resto modulo c . Se vale infatti

$$k + ib \equiv k + jb \pmod{c}$$

con $0 \leq i \leq j < c$, sottraendo $k + ib$ otteniamo

$$(j - i)b \equiv 0 \pmod{c}$$

che equivale, dividendo per b (che è primo con c), a

$$(j - i) \equiv 0 \pmod{c}$$

da cui $j = i$.

Nella colonna k -esima ci sono dunque esattamente $\phi(c)$ numeri primi con c . Poiché tali numeri sono tutti primi con b (per la scelta di k), sono anche primi con bc . In totale i numeri primi con bc sono dunque $\phi(c)$ per il numero delle colonne che cominciano con un numero primo con b , ossia $\phi(b)\phi(c)$. □

TRACCIA PER UNA SECONDA DIMOSTRAZIONE. I numeri primi con bc sono tutte e sole le soluzioni dei sistemi di congruenze

$$\begin{aligned} x &\equiv k && (b) \\ x &\equiv t && (c) \end{aligned}$$

dove k è primo con b e t è primo con c ... □

TEOREMA 3.6. Consideriamo un intero positivo m . Se $m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ è la sua decomposizione in fattori primi, allora

$$\phi(m) = (p_1^{a_1} - p_1^{a_1-1})(p_2^{a_2} - p_2^{a_2-1}) \dots (p_k^{a_k} - p_k^{a_k-1})$$

DIMOSTRAZIONE. Dalla Proposizione 3.5 segue subito che per calcolare $\phi(m)$ basta fare il prodotto dei numeri $\phi(p_i^{a_i})$. Ci resta dunque da sapere quanto vale $\phi(p^n)$ con p numero primo. Osserviamo che i numeri positivi minori di p^n sono tutti primi con p^n a meno che non siano multipli di p . Un semplice calcolo mostra dunque che $\phi(p^n) = p^n - p^{n-1}$. □

OSSERVAZIONE 3.7. In particolare, se p e q sono due distinti numeri primi, $\phi(p^2) = p^2 - p$, $\phi(pq) = (p - 1)(q - 1)$. Dunque, come avevamo osservato nell'Esempio 3.1, $\phi(10) = 4 \cdot 1 = 4$, $\phi(15) = 4 \cdot 2 = 8$.

ESEMPIO 3.8. Come applicazione immediata dei risultati precedenti possiamo calcolare subito la classe di resto di 3^{365} modulo 225.

Visto che $\phi(225) = (25 - 5)(9 - 3) = 120$, per il Teorema 3.3 sappiamo infatti che

$$3^{120} \equiv 1 \pmod{225}$$

Dunque

$$3^{365} \equiv (3^{120})^3 \cdot 3^5 \equiv 3^5 \equiv 243 \equiv 18 \pmod{225}$$

ESEMPIO 3.9. Il Teorema 3.3 ci dice che

$$2^8 \equiv 1 \pmod{15}$$

Osserviamo però che l'ordine di $[2]$ in \mathbb{Z}_{15}^* non è 8, ma 4. L'ordine di un elemento divide l'ordine del gruppo (Corollario 2.7): questo esempio mostra che non è detto che coincida con l'ordine del gruppo. Del resto, $[1]$ ha ordine 1 in ogni gruppo \mathbb{Z}_m^* , e, se $m > 1$, 1 è diverso da $\phi(m)$.

4. Esercizi

ESERCIZIO 4.1. Dimostrare che se la cardinalità di un gruppo è un numero primo, allora il gruppo è ciclico.

ESERCIZIO 4.2. Consideriamo il gruppo simmetrico S_{10} . Qual è l'ordine della permutazione $(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$? Qual è l'ordine della permutazione $(1, 3, 5, 6)(2, 4, 8)$? E quello della permutazione $(1, 2, 3, 4, 5, 6)(7, 8, 9, 10)$?

ESERCIZIO 4.3. Sia σ una permutazione in S_n che si può scrivere in forma ciclica usando c_1 cicli di lunghezza l_1 , c_2 cicli di lunghezza l_2 , ..., c_k cicli di lunghezza l_k . Qual è l'ordine di σ ?

ESERCIZIO 4.4. Sia p un numero primo. Dimostrare che se $[-1]$ è un quadrato in \mathbb{Z}_p allora p è congruo a 1 modulo 4.

ESERCIZIO 4.5. Dimostrare che esistono infiniti numeri primi congrui a 1 modulo 4.

SOLUZIONE: [Traccia della soluzione] Se fossero finiti, diciamo p_1, p_2, \dots, p_N , potremmo considerare il numero $4(p_1 p_2 \cdots p_N)^2 + 1$. \square

ESERCIZIO 4.6. Dimostrare che, preso un numero primo $p \equiv 1 \pmod{4}$ allora

$$\left(\left(\frac{p-1}{2} \right)! \right)^2 \equiv -1 \pmod{p}$$

ESERCIZIO 4.7. Quali sono gli elementi di ordine massimo in \mathbb{Z}_{13}^* ? E in \mathbb{Z}_{20}^* ?

ESERCIZIO 4.8. Dimostrare che, per ogni intero positivo n vale:

$$\phi(n) = \sum_{d|n} \phi(d)$$

ESERCIZIO 4.9. Sia \mathcal{F}_n l'ennesimo numero di Fermat (vedi Esercizio 1.4 del Capitolo 13)⁴. Dimostrare che, se q è un primo che divide \mathcal{F}_n , allora

$$q \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}$$

⁴Il risultato di questo esercizio può fornire una spiegazione di come mai Eulero ha scelto proprio il numero 641 per dimostrare che \mathcal{F}_5 non è primo.

Bibliografia

- [B-M] F. Bellissima, F. Montagna, *Matematica per l'informatica. Aritmetica e logica, probabilità, grafi*, Ed. Carocci, 2006.
- [C-R] R. Courant, H. Robbins, *Che cos'è la matematica*, Boringhieri, 1971.
- [C] L. Childs, *Algebra: un'introduzione concreta*, ETS, 1991.
- [DM-D] P. Di Martino, (con la revisione di R. Dvornicich), *Algebra*, Edizioni Plus, 2003.
- [E] P. J. Eccles, *An Introduction to Mathematical Reasoning*, Cambridge University Press, 1997.
- [G-M] M. Giaquinta, L. Modica, *Analisi Matematica*, tre volumi, Pitagora Editrice, 1999.
- [H] I.N. Herstein, *Algebra*, Editori Riuniti, 1988.
- [R] K. H. Rosen, *Discrete mathematics and its applications*, Mc Graw-Hill, 2003.