

Complementi di Analisi Matematica. Foglio di esercizi n.11
16/05/2017
(Aggiornamento del 22/5/2017)

Esercizi su serie di funzioni

Esercizio 1 Definita $g_k(x) = e^{-kx^2}$, provare che $g_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ converge puntualmente alla funzione

$$g(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \end{cases} .$$

Stabilire se g_k converge uniformemente a g su \mathbb{R} , su $(-\delta, \delta) \setminus \{0\}$ con $\delta > 0$ e su $\mathbb{R} \setminus [-\delta, \delta]$.

Esercizio 2 Consideriamo $f_k(x) = \frac{x^4}{k+x^2}$. Studiare la convergenza di f_k puntuale ed uniforme su \mathbb{R} e la convergenza uniforme sugli insiemi limitati.

Esercizio 3 Provare che $f_k(x) = \left(1 - \frac{x}{k^2}\right)^k$

1. converge puntualmente in \mathbb{R} alla funzione costante $g(x) = 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$,
2. converge uniformemente a g su ogni insieme limitato di \mathbb{R} ,
3. non converge uniformemente a g su \mathbb{R} .

Esercizio 4 Consideriamo la successione di funzioni

$$f_n(x) = e^{-n^\beta x^2} .$$

Al variare di $\beta > 0$ studiare

1. la convergenza puntuale e uniforme su \mathbb{R} ,
2. la convergenza uniforme e totale su $(0, \delta)$ e $(-\delta, 0)$ per $\delta > 0$,
3. la convergenza uniforme e totale su $(\delta, +\infty)$ e su $(-\infty, -\delta)$ per $\delta > 0$.

Esercizio 5 Consideriamo la successione di funzioni

$$f_n(x) = n^\alpha x e^{-n^\beta x^2} .$$

Al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\beta > 0$

1. determinare l'insieme $A \subset \mathbb{R}$ di convergenza puntuale e studiare la convergenza uniforme su A ,
2. stabilire se c'è convergenza uniforme e totale su $(-\delta, 0)$ e $(0, \delta)$ per $\delta > 0$,
3. studiare la convergenza uniforme e totale su $(\delta, +\infty)$ e $(-\infty, -\delta)$ per $\delta > 0$.

Esercizio 6 Consideriamo la successione di funzioni

$$f_n(x) = n \sin\left(\frac{x}{n}\right).$$

1. Determinare l'insieme $A \subset \mathbb{R}$ di convergenza puntuale.
2. Stabilire se f_n converge uniformemente sugli insiemi limitati contenuti in A
3. Stabilire se f_n converge uniformemente su A .

Esercizio 7 Determinare il più grande insieme $A \subset \mathbb{R}$ di convergenza puntuale per la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n^2} a_n x^n$, dove abbiamo definito

$$a_n = \begin{cases} 2/n & n \text{ pari} \\ 0 & n \text{ dispari} \end{cases}.$$

Studiare la convergenza uniforme e totale su A e su $A \cap (-1/2, 1/2)$.

Esercizio 8 Si consideri la serie di funzioni $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\arctan(kx)}{1+k^2-k^2 \sin x}$.

1. Determinare l'insieme più grande $A \subset \mathbb{R}$ dove la serie converge puntualmente.
2. Stabilire se la serie converge uniformemente su $\left(-\frac{5}{4}\pi, \frac{\pi}{4}\right)$.
3. Dato $\varepsilon \in (0, 2\pi)$ e definito $\left(-\frac{3\pi}{2} + \varepsilon, \frac{\pi}{2} - \varepsilon\right)$ studiare la convergenza puntuale e uniforme della serie su tale insieme.
4. Stabilire se la serie converge uniformemente su $(0, \pi/2)$ e studiare la convergenza uniforme su A , di cui al primo punto.

Esercizio 9 Si consideri la serie di funzioni

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\sin(kx) + kx + \frac{x^2}{k}}{k^3 + \log k}.$$

Determinare l'insieme di convergenza puntuale $A \subset \mathbb{R}$ e l'insieme di convergenza puntuale assoluta. Studiare su tali insiemi la convergenza uniforme e totale. Dato $B \subset [-\pi, \pi]$, stabilire se la serie converge uniformemente su B .

Esercizio 10 Determinare l'insieme $A \subset \mathbb{R}$ ove la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\cos(x)}{|x|^{\log(n)} + 1}$$

è ben definita e converge puntualmente. Studiare la convergenza uniforme e totale su A .

Esercizio 11 Scrivere l'insieme di convergenza puntuale $A \subset \mathbb{R}$ per la serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1+x)^n \operatorname{arctg}[(1+x)^n].$$

Determinare inoltre l'insieme di convergenza puntuale assoluta $B \subset \mathbb{R}$. Stabilire se la serie converge uniformemente e totalmente sia su A che su B . Determinare l'intervallo di derivabilità della serie di funzioni e se esiste, scriverne la derivata come nuova serie di funzioni.

Esercizio 12 Si consideri la serie di funzioni complessa

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n i^n z^n.$$

Scrivere l'insieme di convergenza puntuale $A \subset \mathbb{C}$ e l'insieme di convergenza puntuale assoluta $B \subset A$. Stabilire se la serie converge uniformemente e totalmente sugli insiemi A e B .

Esercizio 13 Stabilire se la serie di funzioni complesse

$$\sum_{k=0}^{\infty} (2+i)^k \sin\left(\frac{1}{n^3}\right) \frac{n!}{(2n)!} z^n$$

converge totalmente sui compatti di \mathbb{C} .

Esercizio 14 Determinare l'insieme di convergenza puntuale per la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n^2} n!}{7^n n^n} x^n$$

e stabilire se ivi si ha convergenza uniforme

Esercizio 15 Sia data la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n n^e (\sin x)^n$. Determinare l'insieme di convergenza puntuale e studiare la convergenza uniforme e totale su tale insieme.

Esercizio 16 Siano date rispettivamente le serie di potenze complessa e reale

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n^2}}{2^{4n} + 1} z^n \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n^2}}{3^{2n} + 1} x^n.$$

1. Determinare i raggi di convergenza delle due serie di potenze.
2. Determinare gli insiemi di convergenza puntuale e puntuale assoluta per le due serie.
3. Studiare la convergenza uniforme sugli insiemi definiti al punto precedente.

Esercizio 17 Data $\sum_{k=0}^{\infty} [5(-1)^k + 2]^k x^k$, si studi la convergenza puntuale, uniforme e totale su tutti i sottoinsiemi di \mathbb{R} .

Esercizio 18 Siano $\sum_{n=1}^{\infty} \left(2 - \frac{1}{n}\right) \frac{z^n}{n^4}$ serie di potenze complessa e $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \left(3 - \frac{1}{n}\right)^n x^n$ serie di potenze reale.

1. Determinare i raggi di convergenza di tali serie di potenze e i rispettivi insiemi di convergenza puntuale, rispettivamente in \mathbb{C} ed in \mathbb{R} .
2. Studiare la convergenza totale ed uniforme negli insiemi di convergenza puntuale individuati al punto precedente.

Esercizio 19 Sia data la serie di funzioni complesse $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{1+n^2}\right) \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{1}{z^{3n}}$. Determinare gli insiemi di convergenza puntuale e di convergenza puntuale assoluta.

Esercizio 20 Si consideri la serie di potenze $\sum_{k=0}^{\infty} [1 + (-1)^k (1+i)^k] z^k$.

1. Determinare l'insieme di convergenza puntuale, ivi studiandone la convergenza uniforme e totale.
2. Si determini una famiglia numerabile di insiemi $A_n \subset \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$, non vuoti e distinti tali che la serie ivi converga totalmente e A_n contenga infiniti elementi per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Esercizio 21 Data la serie di potenze complessa

$$\sum_{k=0}^{\infty} [(-1)^k + (1+i)^{(-1)^k}] z^k,$$

determinare l'insieme di convergenza puntuale ed ivi studiarne la convergenza uniforme.

Esercizio 22 Data la serie di potenze complessa $\sum_{k=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2} z^k$, determinarne l'insieme di convergenza puntuale assoluta ed ivi studiarne la convergenza totale.

Esercizio 23 Determinare gli insiemi di convergenza puntuale e puntuale assoluta per la serie di potenze complessa

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{k^2 + \log k} z^{2k}.$$

Stabilire se si può avere la convergenza uniforme e totale sugli insiemi indicati in precedenza.

Esercizio 24 Sia data la serie di potenze complessa

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[1 + (-1)^n (1+i)^n]^n}{n^2} z^n.$$

1. Determinare l'insieme di convergenza puntuale $A \subset \mathbb{C}$.
2. Studiare sia la convergenza uniforme che la convergenza totale su A .

Esercizio 25 Determinare l'insieme di convergenza puntuale per la serie di potenze complesse

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{\sqrt{n}} z^n.$$

Studiare la convergenza uniforme su tale insieme.

Esercizio 26 Sia data la serie di funzioni complesse $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^n$. Determinare l'insieme di convergenza puntuale e stabilire se vi è convergenza totale. Determinare infine una famiglia infinita di insiemi aperti dove la serie converge totalmente.

Esercizio 27 Per $T > 0$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, calcolare la serie di Fourier della periodizzata di

$$[0, T) \ni t \rightarrow e^{\alpha t}.$$

Determinare per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ la serie di Fourier converge uniformemente sul suo insieme di convergenza puntuale. Dedurre il calcolo esplicito della serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(1+k^2)}.$$

Esercizio 28 Calcolare la serie di Fourier della 2-periodizzata di

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } -1 \leq t < 0 \\ 1 & \text{se } 0 \leq t < 1 \end{cases}.$$

Quindi per ogni $t \in (0, 1)$ calcolare il valore della serie numerica

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)\pi t)}{(2k+1)}.$$

Esercizio 29 Si consideri la funzione 2π -periodizzata $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ della funzione

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{on } [-\pi, 0) \\ -x & \text{on } [0, \pi) \end{cases}$$

su $[-\pi, \pi)$. Si calcoli la serie di Fourier data di f , determinandone il valore in tutti i punti di \mathbb{R} . Si calcoli infine la serie numerica:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(1+2k)^2}.$$

Esercizio 30 Si consideri la funzione

$$g(x) = \begin{cases} \sin(\frac{\pi}{2}x) & \text{on } [0, 1) \\ 1 & \text{on } [1, 2) \end{cases}$$

definita su $[0, 2)$ e si consideri la sua 2-periodizzata $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ di g . Si calcoli la serie di Fourier data di f , determinandone il valore in tutti i punti di \mathbb{R} . Si calcoli infine la serie numerica:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{1 - 4^2 k^2}.$$

converge a un numero positivo o a un numero negativo.

Esercizio 31 Si consideri la $\pi/2$ -periodizzata $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ della funzione $g(x) = \sin(x)$ definita su $[0, \pi/2)$. Si calcoli la serie di Fourier di f e si stabilisca se tale serie di funzioni converge uniformemente su $(0, \pi/2)$.