



 Matematica II (Algebra Lineare) — Scritto del 27/6/05 — Quesiti

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

1. Trovare una base di $\{p(x) \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x] : p'(1) = p''(2)\}$.

2. Sia $X = \{x \in \mathbb{R}^4 : 2x_1 + x_2 = 3x_2 + x_3 = 4x_3 + x_4\}$. Esibire Y tale che $X \oplus Y = \mathbb{R}^4$.

3. Esibire un sistema lineare non omogeneo di tre equazioni in quattro incognite privo di soluzioni.

4. Se $A \in \mathcal{M}_{6 \times 7}(\mathbb{R})$ ha rango 4, può avere una sola sottomatrice 3×3 invertibile? Spiegare.

5. Trovare una base che diagonalizzi $\begin{pmatrix} 5 & 8 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$.

6. Trovare una base \mathcal{B} di \mathbb{R}^2 tale che $[e_1 - e_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $[e_1 + e_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

7. Applicare il procedimento di ortonormalizzazione di Gram-Schmidt alla base $(ie_1 + e_2, e_1)$ di \mathbb{C}^2 .

 Deve essere esibito il libretto o un documento. I telefoni devono essere mantenuti spenti. Questo foglio deve essere intestato immediatamente con nome, cognome e matricola. Questo foglio va consegnato alla fine della prima ora. Durante la prima ora non è concesso alzarsi né chiedere chiarimenti. Durante la prima ora sul tavolo è consentito avere solo i fogli forniti e la cancelleria.

 1. ♥ 2. ♣ 3. ♠ 4. ♦ 5. ♥ 6. ♠ 7. ♠ 8. ♦ 9. ♣ 10. ♥



1. Si considerino gli insiemi $V = \{x \in \mathbb{C}^3 : x_1 = \overline{x_2}\}$, e $W = \{x \in \mathbb{C}^3 : 3ix_1 + 2ix_2 - x_3 = 2 - 2i\}$. Si consideri inoltre l'applicazione $f : \mathbb{C}^3 \times \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \Re(x_1)\Re(y_1) + \Im(x_2)\Im(y_2) + \Re(x_3)\Re(y_3) + \Im(x_3)\Im(y_3)$$

- (A) (2 punti) Provare che V non è un sottospazio vettoriale complesso di \mathbb{C}^3 .
- (B) (2 punti) Mostrare che V è un sottospazio vettoriale reale e calcolarne la dimensione.
- (C) (3 punti) Calcolare la dimensione, come spazi affini reali, di $V \cap W$ e di $V + W$.
- (D) (2 punti) Mostrare che f è un prodotto scalare su V visto come spazio vettoriale reale.
- (E) (3 punti) Trovare una base ortonormale rispetto al prodotto scalare f dello spazio vettoriale associato a $V \cap W$.

2. Siano date le matrici $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 4 & 5 & -8 \\ 3 & 3 & -5 \end{pmatrix}$ e $N = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 14 & 11 & -18 \\ 9 & 6 & -10 \end{pmatrix}$ e sia $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

l'applicazione lineare associata a N .

- (A) (3 punti) Trovare una rappresentazione parametrica del nucleo di M ed una cartesiana della sua immagine.
- (B) (3 punti) Verificare che M è diagonalizzabile in senso reale, e trovare una base di autovettori \mathcal{B} .
- (C) (3 punti) Trovare $[f]_{\mathcal{B}}$.
- (D) (2 punti) Verificare che N non è diagonalizzabile.
- (E) (1 punto) Dire se esiste una base rispetto alla quale la matrice di f è simmetrica.



Risposte esatte

5. ♡

1. $1, 9x + x^3, x^2$.

2. $\text{Span}(e_1, e_2)$.

3.
$$\begin{cases} x + y + z + w = 0 \\ x + y + z + w = 1 \\ x + y + z + w = 2 \end{cases}.$$

4. No: ci sono quattro colonne v_1, v_2, v_3, v_4 linearmente indipendenti e sia (v_1, v_2, v_3) che (v_1, v_3, v_4) hanno sottomatrici 3×3 invertibili.

5. $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix}$.

6. $\frac{1}{5}e_1 + \frac{3}{5}e_2, \frac{3}{5}e_1 - \frac{1}{5}e_2$.

7. $\frac{1}{\sqrt{2}}(ie_1 + e_2), \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 + ie_2)$.

1. ♡ 2. ♣ 3. ♠ 4. ◇ 5. ♡ 6. ♠ 7. ♠ 8. ◇ 9. ♣ 10. ♡