UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni

Matematica II (Algebra Lineare) — Scritto del 8/7/06 — Quesiti

Nome _____ **Cognome** _____ **Matricola** ␣␣␣␣␣␣␣

1. Calcolare $\det \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

2. Esibire o spiegare perché non esiste un sistema lineare omogeneo di 5 equazioni in 4 incognite privo di soluzioni.

3. Esibire o spiegare perché non esiste un sistema di 4 vettori di $\mathbb{C}^3$ tale che eliminandone uno qualsiasi resti sempre una base.

4. Se V è uno spazio vettoriale reale, $f : V \to V$ è lineare e $p : V \times V \to \mathbb{R}$ è un prodotto scalare su V, anche $q : V \times V \to \mathbb{R}$ data da $q(v, w) = p(f(v), f(w))$ è un prodotto scalare su V? Spiegare.

5. Qual è la base $\mathcal{B}$ di $\mathbb{R}^3$ tale che $[x]_{\mathcal{B}} = (x_1 - x_3, x_2 - x_3, x_1)$ per ogni $x = (x_1, x_2, x_3)$ in $\mathbb{R}^3$?

6. Esibire o spiegare perché non esiste una $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}_{\leqslant 3}[t]$ iniettiva tale che $\mathrm{Span}(t, t^3) \cap \mathrm{Im}(f) = \{0\}$.

7. Trovare equazioni cartesiane di $(1, i, 1 + i) + \mathrm{Span}((2, 1 - i, 3i)) \subset \mathbb{C}^3$.

Deve essere esibito il libretto o un documento. I telefoni devono essere mantenuti spenti. Questo foglio deve essere intestato immediatamente con nome, cognome e matricola. Questo foglio va consegnato alla fine della prima ora. Durante la prima ora non è concesso alzarsi né chiedere chiarimenti. Durante la prima ora sul tavolo è consentito avere solo i fogli forniti e la cancelleria.

1. ♠ 2. ♢ 3. ♣ 4. ♠ 5. ♡ 6. ♣ 7. ♢ 8. ♠ 9. ♡ 10. ♡

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni

Matematica II (Algebra Lineare) — Scritto del 8/7/06 — Esercizî

1. Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 \\ -5 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

(A) Si provi che -3 è un autovalore di A e se ne calcoli il relativo autospazio. (2 punti)

(B) Si calcoli il polinomio caratteristico di A. (4 punti)

(C) Si determinino tutti gli autovalori reali e complessi di A. (3 punti)

(D) Si trovi una base di $\mathbb{C}^3$ di autovettori di A. (3 punti)

2. Si consideri la seguente matrice dipendente dal parametro reale k:

$$A_k = \begin{pmatrix} 5/2-k & 3/2-k & 1/2 & k-1 \\ k-2 & k-1 & 1 & 1-k \\ 3/2 & 3/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2-k & 1/2-k & 3/2 & k \end{pmatrix}.$$

(A) Si calcolino il determinante e il rango di A_k. (4 punti)

(B) Si trovino equazioni parametriche di $\mathrm{Ker}(A_k)$. (3 punti)

(C) Si mostri che il sistema

$$A_k \cdot x = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

ha soluzione per ogni k. (3 punti)

(D) Si trovino equazioni cartesiane di $\mathrm{Im}(A_0)$. (2 punti)

Deve essere esibito il libretto o un documento. I telefoni devono essere mantenuti spenti. Sul tavolo è consentito avere solo i fogli forniti e la cancelleria. Dall'inizio della seconda ora si può usare anche un foglio manoscritto contenente enunciati e formule. Si può uscire solo in casi eccezionali. Ogni foglio consegnato deve recare nome e numero di matricola. La soluzione di ogni esercizio deve essere consecutiva su un solo foglio. La minuta non va consegnata. Per risolvere un punto di un esercizio è sempre lecito utilizzare gli enunciati dei punti precedenti, anche se non si è riusciti a risolverli.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni

Matematica II (Algebra Lineare) — Scritto del 8/7/06 — Quesiti

Risposte esatte

3. ♣

1. 20.

2. Non esiste: la soluzione nulla c'è sempre.

3. $(e_1, e_2, e_3, e_1 + e_2 + e_3)$.

4. No: valgono bilinearità, simmetria e definizione non negativa, ma per la definizione positiva serve che f sia iniettiva.

5. $(0, -1, -1), (0, 1, 0), (1, 1, 1))$.

6. Non esiste: $\mathrm{Span}(t, t^3) \cap \mathrm{Im}(f) = \{0\} \Rightarrow \dim(\mathrm{Im}(f)) \leqslant \dim(\mathbb{R}_{\leqslant 3}[t]) - \dim(\mathrm{Span}(t, t^3)) = 4 - 2 = 2 \Rightarrow \dim(\mathrm{Ker}(f)) \geqslant \dim(\mathbb{R}^3) - 2 = 1$.

7. $(1 - i)z_1 - 2z_2 = 1 - 3i,\ 3iz_1 - 2z - 3 = -2 + i$.

1. ♠ 2. ♢ 3. ♣ 4. ♠ 5. ♡ 6. ♣ 7. ♢ 8. ♠ 9. ♡ 10. ♡