UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni

Matematica II (Algebra Lineare) — Scritto del 09/01/06 — Quesiti

Nome _____ **Cognome** _____ **Matricola** _____

1. È possibile trovare in $\mathbb{C}^4$ un sistema linearmente indipendente su $\mathbb{C}$ composto da 5 vettori? Esibirlo o spiegare perché non esiste.

2. Siano $\mathcal{B} = (e_1 + 2e_2, e_1 + 3e_2)$, $\mathcal{C} = (e_1 - e_2, 2e_1 + e_2)$ e $[v]_{\mathcal{B}} = (-1, 1)$. Trovare $[v]_{\mathcal{C}}$.

3. Quante soluzioni può avere un sistema lineare non omogeneo di 5 equazioni in 7 incognite?

4. Se $A \in \mathcal{M}_{4\times 5}(\mathbb{C})$ ha una riga linearmente dipendente dalle altre, può rappresentare una applicazione lineare $\mathbb{C}^5 \to \mathbb{C}^4$ surgettiva? Esibire A o spiegare perché non può esistere.

5. Quante applicazioni lineari surgettive $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ esistono tali che $f(\{e_1 + e_2, e_2 + e_3, e_3 + e_4\}) = \{e_1 - e_2, e_2 - e_3, e_3 - e_1\}$?

6. Determinare un vettore di $\mathbb{C}^3$ unitario, ortogonale a $(1 - i, 1 + i, -2i)$ ed avente seconda coordinata immaginaria pura.

7. Trovare equazioni cartesiane di $(e_1 + 3e_2) + \mathrm{Span}(2e_1 - e_2 + e_4, e_2 - 2e_3 - e_4) \subset \mathbb{R}^4$.

Deve essere esibito il libretto o un documento. I telefoni devono essere mantenuti spenti. Questo foglio deve essere intestato immediatamente con nome, cognome e matricola. Questo foglio va consegnato alla fine della prima ora. Durante la prima ora non è concesso alzarsi né chiedere chiarimenti. Durante la prima ora sul tavolo è consentito avere solo i fogli forniti e la cancelleria.

1. ♡ 2. ♣ 3. ♠ 4. ♢ 5. ♢ 6. ♠ 7. ♠ 8. ♢ 9. ♣ 10. ♡

Matematica II (Algebra Lineare) — Scritto del 09/01/06 — Esercizî

1. Per $k \in \mathbb{R}$ sia $T_k : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ data da $T_k(x) = A_k \cdot x$, dove

$$A_k = \begin{pmatrix} (k+1)/2 & (4-k)/2 & (k-4)/2 & 1/2 \\ (11-k-2k^2)/2 & k/2 & (4-k)/2 & k^2-9/2 \\ 5-k^2 & -2 & 4 & k^2-5 \\ (k-1)/2 & (2-k)/2 & (k-2)/2 & 5/2 \end{pmatrix}.$$

(A) (4 punti) Si trovi, verificando che è triangolare superiore, la matrice $[T_k]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}}$, dove

$$\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ -1 \\ 1/2 \end{pmatrix} \right).$$

(B) (4 punti) Si calcolino gli autovalori di T_k e le relative molteplicità algebriche.

(C) (4 punti) Si calcolino le molteplicità geometriche degli autovalori della T_k e si discuta per quali k essa sia diagonalizzabile.

2. Si considerino in $\mathbb{R}^3$ i sottospazi affini

$$E = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \qquad F = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

e l'insieme L_k delle soluzioni del sistema lineare dipendente dal parametro reale k

$$\begin{cases} -5kx - (6+2k)y + (3+k)z = 9+3k, \\ x + y - 2z = 9. \end{cases}$$

(A) (4 punti) Si dimostri che E e F sono paralleli e disgiunti.

(B) (3 punti) Si trovi una equazione cartesiana per F e si deduca che $L_k \subset F$.

(C) (3 punti) Si dica per quali k si ha che L_k è parallelo a E.

(D) (2 punti) Si trovino equazioni cartesiane di $L_k + E$.

Deve essere esibito il libretto o un documento. I telefoni devono essere mantenuti spenti. Sul tavolo è consentito avere solo i fogli forniti e la cancelleria. Dall'inizio della seconda ora si può usare anche un foglio manoscritto contenente enunciati e formule. Si può uscire solo in casi eccezionali. Ogni foglio consegnato deve recare nome e numero di matricola. La soluzione di ogni esercizio deve essere consecutiva su un solo foglio. La minuta non va consegnata. Per risolvere un punto di un esercizio è sempre lecito utilizzare gli enunciati dei punti precedenti, anche se non si è riusciti a risolverli.

Risposte esatte

5. $\diamondsuit$

1. No: $\mathbb{C}^4$ ha dimensione 4 dunque al massimo un sistema linearmente indipendente consiste di 4 vettori

2. $(-2/3, 1/3)$

3. Nessuna o infinite

4. No: il rango per righe è al più 3, dunque anche quello per colonne

5. Infinite: ad esempio per ogni $k \neq 0$ quella per cui $f(e_1 + e_2) = e_1 - e_2$, $f(e_2 + e_3) = e_2 - e_3$, $f(e_3 + e_4) = e_3 - e_1$, $f(e_4) = ke_1$

6. $(0, 2i, -1 + i)/\sqrt{6}$

7. $x_1 + 2x_2 + x_3 = 4,\ x_2 + 2x_4 = 0$

1. $\heartsuit$ 2. $\clubsuit$ 3. $\spadesuit$ 4. $\diamondsuit$ 5. $\diamondsuit$ 6. $\spadesuit$ 7. $\spadesuit$ 8. $\diamondsuit$ 9. $\clubsuit$ 10. $\heartsuit$