UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di Ingegneria — Corso di Laurea in Ingegneria Civile, dell'Ambiente e del Territorio

Geometria e Algebra II — Scritto del 30/1/09 — Quesiti

Nome _____ **Cognome** _____ **Matricola** ␣␣␣␣␣␣␣

1. Se $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$, $\mathcal{B}' = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ e $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, trovare $[v]_{\mathcal{B}'}$.

2. Per quali $k \in \mathbb{R}$ è diagonalizzabile la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -k & k & 0 \\ 1 & k-1 & k^2 \end{pmatrix}$?

3. Determinare il tipo affine della conica $x^2 + 3xy + 2y^2 + x = 0$.

4. Determinare un vettore di $\mathbb{C}^2$ unitario, ortogonale a $\begin{pmatrix} 2+i \\ 1-i \end{pmatrix}$ e avente seconda coordinata immaginaria pura.

5. Qual è la forma canonica di una matrice $n \times n$ ortogonale reale con autovalori reali?

6. Determinare il tipo affine della quadrica $x^2 + 2xy - 6yz + 5z^2 - 4x + 2y = 0$.

7. Dati $v_1, v_2, v_3 \in V = \left\{z \in \mathbb{C}^7 : \sum_{n=1}^{7} (-i)^n z_n = 0\right\}$, si cerca di costruire una base di V formata formata dal massimo numero possibile dei v_j e da altri vettori. Quanti nuovi bisogna sceglierne?

Le risposte devono essere sinteticamente giustificate

Deve essere esibito il libretto o un documento. I telefoni devono essere mantenuti spenti. Questo foglio deve essere intestato immediatamente con nome, cognome e matricola. Questo foglio va consegnato alla fine della prima ora. Durante la prima ora non è concesso alzarsi né chiedere chiarimenti. Durante la prima ora sul tavolo è consentito avere solo i fogli forniti e la cancelleria.

1. ♣ 2. ♡ 3. ♡ 4. ♣ 5. ♢ 6. ♠ 7. ♣ 8. ♠ 9. ♡ 10. ♢

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di Ingegneria — Corso di Laurea in Ingegneria Civile, dell'Ambiente e del Territorio

Geometria e Algebra II — Scritto del 30/1/09 — Esercizî

1. Al variare di k in $\mathbb{R}$ considerare le applicazioni lineari $f_k : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tali che

$$f_k\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k \\ 0 \\ k+2 \end{pmatrix}, \qquad f_k\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-k \\ 2 \\ 1-2k \end{pmatrix}, \qquad f_k\begin{pmatrix} 0 \\ k \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ k \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(A) (3 punti) Per ogni $k \in \mathbb{R}$ determinare quante siano tali f_k;

(B) (3 punti) Per $k = 1$ verificare che f_k esiste ed è unica e determinare $[f_1]^{\mathcal{E}_3}_{\mathcal{E}_3}$;

(C) (3 punti) Per ogni $k \in \mathbb{R}$ tale che f_k esista e sia unica stabilire se è diagonalizzabile;

(D) (3 punti) Per $k = 0$ ortonormalizzare la base di $\mathbb{R}^3$ data dai vettori sui quali è assegnata f_0 e trovare un vettore non nullo ortogonale all'immagine di f_0.

2. Al variare di k in $\mathbb{C}$ considerare la matrice $\begin{pmatrix} k-1-i & 2-i & -1-2i \\ k-1-2i & 2+ik & k-1-2i \\ -ik-2+i & (1+i)k-(1+2i) & (1-i)k+2(i-1) \end{pmatrix}$.

(A) (4 punti) Stabilire per quali k non è invertibile.

(B) (4 punti) Per $k = 0$ provare che è invertibile e determinare i coefficienti di posti $(1,2)$ e $(3,1)$ dell'inversa.

(C) (4 punti) Per $k = 1 + i$ trovare equazioni parametriche del sottospazio affine di $\mathbb{C}^3$ definito dall'equazione $A_{(1+i)} \cdot z = \begin{pmatrix} 2+4i \\ -1+i \\ -1-2i \end{pmatrix}$.

Deve essere esibito il libretto o un documento. I telefoni devono essere mantenuti spenti. Sul tavolo è consentito avere solo i fogli forniti e la cancelleria. Dall'inizio della seconda ora si può usare anche un foglio manoscritto contenente enunciati e formule. Si può uscire solo in casi eccezionali. Ogni foglio consegnato deve recare nome e numero di matricola. La soluzione di ogni esercizio deve essere consecutiva su un solo foglio. La minuta non va consegnata. Per risolvere un punto di un esercizio è sempre lecito utilizzare gli enunciati dei punti precedenti, anche se non si è riusciti a risolverli.

Geometria e Algebra II — Scritto del 30/1/09 — Quesiti

Risposte esatte

9. ♡

1. $\begin{pmatrix} -13 \\ -8 \end{pmatrix}$

2. $k \neq 0, 1$

3. Iperbole

4. $\frac{1}{\sqrt{35}} \begin{pmatrix} 3-i \\ 5i \end{pmatrix}$ o il suo opposto

5. $\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \end{pmatrix}$ per qualche $0 \leq k \leq n$

6. Iperboloide a una falda

7. $6-\dim(\mathrm{Span}(v_1, v_2, v_3))$, dunque tra 3 e 6

1. ♣ 2. ♡ 3. ♡ 4. ♣ 5. ♢ 6. ♠ 7. ♣ 8. ♠ 9. ♡ 10. ♢