



Algebra Lineare — Scritto del 30/1/09 — Quesiti

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

1. Quanti sono i polinomi in una indeterminata t , di grado al più 2, con coefficienti interi compresi tra -2 e 2 , che si annullano per $t = 1$?

AL 2. Per quali $k \in \mathbb{R}$ è diagonalizzabile la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -k & k & 0 \\ 1 & k-1 & k^2 \end{pmatrix}$?

GA1 3. Determinare il tipo affine della conica $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 + x = 0$.

4. Risolvere $\begin{cases} 3x + 2y - 4z = 1 \\ 2x - 3y + 5z = -2 \\ 11x + 3y - 7z = 1. \end{cases}$

5. Se $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$, $\mathcal{B}' = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$ e $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, trovare $[v]_{\mathcal{B}'}$.

6. Dati $v_1, v_2, v_3 \in V = \{z \in \mathbb{C}^7 : \sum_{n=1}^7 (-i)^n z_n = 0\}$, si cerca di costruire una base di V formata dal massimo numero possibile dei v_j e da altri vettori. Quanti nuovi bisogna sceglierne?

7. Quanti parametri si possono usare per dare una presentazione parametrica del sottospazio affine di $\mathbb{R}^4$ di equazioni cartesiane $\begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + 5x_3 - 7x_4 = 2 \\ 2x_1 - 4x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 1 \\ 5x_1 - x_2 + 7x_3 - 11x_4 = 1 \end{cases}$?

8. Data $f : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^9$ lineare con $f(e_1) = f(e_6)$, che dimensione può avere $W \subset \mathbb{R}^9$ tale che $W \cap \text{Im}(f) = \{0\}$ e $W + \text{Im}(f) = \mathbb{R}^9$?

Le risposte devono essere sinteticamente giustificate

Deve essere esibito il libretto o un documento. I telefoni devono essere mantenuti spenti. Questo foglio deve essere intestato immediatamente con nome, cognome e matricola. Questo foglio va consegnato alla fine della prima ora. Durante la prima ora non è concesso alzarsi né chiedere chiarimenti. Durante la prima ora sul tavolo è consentito avere solo i fogli forniti e la cancelleria.

1. ♣ 2. ♠ 3. ♥ 4. ♦ 5. ◇ 6. ♣ 7. ♥ 8. ♦ 9. ♥ 10. ♠



1. Al variare di k in $\mathbb{R}$ considerare le applicazioni lineari $f_k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tali che

$$f_k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k \\ 0 \\ k+2 \end{pmatrix}, \quad f_k \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-k \\ 2 \\ 1-2k \end{pmatrix}, \quad f_k \begin{pmatrix} 0 \\ k \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ k \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(A) (4 punti) Per ogni $k \in \mathbb{R}$ determinare quante siano tali f_k ;

(B) (4 punti) Per $k = 1$ verificare che f_k esista ed è unica e determinare $[f_1]_{\mathcal{E}_3}^{\mathcal{E}_3}$;

AL (C) (4 punti) Per ogni $k \in \mathbb{R}$ tale che f_k esista e sia unica stabilire se è diagonalizzabile;

GAI (D) (4 punti) Per $k = 0$ ortonormalizzare la base di $\mathbb{R}^3$ data dai vettori sui quali è assegnata f_0 e trovare un vettore non nullo ortogonale all'immagine di f_0 .

2. Al variare di k in $\mathbb{C}$ considerare la matrice $\begin{pmatrix} k-1-i & 2-i & -1-2i \\ k-1-2i & 2+ik & k-1-2i \\ -ik-2+i & (1+i)k-(1+2i) & (1-i)k+2(i-1) \end{pmatrix}$.

(A) (4 punti) Stabilire per quali k non è invertibile.

(B) (4 punti) Per $k = 0$ provare che è invertibile e determinare i coefficienti di posti $(1, 2)$ e $(3, 1)$ dell'inversa.

(C) (4 punti) Per $k = 1 + i$ trovare equazioni parametriche del sottospazio affine di $\mathbb{C}^3$ definito

dall'equazione $A_{(1+i)} \cdot z = \begin{pmatrix} 2+4i \\ -1+i \\ -1-2i \end{pmatrix}$.



Risposte esatte

9. ♥

1. 19

2. $k \neq 0, 1$

3. Parabola

4. $y = \frac{1}{2}(23x + 3)$, $z = \frac{1}{2}(13x + 1)$ 5. $\begin{pmatrix} 11 \\ 7 \end{pmatrix}$ 6. $6 - \dim(\text{Span}(v_1, v_2, v_3))$, dunque tra 3 e 6

7. Almeno due

8. $9 - \text{rank}(f)$, dove $0 \leq \text{rank}(f) \leq 5$, dunque tra 4 e 9

1. ♣ 2. ♠ 3. ♥ 4. ♦ 5. ◇ 6. ♣ 7. ♥ 8. ♦ 9. ♥ 10. ♠
