



Geometria — Scritto del 18/6/09 — Quesiti

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

1. Trovare gli autovalori di $\begin{pmatrix} 2+i & 4i-3 \\ i & -1 \end{pmatrix}$ e una base che la diagonalizzi.
2. Determinare i vettori di $\mathbb{C}^2$ unitari, ortogonali a $(1+2i)e_1 + (3-i)e_2$ e aventi prima coordinata immaginaria pura.
3. Stabilire per quali $z \in \mathbb{C}$ la matrice $\begin{pmatrix} 1+z & z-i \\ z+i & z \end{pmatrix}$ ammette una base ortonormale di autovettori.
4. Siano $C = \{[x_0 : x_1 : x_2] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) : x_0^2 = x_1x_2\}$ ed $E_j = \{[x_0 : x_1 : x_2] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) : x_j = 1\}$. Classificare dal punto di vista affine le coniche $C \cap E_0, C \cap E_1, C \cap E_2$.

5. Determinare il tipo affine della quadrica di equazione $x^2 - y^2 - 4xy + 4xz + 6yz + 2y + 2z + 1 = 0$.

- Geom 6.** Sia Γ la circonferenza $x_0^2 + x_1^2 = 1$ in $\mathbb{R}^2$ visto come il piano affine $E = \{[x] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) : x_2 = 1\}$. Esibire un cambiamento di coordinate proiettivo $f : \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ tale che $f(\Gamma) \cap E$ sia una parabola.

- Geom 7.** Calcolare $\int_{\alpha} (2xy^3 dx + 3x^2y^2 dy)$ con $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = (t \cdot \log_2(1+t), -\sin(\pi t/2))$.

- GAII 8.** Esibire una base di $\{z \in \mathbb{C}^3 : (1+i)z_1 + (1-i)z_2 + (1+2i)z_3 = 0\}$ nella quale ogni elemento abbia almeno due coordinate reali.

- GAII 9.** Siano $\mathcal{B} = (e_1 - 2e_2, 2e_1 + e_2), \mathcal{C} = (3e_1 + e_2, 5e_1 + 2e_2)$ e $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calcolare $[v]_{\mathcal{C}}$.

Le risposte devono essere sinteticamente giustificate

Deve essere esibito il libretto o un documento. I telefoni devono essere mantenuti spenti. Questo foglio deve essere intestato immediatamente con nome, cognome e matricola. Questo foglio va consegnato alla fine della prima ora. Durante la prima ora non è concesso alzarsi né chiedere chiarimenti. Durante la prima ora sul tavolo è consentito avere solo i fogli forniti e la cancelleria.

1. ♠ 2. ♥ 3. ♠ 4. ♣ 5. ◇ 6. ♠ 7. ♣ 8. ♥ 9. ♣ 10. ◇



1. Siano $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, $B = A + {}^tA$ e $v = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

(A) (4 punti) Stabilire se A sia diagonalizzabile.

(B) (4 punti) Determinare il tipo affine della conica associata alla matrice B .

(C) (4 punti) Determinare una base ortonormale rispetto al prodotto scalare canonico di $\mathbb{R}^3$ del sottospazio $\{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x|v \rangle_B = 0\}$.

Geom 2. Siano $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ data da $\alpha(t) = \begin{pmatrix} t \cos t \\ 2t \sin t \\ \cos t - t \sin t \end{pmatrix}$, $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ data dalla proiezione ortogonale di α sul piano di equazione $x_3 = 0$ identificato a $\mathbb{R}^2$, e γ la restrizione di α a $[0, 1]$.

Geom (A) (4 punti) Calcolare il segno della curvatura di β al variare di t .

Geom (B) (4 punti) Calcolare curvatura e torsione di α per $t = 0$;

Geom (C) (4 punti) Provare che il valore di $\int_{\gamma} \langle x + y + 2z \rangle$ è compreso tra la lunghezza di γ e il triplo di tale lunghezza.

GAII 3. In $\mathbb{R}^3$ considerare il piano X di equazione $2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0$.

GAII (A) (4 punti) Esibire la proiezione ortogonale p di $\mathbb{R}^3$ su X .

GAII (B) (4 punti) Provare che la formula $f(x) = \begin{pmatrix} x_1 - x_3 \\ \frac{4}{3}x_1 - x_2 + 2x_3 \\ -2x_1 + 3x_2 - 3x_3 \end{pmatrix}$ definisce un'applicazione lineare da X in sé, verificare che $\mathcal{B} = (e_1 + 2e_2 + e_3, 6e_1 + 8e_2 + 3e_3)$ è una base di X ed esibire $[f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

GAII (C) (4 punti) Stabilire se la f del punto precedente sia diagonalizzabile.



Risposte esatte

5. $\diamond$

1. $2i, 1 - i, \begin{pmatrix} 2 - i \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 + 2i \\ -1 \end{pmatrix}$

2. $\pm \frac{1}{5\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -10i \\ 7 + i \end{pmatrix}$

3. $z \in \mathbb{R}$

4. Iperbole, parabola, parabola

5. Iperboloide a due falde

6. Ad esempio $f([x_0 : x_1 : x_2]) = [x_0 - x_2 : x_1 : x_2]$

7. -1

8. Ad esempio $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 + i \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$

9. $\begin{pmatrix} 13 \\ -8 \end{pmatrix}$

1. $\spadesuit$ 2. $\heartsuit$ 3. $\spadesuit$ 4. $\clubsuit$ 5. $\diamond$ 6. $\spadesuit$ 7. $\clubsuit$ 8. $\heartsuit$ 9. $\clubsuit$ 10. $\diamond$