

Compitino di Geometria I - 10/1/2018

Nome e cognome (stampatello)

matricola.....

I parte

*Per ogni quesito spuntare una (sola) casella o riempire col risultato (dove richiesto);
1 punto per ogni risposta giusta*

1) Siano $P \equiv (-1, -1, -1)$, $Q \equiv (1, 0, 2)$, $R \equiv (0, 1, 1)$ punti in \mathbb{R}^3 .

- L'area del triangolo PQR è:

- L'equazione cartesiana del piano passante per i 3 punti dati è:

.....

- Il coseno dell'angolo formato dalla normale a questo piano e dall'asse x è:

.....

2) Se il polinomio caratteristico della matrice complessa A è dato da $p(\lambda) = \lambda^2 - i$ ($i \in \mathbb{C}$ è l'unità immaginaria) allora

- A è diagonalizzabile su \mathbb{C}

| | |
|----|----|
| si | no |
|----|----|

e in caso affermativo la forma diagonale di A è la matrice:

- A è invertibile

| | |
|----|----|
| si | no |
|----|----|

e in caso affermativo la forma diagonale di A^{-1} è la matrice:

3) Sia φ un prodotto scalare in \mathbb{R}^3 e siano $V, W \subset \mathbb{R}^3$ sottospazi di dimensione 2 tali che $V + W = \mathbb{R}^3$.

- Non può essere simultaneamente $\varphi|_V > 0$ e $\varphi|_W < 0$

| | |
|------|-------|
| vero | falso |
|------|-------|

- Se $\varphi|_V > 0$ e $\varphi|_W > 0$ allora φ è definito positivo

| | |
|------|-------|
| vero | falso |
|------|-------|

(risolvere su un foglio)

Esercizio 1. Sia $\underline{v} = (1, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$ e sia f l'endomorfismo di \mathbb{R}^3 dato dalla riflessione ortogonale (rispetto al prodotto canonico) rispetto al piano ortogonale a \underline{v} .

1. Scrivere la matrice associata a f rispetto alla base canonica di \mathbb{R}^3 .
2. Dire se f è diagonalizzabile e in caso affermativo determinare una base di autovettori.
3. In $V = L(\mathbb{R}^3)$ si consideri il sottoinsieme $W_\lambda = \{g \in V : g(\underline{v}) = \lambda \underline{v}\}$ (con λ fissato e \underline{v} il vettore precedentemente definito). Dimostrare che

$$W_\lambda = W_0 + \lambda f.$$

Esercizio 2. Sia $V = \mathbb{C}_2[x]$ e sia $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ dato da

$$\varphi(p(x), q(x)) = p(i)q(i) - p(-i)q(-i)$$

(dove $i \in \mathbb{C}$ è l'unità immaginaria).

1. Dimostrare che φ è un prodotto scalare.
2. Determinare una base ortogonale per φ .
3. [facoltativo] Visto V come spazio vettoriale su \mathbb{R} , trovare la segnatura di $\psi = \mathcal{I}m(\varphi)$ ($\mathcal{I}m$ denota la parte immaginaria).