Capitolo 4

Quarta Lezione - Esercizi

4.1 Esercizi svolti

Ricordiamo la definizione di ordine totale per un anello.

Definizione 4.1. [BBP55] *Su un anello commutativo A un ordinamento totale compatibile con le operazioni è una relazione $>$ tale che*

1. $\forall a, b \in A$ abbiamo $a > b$ o $b > a$ o $a = b$. [Totalità]
2. $\forall a, b \in A$ $a > b$ e $b > a \Rightarrow a = b$. [Proprietà antisimmetrica]
3. $\forall a, b, c \in A$ $a > b$ e $b > c \Rightarrow a > c$. [Proprietà transitiva]
4. $\forall a, b, c \in A$ abbiamo $a > b \Rightarrow a + c > b + c$. [Compatibilità con la somma]
5. $\forall a, b, c \in A$ con $c > 0$ abbiamo $a > b \Rightarrow ac > bc$. [Compatibilità col prodotto]
6. Conseguenze: $\forall a, b, c \in A$ con $c < 0$ abbiamo $a > b \Rightarrow bc > ac$.
7. $1 > 0$ e $-1 < 0$.

Notazione 4.2. [BBP42] *Con lieve abuso di notazione*

- Definiamo "maggiore o uguale"

$$a \geq b \Leftrightarrow a > b \text{ o } a = b$$

- se $a > b$ diciamo anche che $b < a$. Analogamente per $\geq, \leq$.

Se poniamo su $\mathbb{R}$ l'ordinamento usuale, vediamo che è impossibile porre su $\mathbb{C}$ un ordinamento compatibile con questo.

Esercizio 4.3. [BBP98] *Non esiste su $\mathbb{C}$ un ordinamento totale $>$ compatibile con le operazioni.*

Soluzione. Dato che $i \neq 0$, dobbiamo avere $i > 0$ o $i < 0$

- Se $i > 0$, allora $i \cdot i > i \cdot 0 \Leftrightarrow -1 > 0$ assurdo.
- Se $i < 0$, allora $-i > 0$, ma allora $(-i) \cdot (-i) > 0 \Leftrightarrow i^2 > 0 \Leftrightarrow -1 > 0$ assurdo.

□

Esercizio 4.4. [BBQ98] Portare il complesso $z = 2e^{i\frac{\pi}{4}}$ in forma cartesiana. Il modulo di z è 2 ed il suo argomento $\frac{\pi}{4}$. Svolgiamo semplicemente i conti.

Dato che $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, abbiamo $z_2 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$

Esercizio 4.5. [BBB13] Portiamo $2 - 3i \in \mathbb{C}$ in forma trigonometrica. Abbiamo $\rho = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$ ed abbiamo

$$\begin{cases} a = \sqrt{13} \cos \theta \\ b = \sqrt{13} \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \frac{b}{a} = -\frac{3}{2} = \tan \theta \Rightarrow \theta = \operatorname{atan} \left(-\frac{3}{2} \right)$$

Ricordando il grafico dell'arcotangente, funzione dispari positiva sui positivi e negativa sui negativi, $\operatorname{atan} \left(\frac{3}{2} \right) > 0$, dato che θ è un angolo con coseno positivo e seno negativo, controllando sul piano di Argand-Gauss θ appartiene al quarto quadrante. La forma cartesiana di $2 - 3i$ è quindi

$$\begin{aligned} & \sqrt{13} \left(\cos \operatorname{atan} \left(-\frac{3}{2} \right) + i \sin \left(+ \operatorname{atan} \left(-\frac{3}{2} \right) \right) \right) \\ & \sqrt{13} \left(\cos \operatorname{atan} \left(\frac{3}{2} \right) - i \sin \operatorname{atan} \left(\frac{3}{2} \right) \right) \end{aligned}$$

Esercizio 4.6. [BBB47] Calcolare le radici seste di $i + 1$. Mettiamo $1 + i$ in forma esponenziale e usiamo la formula. Usiamo il piano di Argand-Gauss.

GNU9: **Rappresentazione trigonometrica di $1 + i$**

$$1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$$

$$\sqrt[6]{1+i} = \sqrt[6]{\sqrt{2}e^{i\pi/4}} = \sqrt[12]{2}e^{i\frac{\pi+2k\pi}{6}} \quad k: 0 \dots 5$$

e quindi

$$\begin{aligned} \sqrt[6]{1+i} &= \sqrt[12]{2} \cdot e^{i\frac{\pi}{24}} & k=0 \\ \sqrt[6]{1+i} &= \sqrt[12]{2} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}+2\pi} = \sqrt[12]{2} \cdot e^{i\frac{9\pi}{6}} = \sqrt[12]{2} \cdot e^{i\frac{9\pi}{24}} & k=1 \\ \sqrt[6]{1+i} &= \sqrt[12]{2} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}+4\pi} = \sqrt[12]{2} \cdot e^{i\frac{17\pi}{24}} & k=2 \\ \sqrt[6]{1+i} &= \sqrt[12]{2} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}+6\pi} = \sqrt[12]{2} \cdot e^{i\frac{25\pi}{24}} & k=3 \\ \sqrt[6]{1+i} &= \sqrt[12]{2} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}+8\pi} = \sqrt[12]{2} \cdot e^{i\frac{33\pi}{24}} & k=4 \\ \sqrt[6]{1+i} &= \sqrt[12]{2} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}+10\pi} = \sqrt[12]{2} \cdot e^{i\frac{41\pi}{24}} & k=5 \end{aligned}$$

Notiamo che per $k=6$ avremmo $\frac{49\pi}{24} = \frac{\pi}{24} + 2\pi$ e quindi per $k > n-1$ ritroviamo le radici che avevamo già.

$$\sqrt[12]{2}e^{i\frac{49\pi}{24}} = \sqrt[12]{2}e^{i\frac{\pi}{24}}$$

Esercizio 4.7. [EE01] Trovare le soluzioni in $\mathbb{C}$ dell'equazione $(z^4 + 1) = 0$

Soluzione.

$$z^4 + 1 = 0 \Leftrightarrow z^4 = -1$$

quindi cerchiamo le radici quarte di $-1 = 1e^{i\pi}$. Le radici si calcolano con la formula applicata come segue

$$w_4 = \sqrt[4]{1} \cdot e^{i\frac{\pi+2k\pi}{4}}$$

con $k=0, 1, 2, 3$ e otteniamo le quattro radici complesse:

$$\begin{aligned} z_0 &= e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} & k=0 \\ z_1 &= e^{i\frac{3\pi}{4}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} & k=1 \\ z_2 &= e^{i\frac{5\pi}{4}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} & k=2 \\ z_3 &= e^{i\frac{7\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} & k=3 \end{aligned}$$

Una fattorizzazione di $z^4 + 1$ su $\mathbb{C}[z]$ è quindi, per il teorema di Ruffini (che vale su qualunque $\mathbb{K}[x]$) è quindi

$$(z - e^{i\frac{\pi}{4}}) (z - e^{i\frac{3\pi}{4}}) (z - e^{i\frac{5\pi}{4}}) (z - e^{i\frac{7\pi}{4}})$$

Notiamo che le quattro radici complesse sono a due a due coniugate (prima e quarta, seconda e terza) e che

$$(z - e^{i\frac{\pi}{4}}) (z - e^{i\frac{7\pi}{4}}) = z^2 + 2\operatorname{Re}(e^{i\frac{\pi}{4}})z + |e^{i\frac{\pi}{4}}|^2 = z^2 + \sqrt{2}z + 1$$

Dove $\operatorname{Re}(e^{i\frac{\pi}{4}})$ è la parte reale di $(e^{i\frac{\pi}{4}})$, dato che il coniugato di $\rho e^{i\theta}$ è $\rho e^{-i\theta}$, che $e^{i\frac{7\pi}{4}} = e^{-i\frac{\pi}{4}}$ e che

$$a + ib + \overline{a + ib} = a + ib + (a - ib) = 2a$$

□

Trovare per esercizio una fattorizzazione completa di $z^4 + 1$ su $\mathbb{R}[z]$ *Hints*:

- Si può ricorrere alla divisione di polinomi (funziona su qualunque $\mathbb{K}[x]$), dividendo $z^4 + 1$ per $z^2 + \sqrt{2}z + 1$.
- Si può procedere come sopra con i fattori lineari $e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}}$.

Esercizio 4.8. [BBB56] Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione $4|z|^3 = z^5$

Soluzione. Mettiamo z in forma esponenziale: $z = \rho e^{i\theta}$; l'equazione diviene

$$\begin{aligned} 4|\rho e^{i\theta}|^3 &= (\rho e^{i\theta})^5 \\ 4\rho^3 &= 4\rho^3 e^{i0} = \rho^5 e^{i5\theta} \end{aligned}$$

Da cui, per la definizione di uguaglianza per i complessi in forma esponenziale abbiamo, ricordando che $\rho > 0$ dato che si tratta di un modulo, che:

$$\begin{cases} 4\rho^3 = \rho^5 \text{ con } \rho > 0 \\ 0 = 5\theta + 2k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho^5 - 4\rho^3 = \rho^3(\rho^2 - 4) = 0 \text{ con } \rho > 0 \\ \theta = -\frac{2}{5}k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho = 0, 2 \\ \theta = -\frac{2}{5}k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Dato che per ogni $k \in \mathbb{Z}$ ho una soluzione, ho infinite soluzioni,

$$\begin{array}{ll} \vdots & \vdots \\ k = -2 & \theta = \frac{4}{5}\pi \\ k = -1 & \theta = \frac{2}{5}\pi \\ k = 0 & \theta = 0 \\ k = 1 & \theta = -\frac{2}{5}\pi \\ k = 2 & \theta = -\frac{4}{5}\pi \\ k = 3 & \theta = -\frac{6}{5}\pi \\ k = 4 & \theta = -\frac{8}{5}\pi \\ k = 5 & \theta = -\frac{10}{5}\pi \\ k = 6 & \theta = -\frac{12}{5}\pi \\ \vdots & \vdots \end{array}$$

Ma queste soluzioni non sono tutte distinte, infatti notiamo che

- per $k = 5$, $\theta = -\frac{10}{5} = -2\pi$ che ci dà gli stessi seno e coseno di $k = 0$, $\theta = 0$, e quindi lo stesso complesso.
- Analogamente, $k = 1$ e $k = 6$ ci danno lo stesso complesso.
- Analogamente, $k = -1$, $\theta = \frac{2}{5}$ ci dà lo stesso complesso di $k = 4$, $\theta = -\frac{8}{5} = \frac{2}{5} - 2\pi$.
- Eccetera...

Se ci limitiamo ai valori di k per cui $-\frac{2}{5}k\pi \in (-2\pi, 0]$, dato che poi i complessi si ripetono abbiamo che i θ delle soluzioni sono

$k = 0$	$\theta = 0$
$k = 1$	$\theta = -\frac{2}{5}\pi$
$k = 2$	$\theta = -\frac{4}{5}\pi$
$k = 3$	$\theta = -\frac{6}{5}\pi$
$k = 4$	$\theta = -\frac{8}{5}\pi$

Se preferiamo i nostri angoli in $[0, 2\pi)$, prenderemo altri valori di k , oppure più banalmente, aggiungiamo 2π a questi θ trovando

$$\theta = 0 \quad \theta = \frac{2}{5}\pi \quad \theta = \frac{4}{5}\pi \quad \theta = \frac{6}{5}\pi \quad \theta = \frac{8}{5}\pi$$

Le soluzioni dell'equazione $4|z|^3 = z^5$ sono quindi

$$z_0 = 2 \cdot e^{i0} = 2, \quad z_1 = 2 \cdot e^{i\frac{2}{5}\pi}, \quad z_2 = 2 \cdot e^{i\frac{4}{5}\pi}, \quad z_3 = 2 \cdot e^{i\frac{6}{5}\pi}, \quad z_4 = 2 \cdot e^{i\frac{8}{5}\pi}, \quad z_5 = 0$$

□

Esempio 4.9. [BBB45] *Trovare le soluzioni in $\mathbb{C}$ dell'equazione*

$$z^7 + 2iz^6 + iz^5 + 2z^2 + 4iz + 2i = 0$$

Soluzione. Per il Teorema fondamentale dell'algebra abbiamo 7 soluzioni in $\mathbb{C}$, contate con la loro molteplicità, dato che abbiamo un'equazione polinomiale di grado 7. Troviamo le soluzioni. Raccogliamo a fattore comune come segue:

$$\begin{aligned} z^7 + 2iz^6 + iz^5 + 2z^2 + 4iz + 2i &= 0 \\ z^5(z^2 + 2iz + i) + 2(z^2 + 2iz + i) &= 0 \\ (z^5 + 2)(z^2 + 2iz + i) &= 0 \end{aligned}$$

Quindi le soluzioni dell'equazione sono date dall'unione delle soluzioni dei due fattori:

$$z^5 + 2 = 0 \quad \text{e} \quad z^2 + 2iz + i = 0$$

Risolviamo separatamente le due equazioni.

Risolviamo prima l'equazione $z^5 + 2 = 0$ che equivale a calcolare le radici quinte complesse di -2 . Innanzitutto scriviamo $-2 = 2 \cdot e^{i\pi}$ e applichiamo la formula delle radici

$$\sqrt[n]{\rho} \cdot e^{i \frac{\theta + 2k\pi}{n}} \text{ con } k = 0, \dots, n-1$$

Pertanto visto che $\rho = 2, \theta = \pi$ e $n = 5$ abbiamo che le radici quinte di -2 sono:

$$\sqrt[5]{2} e^{i \frac{\pi + 2k\pi}{5}} \text{ con } k = 0, \dots, 4$$

Da questa formula otteniamo le cinque radici complesse:

$$\begin{aligned} z_0 &= \sqrt[5]{2} \cdot e^{i \frac{\pi}{5}} & k &= 0 \\ z_1 &= \sqrt[5]{2} \cdot e^{i \frac{3\pi}{5}} & k &= 1 \\ z_2 &= \sqrt[5]{2} \cdot e^{i \frac{5\pi}{5}} = \sqrt[5]{2} \cdot e^{i\pi} = -\sqrt[5]{2} & k &= 2 \\ z_3 &= \sqrt[5]{2} \cdot e^{i \frac{7\pi}{5}} & k &= 3 \\ z_4 &= \sqrt[5]{2} \cdot e^{i \frac{9\pi}{5}} & k &= 4 \end{aligned}$$

L'equazione $z^2 + 2iz + i = 0$ è un'equazione di secondo grado in $\mathbb{C}$. Adesso risolviamo la seconda equazione che osserviamo trattarsi di un'equazione di secondo grado in $\mathbb{C}$. Pertanto usiamo la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado ed otteniamo

$$\begin{aligned} z_{5,6} &= \frac{-2i + \sqrt{(2i)^2 - 4i_{\mathbb{C}}}}{2} \\ &= \frac{-2i + \sqrt{-4 - 4i_{\mathbb{C}}}}{2} \\ &= \frac{-2i + 2\sqrt{-1 - i_{\mathbb{C}}}}{2} \\ &= -i + \sqrt{-1 - i_{\mathbb{C}}} \end{aligned}$$

Adesso dobbiamo trovare le radici quadrate di $-1 - i$. Innanzitutto calcoliamone il modulo e l'argomento. Poichè $a = -1$ e $b = -1$ si ha che $\rho = \sqrt{2}$ e $\theta = \frac{5}{4}\pi$ e quindi

$$-1 - i = \sqrt{2} e^{i \frac{5}{4}\pi}$$

Per cui le radici quadrate di $-1 - i$ si calcolano con la formula applicata come segue

$$w_k = \sqrt{\sqrt{2}} \cdot e^{i \frac{\frac{5\pi}{4} + 2k\pi}{2}} \quad k=0,1$$

ed otteniamo le sue due radici complesse:

$$w_0 = \sqrt[4]{2} \cdot e^{i \frac{5\pi}{8}} \quad w_1 = \sqrt[4]{2} \cdot e^{i \frac{13\pi}{8}}$$

da cui si ottengono le soluzioni:

$$z_5 = -i + w_0 = -i + \sqrt[4]{2} e^{i \frac{5\pi}{8}} \quad z_6 = -i + w_1 = -i + \sqrt[4]{2} e^{i \frac{13\pi}{8}}$$

Abbiamo così trovato le sette radici complesse cercate

$$\begin{aligned} z_0 &= \sqrt[5]{2}e^{i\frac{\pi}{5}} \\ z_1 &= \sqrt[5]{2}e^{i\frac{3}{5}\pi} \\ z_2 &= -\sqrt[5]{2} \\ z_3 &= \sqrt[5]{2}e^{i\frac{7}{5}\pi} \\ z_4 &= \sqrt[5]{2}e^{i\frac{9}{5}\pi} \\ z_5 &= -i + \sqrt[4]{2}e^{i\frac{5}{8}\pi} \\ z_6 &= -i + \sqrt[4]{2}e^{i\frac{13}{8}\pi} \end{aligned}$$

□

Esempio 4.10. [BBB93] *Trovare le soluzioni dell'equazione*

$$z\bar{z}^2 = z^3$$

e disegnarle sul piano di Argand-Gauss.

Soluzione. Abbiamo

$$z(\bar{z}^2 - z^2) = 0 \implies z = 0 \text{ oppure } \bar{z}^2 - z^2 = 0$$

Quindi abbiamo la soluzione banale $z = 0$ ovvero $\rho = 0$.

Adesso possiamo supporre $z \neq 0$ e dividere ambedue i membri dell'equazione per z , ottenendo $\bar{z}^2 = z^2$.

Mettiamo il complesso in forma esponenziale $z = \rho e^{i\theta}$, e dato che $z \neq 0$ possiamo supporre $\rho > 0$. L'equazione diviene:

$$\begin{aligned} \bar{z}^2 &= z^2 \\ (\rho e^{-i\theta})^2 &= (\rho e^{i\theta})^2 \\ \rho^2 e^{-2i\theta} &= \rho^2 e^{2i\theta} \end{aligned}$$

Da cui, per la definizione di uguaglianza per i complessi in forma esponenziale

$$\begin{cases} \rho^2 = \rho^2 & \text{vera } \forall \rho \in \mathbb{R} \\ -2\theta = 2\theta + 2k\pi & \text{con } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Dalla seconda equazione otteniamo che

$$\theta = -\frac{k}{2}\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z}.$$

Da cui si deducono gli angoli

$$\theta_0 = 0 \quad \theta_1 = -\frac{\pi}{2} \quad \theta_2 = -\pi \quad \theta_3 = -\frac{3}{2}\pi$$

o volendo gli angoli in $[0, 2\pi)$ (mantenendo gli stessi seni e coseni)

$$\theta_0 = 0 \quad \theta_1 = \frac{\pi}{2} \quad \theta_2 = \pi \quad \theta_3 = \frac{3\pi}{2}$$

Quindi le soluzioni sono

$$z_0 = \rho e^{i0} \quad z_1 = \rho e^{i\frac{\pi}{2}} \quad z_2 = \rho e^{i\pi} \quad z_3 = \rho e^{i\frac{3\pi}{2}} \quad z_4 = 0 \text{ che avevamo trovato all'inizio}$$

con ρ qualunque, visto che non abbiamo condizioni su ρ .

Nel piano di Argand-Gauss le soluzioni di questa equazione sono quattro semi rette dall'origine con angoli rispettivamente $\theta = 0, \pi/2, \pi, 3/2\pi$, origine compresa.

[Qui il disegno, a breve]

□

Esempio 4.11. [BBW11] *Determinare le soluzioni complesse dell'equazione $\frac{z^8+1}{z^4+i} = 0$.*

Soluzione. Ricordiamo che $a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi)$, come si può facilmente verificare svolgendo i conti. Ponendo $a = z^4$ e $b = 1$ vediamo che

$$\frac{z^8 + 1}{z^4 + i} = \frac{(z^4 + i)(z^4 - i)}{z^4 + i} = z^4 - i$$

Le radici di $z^8 + 1$ sono otto (le otto radici complesse di -1); per quanto detto prima quattro sono radici di $z^4 + i$ e quattro di $z^4 - i$. Abbiamo

$$\frac{z^8 + 1}{z^4 + i} = 0 \Leftrightarrow z^4 - i = 0$$

Le soluzioni sono quindi le radici quarte complesse di i , che troviamo con la formula

$$\sqrt[4]{i}_{\mathbb{C}} = \sqrt[4]{e^{i\frac{\pi}{2}}}_{\mathbb{C}} = e^{i\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{4}} \quad k = 0, \dots, 3 = e^{i\frac{\pi}{8}}, e^{i\frac{5}{8}\pi}, e^{i\frac{9}{8}\pi}, e^{i\frac{13}{8}\pi}$$

□

Esempio 4.12. [BBB51] *Risolvere in $\mathbb{C}$ la seguente equazione*

$$(\bar{z} - 1)^3 = 2z - 2$$

Soluzione. Sostituiamo $\omega = \bar{z} - 1$ da cui si ricava che

$$\bar{z} = \omega + 1 \Rightarrow z = \bar{\omega} + 1$$

L'equazione diventa quindi

$$\omega^3 = 2(\bar{\omega} + 1) - 2 = 2\bar{\omega}.$$

Adesso scriviamo ω in forma esponenziale $\omega = \rho e^{i\theta}$ ed otteniamo

$$\rho^3 e^{i3\theta} = 2\rho e^{-i\theta}$$

che per il principio di identità dei complessi in forma esponenziale diviene

$$\begin{cases} \rho^3 = 2\rho \\ 3\theta = -\theta + 2k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \rho(\rho^2 - 2) = 0 \\ 4\theta = 2k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \rho = 0, \sqrt{2} \\ \theta = \frac{k}{2}\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Le soluzioni distinte di questa equazione sono:

$$\begin{array}{ll} \omega_0 = \sqrt{2}e^{i0} = \sqrt{2} & \text{da } \rho = \sqrt{2}, k = 0 \\ \omega_1 = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{2}} = \sqrt{2}i & \text{da } \rho = \sqrt{2}, k = 1 \\ \omega_2 = \sqrt{2}e^{i\frac{2\pi}{2}} = -\sqrt{2} & \text{da } \rho = \sqrt{2}, k = 2 \\ \omega_3 = \sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{2}} = -\sqrt{2}i & \text{da } \rho = \sqrt{2}, k = 3 \\ \omega_4 = 0 & \text{da } \rho = 0 \end{array}$$

Ricordandoci che $z = \bar{w} + 1$ ricaviamo le soluzioni dell'equazione originaria $(\bar{z} - 1)^3 = 2z - 2$

$$\begin{aligned} z_0 &= \sqrt{2} + 1 = 1 + \sqrt{2} \\ z_1 &= \sqrt{2}i + 1 = 1 + \sqrt{2}i \\ z_2 &= -\sqrt{2} + 1 = 1 - \sqrt{2} \\ z_3 &= -\sqrt{2}i + 1 = 1 - \sqrt{2}i \\ z_4 &= \bar{0} + 1 = 1 \end{aligned}$$

□

Esercizio 4.13. [BBB57] *Trovare il numero di soluzioni in $\mathbb{C} - \mathbb{R}$ del sistema*

$$\begin{cases} z^{100} - 1 = 0 \\ \text{Im}(z) > 0 \end{cases}$$

L'equazione ci dice che le soluzioni devono essere le radici di 1. Ce ne sono due reali, con parte immaginaria nulla, ± 1 . Le altre corrispondono a 98 punti simmetricamente disposti sulla circonferenza unitaria. La disuguaglianza ci dice che le soluzioni devono avere parte immaginaria positiva, ovvero giacere nel primo e terzo quadrante. Per simmetria, a parte le due soluzioni con parte immaginaria nulla ($z = \pm 1$), metà delle 98 soluzioni non reali rimaste avrà parte immaginaria positiva e metà parte immaginaria negativa. Quindi il sistema ha 49 soluzioni.

Esercizio 4.14. [M106] *Risolvere per $z \in \mathbb{C}$*

$$\begin{cases} e^z = e \\ |z| < 10 \end{cases}$$

Risolviamo prima l'equazione, usando la forma cartesiana di $z = a + ib$.

N.B. Dato che $z \in \mathbb{C}$, non necessariamente $z \in \mathbb{R}$ e^z è l'esponenziale di esponente z , non un complesso in forma esponenziale. Quindi $z \in \mathbb{R}$ NON $z \in [0, 2\pi)$

$$e^z = e \Leftrightarrow e^{x+iy} = e \Leftrightarrow e^x e^{iy} = e \Leftrightarrow \begin{cases} e^x = e \\ y = 0 + 2k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Le soluzioni sono quindi gli infiniti complessi $z = 1 + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$ ed in particolare

$$\begin{array}{ccc} \vdots & \vdots & \vdots \\ k = -2 & 1 - i4\pi & \sqrt{1 + 16\pi^2} \\ k = -1 & 1 - i2\pi & \sqrt{1 + 4\pi^2} \\ k = 0 & 1 & 1 \\ k = 1 & 1 + i2\pi & \sqrt{1 + 4\pi^2} \\ k = 2 & 1 + i4\pi & \sqrt{1 + 16\pi^2} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \quad \text{di modulo}$$

e dato che dobbiamo avere $|z| < 10$

$$\begin{aligned} \sqrt{1+4\pi^2} &< 1 + \sqrt{4\pi^2} = 1 + 2\pi \simeq 7.28 \text{ Soluzione} \\ \sqrt{1+16\pi^2} &> 1 + \sqrt{16\pi^2} = 1 + 4\pi \simeq 1 + 12.56 = 13.57 > 10 \text{ Non soluzione} \end{aligned}$$

e per $k > 2$ il modulo è maggiore che per $k = 2$, e che la situazione per $k < 0$ è speculare a quella per $k > 0$. Le soluzioni sono solo tre, per $k = 0, \pm 1$, rispettivamente $z = 1, 1 \pm i2\pi$

4.2 Esercizi proposti

Esercizio 4.15. [BBU77] Disegnare su piano di Argand-Gauss i seguenti complessi

1. $(2 + i)^5$.
2. $\sqrt[4]{\sqrt{2}}_{\mathbb{C}}$ (le radici quarte complesse di $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$).
3. $z \in \mathbb{C}$ tali che $|z| = 2$.
4. $z \in \mathbb{C}$ tali che $\arg(z) = 2$.

Esercizio 4.16. [BBY77] Mettere in forma esponenziale i seguenti complessi

1. $2 + 5i$.
2. $-1 - 2i$.
3. $\frac{1}{i}$.
4. $\frac{2-i}{1+i}$.

Esercizio 4.17. [BBQ77] Semplificare le seguenti espressioni complesse

1. $(3 + i)(3 - i) \left(\frac{1}{5} + i\frac{1}{10}\right)$.
2. $a^2 - b^2$.
3. $a^2 + b^2$.
4. $a^4 + b^4$.
5. $a^8 + b^8$.

Esercizio 4.18. [BBB77] Calcolare $(-1 - i)^9$, $i^{2135789}$, $(1 - 5i)^5$

Esercizio 4.19. [BBB83] Calcolare $\sqrt[4]{1-i}$, $\sqrt[5]{-i}$, $\sqrt[3]{2-5i}$ e disegnarli sul piano di Argand-Gauss

Esercizio 4.20. [BBW83] Dato $z = e^{-i\pi/6} + e^{-i\pi/6}$

1. Esprimere z in forma cartesiana, trigonometrica, esponenziale.
2. Determinare le radici cubiche di z .

Esercizio 4.21. [BBP83] Trovare le radici complesse delle equazioni

1. $z^2 + z + 1 = 0$.

2. $z^2 - 2z - i = 0.$

3. $(3i - 9)z^2 + (5 - 3i)z + 2i = 0.$

4. $z^2i - (i + 4)z - 3i + 1 = 0.$

Esercizio 4.22. [BBB62] Risolvere in $\mathbb{C}$ le seguenti equazioni:

1. $z^4 - 16 = 0.$

2. $z^4 - 4 = 0.$

3. $z^{12} - 1 = 0.$

4. $\frac{z^{12}-1}{z^4-1} = 0.$

Esercizio 4.23. [BBR83] Risolvere le seguenti equazioni complesse e disegnare le soluzioni sul piano di Argand-Gauss

1. $e^z = e^{3z-\bar{z}}$

2. $e^{2z-1} = e^{z-\bar{z}}$

3. $e^{z\bar{z}} = 3$

Esercizio 4.24. [BBL83] Risolvere le seguenti equazioni complesse e disegnare le soluzioni sul piano di Argand-Gauss

1. $z^3\bar{z} = i$

2. $z^2\bar{z}^4 = z^6$

3. $z^2\bar{z}^4 = z^4$

Esercizio 4.25. [BBB48] $(\sqrt[3]{1}_{\mathbb{C}}, \cdot)$ è un gruppo moltiplicativo con la moltiplicazione di $(\mathbb{C}, \cdot)$?

Esercizio 4.26. [BBX48] Dato $n > 1$, $(\sqrt[n]{1}_{\mathbb{C}}, \cdot)$ è un gruppo moltiplicativo con la moltiplicazione di $(\mathbb{C}, \cdot)$?

4.3 Prima prova di autovalutazione

[Auto1] [Tempo stimato 2h]

1. Determinare l'inverso di $2 + 3\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.
2. $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ è un campo con le operazioni standard? Se sì dare la formula per l'inverso di $a + b\sqrt{3}$.
3. Sia $\mathbb{Z}_5$ l'insieme dei numeri interi con l'uguaglianza ridefinita: per $x, y \in \mathbb{Z}_5$

$$x = y \Leftrightarrow \text{il resto della divisione per 5 di } x \text{ e } y \text{ è uguale}$$

Quanti elementi distinti esistono in $\mathbb{Z}_5$?

4. (Difficile) L'insieme $\mathbb{Z}_5$ è un gruppo rispetto alla somma? Un anello rispetto alla somma e alla moltiplicazione? Un campo rispetto alla somma e moltiplicazione?
5. Risolvere per $z \in \mathbb{C}$ il sistema di equazioni
$$\begin{cases} z^3 - 2z^2 + i - 2 = 0 \\ z^4 - 1 = 0 \end{cases}.$$
6. Disegnare sul piano di Argand-Gauss le soluzioni dell'equazione $e^{iz} = e^{2\bar{z}}$.
7. Disegnare sul piano di Argand Gauss le soluzioni dell'equazione $z^5 = \bar{z}^5$.
8. Disegnare sul piano di Argand Gauss le soluzioni dell'equazione $e^{z+1} = e^{\bar{z}-1}$.