- 1) Studiare l'equazione

$$\log(x^2) + x + K = 0$$

al variare del parametro reale K .

Posto $K = 1$, approssimare la soluzione piú grande con massimo errore assoluto $E \leq 10^{-2}$.

- 2) Una persona è solita, ogni giorno, prendere aerei che collegano tra loro Roma, Francoforte e Mosca. La scelta degli spostamenti da fare è decisa nei seguenti modi in funzione del luogo in cui si trova:

Roma: lanciando un dado (non truccato) rimane a Roma se ottiene un punteggio minore od uguale a 4 (quattro), si sposta a Francoforte se ottiene 5 (cinque), parte per Mosca se ottiene 6 (sei);

Francoforte: lanciando un dado (non truccato) rimane a Francoforte se ottiene 3 (tre), si sposta a Roma se ottiene un punteggio minore od uguale a 2 (due), parte per Mosca se ottiene piú di tre (tre);

Mosca: lanciando tre volte una moneta equilibrata rimane a Mosca se ottiene 0 (zero) o 3 (tre) Teste, si sposta a Roma se ottiene 2 (due) Teste, parte per Francoforte se ottiene 1 (una) Testa.

- Costruire la matrice di transizione della catena di Markov.
- Classificare gli stati della catena di Markov.
- Determinare la distribuzione limite (se esiste).
- La persona in oggetto, dove avrà piú probabilità di trovarsi dopo 3 anni?

- 3) Una variabile aleatoria X ha la seguente funzione di densità

$$f(x) = \begin{cases} K & \text{se } -1 < x < 0, \\ \frac{11}{40}x & \text{se } 0 \leq x \leq 2, \\ \frac{1}{10} & \text{se } 2 < x \leq 4, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- Determinare la costante reale K .
- Calcolare $E[X]$ e $Var(X)$.
- Determinare la funzione di ripartizione $F(x)$.

SOLUZIONE

- 1) Al variare di K si hanno le seguenti possibilità:

$K < 2(1 - \log 2)$ una soluzione reale positiva;

$K = 2(1 - \log 2)$ due soluzioni reali, una positiva e l'altra negativa di molteplicità due ($x = -2$);

$K > 2(1 - \log 2)$ tre soluzioni reali distinte, una positiva, le altre negative.

Posto $K = 1$, si hanno tre soluzioni reali distinte. La maggiore è separata dall'intervallo $[0.4, 0.6]$.

Posto $f(x) = \log(x^2) + x + 1$, risultano $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$ per cui il metodo di Newton converge scegliendo come valore iniziale $x_0 = 0.4$. Si ottiene quindi $\alpha \in [0.47, 0.48]$.

- 2) Indicati con E_1, E_2, E_3 gli stati corrispondenti, rispettivamente, alle città di Roma, Francoforte e Mosca, la matrice di transizione è

$$T = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/6 & 1/6 \\ 1/3 & 1/6 & 1/2 \\ 3/8 & 3/8 & 2/8 \end{pmatrix}.$$

La catena risulta irriducibile per cui gli stati sono tutti transitori.

La distribuzione limite π che verifica $\pi = \pi T$ è $\pi = \frac{1}{122}(63, 27, 32)$.

Dopo tre anni la probabilità maggiore è di trovarsi a Roma.

- 3) La costante K si determina imponendo $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ per cui $K = 1/4$.
Con semplici calcoli si ricavano

$$E[X] = \frac{29}{24}, \quad E[X^2] = \frac{61}{20}, \quad Var(X) = \frac{4579}{2880}.$$

La funzione di ripartizione $F(x)$ risulta

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq -1 \\ \frac{1}{4}x + \frac{1}{4} & \text{se } -1 < x < 0 \\ \frac{11}{80}x^2 + \frac{1}{4} & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{1}{10}x + \frac{3}{5} & \text{se } 2 < x \leq 4 \\ 1 & \text{se } 4 < x \end{cases}.$$