

Derivazione sotto il segno di integrale

Lemma 1. *Sia*

$$\mathcal{R} = [a, b] \times (C, D)$$

un rettangolo in \mathbb{R}^2 . Sia $f : \mathcal{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione tale che:

- *per ogni fissato $x \in [a, b]$ la funzione*

$$f(x, \cdot) : (C, D) \rightarrow \mathbb{R}$$

è derivabile sull'intervallo (C, D) ; in un punto $y \in (C, D)$ indicheremo la sua derivata con $\partial_y f(x, y)$;

- *la funzione*

$$\partial_y f : [a, b] \times (C, D) \rightarrow \mathbb{R}$$

è continua su $[a, b] \times (C, D)$.

Allora, la funzione

$$F : (C, D) \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(y) := \int_a^b f(x, y) dx$$

è derivabile su (C, D) e per ogni $y \in (C, D)$ si ha

$$F'(y) = \int_a^b \partial_y f(x, y) dx.$$

Dimostrazione: Sia $h \in \mathbb{R}$. Allora

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} (F(y+h) - F(y)) &= \frac{1}{h} \left(\int_a^b f(x, y+h) dx - \int_a^b f(x, y) dx \right) \\ &= \int_a^b \frac{1}{h} (f(x, y+h) - f(x, y)) dx \end{aligned}$$

Per il Teorema di Lagrange abbiamo che, per ogni $x \in [a, b]$ e $h \in \mathbb{R}$ esiste $\xi_{x,h}$ tale che $|\xi_{x,h}| \leq |h|$ e

$$\frac{1}{h} (f(x, y+h) - f(x, y)) = \partial_y f(x, y + \xi_{x,h}).$$

Inoltre, l'uniforme continuità di $\partial_y f$ implica che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che:

$$\text{se } |y' - y| < \delta \quad \text{allora} \quad |\partial_y f(x, y') - \partial_y f(x, y)| < \varepsilon.$$

In particolare, quando $|h| < \delta$,

$$|\partial_y f(x, y + \xi_{x,h}) - \partial_y f(x, y)| < \varepsilon.$$

Di conseguenza, sempre quando $|h| < \delta$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} (F(y+h) - F(y)) - \int_a^b \partial_y f(x, y) dx \right| &= \left| \int_a^b \partial_y f(x, y + \xi_{x,h}) dx - \int_a^b \partial_y f(x, y) dx \right| \\ &\leq \int_a^b |\partial_y f(x, y + \xi_{x,h}) - \partial_y f(x, y)| dx \leq (b-a)\varepsilon. \end{aligned}$$

In conclusione,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{1}{h} (F(y+h) - F(y)) - \int_a^b \partial_y f(x, y) dx \right| = 0. \quad \square$$